

A 胃癌

レジメン名: mFOLFOX6(胃癌)

A-001

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200mg/m ² Day1			
2	エルブラット点滴静注液	85mg/m ² Day1			
3	5-FU注	400mg/m ² Day1			
4	5-FU注	2400mg/m ² Day1			

レジメン名: S-1+イリノテカン(day1,8)

A-002

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	カンプト点滴静注	80mg/m ² Day1 Day8			

レジメン名: S-1+シスプラチン(day1,8:胃)

A-003

薬剤	用量	投与日	コース期間:	35	日間
1	シスプラチン点滴静注「マルコ」	30mg/m ² Day1 Day8			

レジメン名: S-1+シスプラチン(day8)

A-004

薬剤	用量	投与日	コース期間:	35	日間
1	シスプラチン点滴静注「マルコ」	60mg/m ² Day8			

レジメン名: S-1+ドセタキセル(day1)

A-005

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ドセタキセル点滴静注「EE」	40mg/m ² Day1			

レジメン名: S-1+パクリタキセル(day1,15)

A-006

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	パクリタキセル注「NK」	80mg/m ² Day1 Day15			

レジメン名: S-1+パクリタキセル(day1,8)

A-007

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	パクリタキセル注「NK」	50mg/m ² Day1 Day8			

レジメン名: SP3週+Her2療法(2回目以降)

A-008

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	シスプラチン点滴静注「マルコ」	60mg/m ² Day1			

2 ハーセプチン注射用(溶解液付) 6mg/kg Day1

レジメン名: SP3週+Her2療法(初回)

A-009

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	シスプラチン点滴静注「マルコ」	60mg/m ² Day1			
2	ハーセプチン注射用(溶解液付)	8mg/kg Day1			

レジメン名: TS-1+レンチナン

A-010

薬剤	用量	投与日	コース期間:	7	日間
1	レンチナン静注用「味の素」	2mg Day1			

レジメン名: Weekly nab-PTX(D法 胃癌)

A-011

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	アブラキサン点滴静注用	100mg/m ² Day1 Day8 Day15			

レジメン名: アブラキサン療法(A法 胃癌)

A-012

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	アブラキサン点滴静注用	260mg/m ² Day1			

レジメン名: イリノテカン(day1,15)

A-013

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	カンプト点滴静注	150mg/m ² Day1 Day15			

レジメン名: イリノテカン(day1,8,15,22)

A-014

薬剤	用量	投与日	コース期間:	42	日間
1	カンプト点滴静注	100mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22			

レジメン名: イリノテカン+シスプラチン(day1,15)

A-015

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	カンプト点滴静注	60mg/m ² Day1 Day15			

2 シスプラチン点滴静注「マルコ」 30mg/m² Day1 Day15

レジメン名: カペシタピン+シスプラチン(XP)

A-016

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	シスプラチン点滴静注「マルコ」	80mg/m ² Day1			

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- バラバラ注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: サイラムザ+アブラキサン療法

A-017

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	サイラムザ点滴静注	8mg/kg Day1 Day15			

2 アブラキサン点滴静注
用 100mg/m² Day1 Day8 Day152 ドセタキセル点滴静注
「EE」 60mg/m² Day1

レジメン名: ドセタキセル(day1)+トラスツズマブ(8mg/kg 初回)

A-024

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	8mg/kg Day1			

レジメン名: サイラムザ+パクリタキセル療法

A-018

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	サイラムザ点滴静注	8mg/kg Day1 Day15			

2 パクリタキセル注「NK」 80mg/m² Day1 Day8 Day152 ドセタキセル点滴静注
「EE」 60mg/m² Day1

レジメン名: ドセタキセル(day1,8,15)

A-025

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	20mg/m ² Day1 Day8 Day15			

レジメン名: サイラムザ単剤療法

A-019

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	サイラムザ点滴静注	8mg/kg Day1			

レジメン名: ドセタキセル腹腔内投与

A-026

薬剤	用量	投与日	コース期間:	7	日間
1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	30mg/m ² Day1			

レジメン名: シスプラチン+5-FU+トラスツズマブ(2回目以降)

A-020

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	6mg/kg Day1			

2 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 80mg/m² Day13 5-FU注 400mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: トラスツズマブ併用(6mg/kg 2回目以降)

A-027

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	6mg/kg Day1			

レジメン名: トラスツズマブ併用(8mg/kg初回)

A-028

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	8mg/kg Day1			

レジメン名: シスプラチン+5-FU+トラスツズマブ(初回)

A-021

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	8mg/kg Day1			

2 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 80mg/m² Day13 5-FU注 400mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: ニボルマブ療法(胃癌:固定用量)

A-029

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	オブジーボ点滴静注	240mg Day1			

レジメン名: パクリタキセル(day1,8,15)

A-030

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	パクリタキセル注「NK」	80mg/m ² Day1 Day8 Day15			

レジメン名: ドセタキセル(day1)

A-022

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	60mg/m ² Day1			

レジメン名: フルツロン+パクリタキセル

A-031

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	パクリタキセル注「NK」	80mg/m ² Day1 Day8			

レジメン名: ドセタキセル(day1)+トラスツズマブ(6mg/kg 2回目以降)

A-023

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	6mg/kg Day1			

レジメン名: 胃癌 SOX

A-032

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	エルプラット点滴静注液	130mg/m ² Day1			

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・パラボラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: 胃癌 XELOX

A-033

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	エルプラット点滴静注	130mg/m ² Day1			

B 肝臓癌

レジメン名: TAI-ADM

B-034

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	アドリアシン注用	50mg Day1			

レジメン名: TAI-CDDP-FU-ADR

B-035

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	50mg Day1			
2	5-FU注	1500mg Day1			
3	アドリアシン注用	30mg Day1			

レジメン名: TAI-IA-FU

B-036

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	動注用アイエーコール	100mg Day1			
2	5-FU注	1500mg Day1			

レジメン名: ポート one shot FP

B-037

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	30mg Day1			
2	5-FU注	750mg Day1			

レジメン名: ポート one shot Lip+ミリブラ(入院用)

B-038

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ミリブラ動注用	70mg Day1			

レジメン名: ポートone shot Lip+ADM

B-039

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	アドリアシン注用	20mg Day1 Day15			

レジメン名: ラムシルマブ

B-040

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	サイラムザ点滴静注	8mg/kg Day1			

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: 肝動注5-FU(One shot)

B-041

薬剤	用量	投与日	コース期間:	7	日間
1 5-FU注	500mg	Day1			

C 甲状腺癌

レジメン名: (患者限定)ドセタキセル tri-weekly

C-042

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 ドセタキセル点滴静注「EE」	60mg/m ²	Day1			

レジメン名: (患者限定)甲状腺未分化癌weekly paclitaxel

C-043

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 パクリタキセル注「NK」	80mg/m ²	Day1 Day8 Day15			

レジメン名: A 療法(3週1回)

C-044

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 ドキソルビシン塩酸塩注射液	75mg/m ²	Day1			

レジメン名: AP療法(甲状腺)

C-045

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 シスプラチン点滴静注「マルコ」	40mg/m ²	Day1			
2 ドキソルビシン塩酸塩注射液	60mg/m ²	Day1			

レジメン名: パクリタキセル140

C-046

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 パクリタキセル注「NK」	35mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4			

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- パラボラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

D 骨・軟部腫瘍

レジメン名: EVAIA

D-047

薬剤	用量	投与日	コース期間:	42	日間
1 ラステット注	150mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day22 Day23 Day24			
2 ドキソルピシン塩酸塩注射液	20mg/m ²	Day1 Day2 Day3			
3 注射用イホマイド	2g/m ²	Day1 Day2 Day3 Day22 Day23 Day24			
4 オンコピン注射用	1.5mg/m ²	Day1 Day22			
5 コスメゲン静注用	0.5mg/m ²	Day22 Day23 Day24			

レジメン名: ドキソルピシン療法

D-053

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 ドキソルピシン塩酸塩注射液	30mg/m ²	Day1 Day2			

レジメン名: ヨンデリス療法

D-054

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 ヨンデリス点滴静注用	1.2mg/m ²	Day1			

レジメン名: IFM単独

D-049

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 注射用イホマイド	2g/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5			

レジメン名: MAID (Mesna+DXR+IFO+DTIC)

D-050

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 ドキソルピシン塩酸塩注射液	20mg/m ²	Day1 Day2 Day3			
2 ダカルバジン注用	300mg/m ²	Day1 Day2 Day3			
3 注射用イホマイド	2.5g/m ²	Day1 Day2 Day3			

レジメン名: VDC療法

D-051

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 オンコピン注射用	1.5mg/m ²	Day1 Day8 Day15			
2 ドキソルピシン塩酸塩注射液	50mg/m ²	Day1			
3 注射用エンドキサン	1000mg/m ²	Day1			

レジメン名: エリブリン療法(悪性軟部腫瘍)

D-052

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 ハラヴェン静注	1.4mg/m ²	Day1 Day8			

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

F 食道癌

レジメン名: DCF療法(ドセタキセル+CDDP+5FU)

F-055

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 5-FU注 375mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 ドセタキセル点滴静注「EE」 75mg/m² Day13 シスプラチン点滴静注「マルコ」 75mg/m² Day1

レジメン名: EP療法(エトポシド+CDDP)

F-056

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 80mg/m² Day12 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3

レジメン名: FP療法(80/800)

F-057

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 5-FU注 400mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 シスプラチン点滴静注「マルコ」 80mg/m² Day1

レジメン名: IP療法 (GPT-11+CDDP)

F-058

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 60mg/m² Day12 カンプト点滴静注 60mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: middle dose FP(40/400)

F-059

薬剤 用量 投与日 コース期間: 35 日間

1 5-FU注 400mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day122 シスプラチン点滴静注「マルコ」 40mg/m² Day1 Day8

レジメン名: TS-1+ドセタキセル Day1,15

F-060

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ドセタキセル点滴静注「EE」 40mg/m² Day1 Day15

レジメン名: TS-1+ネダプラチン Day1

F-061

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 アクブラ静注 80mg/m² Day1

レジメン名: weeklyドセタキセル day1,8,15

F-062

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ドセタキセル点滴静注「EE」 30mg/m² Day1 Day8 Day15レジメン名: ドセタキセル(70mg/m²)(3週1回)

F-063

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ドセタキセル点滴静注「EE」 70mg/m² Day1

レジメン名: ドセタキセル+CDDP day1,15

F-064

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ドセタキセル点滴静注「EE」 30mg/m² Day1 Day152 シスプラチン点滴静注「マルコ」 30mg/m² Day1 Day15

レジメン名: ニボルマブ単剤療法(食道癌)

F-065

薬剤 用量 投与日 コース期間: 14 日間

1 オブジーボ点滴静注 240mg Day1

レジメン名: ネダプラチン+5FU療法(末梢)

F-066

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 5-FU注 400mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 アクブラ静注 80mg/m² Day1

レジメン名: パクリタキセル(day1,8,15,22,29,36)(6投2休)

F-067

薬剤 用量 投与日 コース期間: 49 日間

1 パクリタキセル注「NK」 100mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36

レジメン名: 化学放射線療法 high dose FP IVH(70/700)

F-068

薬剤 用量 投与日 コース期間: 56 日間

1 5-FU注 350mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day29 Day30 Day31 Day322 シスプラチン点滴静注「マルコ」 70mg/m² Day1 Day29

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・バラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: 化学放射線療法 high dose FP末梢(70/700)

F-069

薬剤	用量	投与日	コース期間:	56	日間
1 5-FU注	350mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day29 Day30 Day31 Day32			

2 シスプラチン点滴静注
「マルコ」

70mg/m² Day1 Day29

レジメン名: 化学放射線療法 Low dose FP IVH(4/200)

F-070

薬剤	用量	投与日	コース期間:	40	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 シスプラチン点滴静注
「マルコ」

4mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40

2 5-FU注

100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40

レジメン名: 化学放射線療法 Low dose FP 末梢(4/200)

F-071

薬剤	用量	投与日	コース期間:	41	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 5-FU注

100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40

2 シスプラチン点滴静注
「マルコ」

4mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40

G 膀胱癌

レジメン名: FOLFIRINOX

G-072

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 レボホリナート点滴静注
用「ヤクルト」

200mg/m² Day1

2 カンプト点滴静注

180mg/m² Day1

3 5-FU注

400mg/m² Day1

4 5-FU注

2400mg/m² Day1

5 エルプラット点滴静注液

85mg/m² Day1

レジメン名: Gemcitabine/Cisplatin

G-073

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 ゲムシタビン点滴静注
用「ヤクルト」

1000mg/m² Day1 Day8

2 シスプラチン点滴静注
「マルコ」

25mg/m² Day1 Day8

レジメン名: modified FOLFIRINOX

G-074

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 レボホリナート点滴静注
用「ヤクルト」

200mg/m² Day1

2 カンプト点滴静注

150mg/m² Day1

3 5-FU注

2400mg/m² Day1

4 エルプラット点滴静注液

85mg/m² Day1

レジメン名: SOX(膀胱・胆道癌)

G-075

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 エルプラット点滴静注液

100mg/m² Day1

レジメン名: TAI-IA-FU

G-076

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 動注用アイエーコール

100mg Day1

2 5-FU注

1500mg Day1

※注意点

- ・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: TS-1+ジェムシタピンDay1,15

G-077

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ゲムシタピン点滴静注 用「ヤクルト」	1000mg/m ²	Day1 Day15		

レジメン名: TS-1+ジェムシタピンDay1,8

G-078

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ゲムシタピン点滴静注 用「ヤクルト」	1000mg/m ²	Day1 Day8		

レジメン名: Weekly ジェムシタピンDay1,8

G-079

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ゲムシタピン点滴静注 用「ヤクルト」	1000mg/m ²	Day1 Day8		

レジメン名: weeklyジェムシタピン+アブラキサン療法 Day1,8,15

G-080

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	アブラキサン点滴静注 用	125mg/m ²	Day1 Day8 Day15		
2	ゲムシタピン点滴静注 用「ヤクルト」	1000mg/m ²	Day1 Day8 Day15		

レジメン名: weeklyジェムシタピンDay1,15

G-081

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ゲムシタピン点滴静注 用「ヤクルト」	1000mg/m ²	Day1 Day15		

レジメン名: weeklyジェムシタピンDay1,8,15

G-082

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ゲムシタピン点滴静注 用「ヤクルト」	1000mg/m ²	Day1 Day8 Day15		

H 造血器腫瘍

レジメン名: Ara-C少量療法

H-083

1:白血病

1:AML

薬剤	用量	投与日	コース期間:	29	日間
1	キロサイド注	10mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21		

レジメン名: CAG療法(持続静注)

H-084

1:白血病

1:AML

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	アクラシノン注射用	14mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4		
2	キロサイド注	20mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14		

レジメン名: FLAGM

H-085

1:白血病

1:AML

薬剤	用量	投与日	コース期間:	27	日間
1	キロサイド注	2000mg/m ²	Day2 Day3 Day4 Day5		
2	フルダラ静注用	15mg/m ²	Day2 Day3 Day4 Day5		
3	ノバントロン注	10mg/m ²	Day4 Day5 Day6		

レジメン名: GO(マイロターグ)単独療法

H-086

1:白血病

1:AML

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	マイロターグ点滴静注 用	9mg/m ²	Day1 Day15		

レジメン名: HD-AraC+(2g×2×6日)+MIT

H-087

1:白血病

1:AML

薬剤	用量	投与日	コース期間:	27	日間
1	キロサイド注	2000mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6		
2	ノバントロン注	10mg/m ²	Day7 Day8 Day9		

レジメン名: JALSG-AML201 寛解導入A群(IDR+Ara-C)

H-088

1:白血病

1:AML

薬剤	用量	投与日	コース期間:	27	日間
1	キロサイド注	50mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7		
2	イダマイシン静注用5m g	12mg/m ²	Day1 Day2 Day3		

レジメン名: JALSG-AML201 寛解導入B群(DNR+Ara-C)

H-089

1:白血病

1:AML

薬剤	用量	投与日	コース期間:	27	日間
1	キロサイド注	50mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7		

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
・バラブラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

2 ダウノマイシン静注用 50mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5**レジメン名: JALSG-AML201 地固めC群(HD-Ara-C)**

H-090 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 5 日間**1 キロサイド注 2000mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5**レジメン名: JALSG-AML201 地固めD群第1コース**

H-091 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 5 日間**1 ノバントロン注 7mg/m² Day1 Day2 Day32 キロサイド注 100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5**レジメン名: JALSG-AML201 地固めD群第2コース**

H-092 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 5 日間**1 ダウノマイシン静注用 50mg/m² Day1 Day2 Day32 キロサイド注 100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5**レジメン名: JALSG-AML201 地固めD群第3コース**

H-093 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 5 日間**1 アクラシノン注射用 20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 キロサイド注 100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5**レジメン名: JALSG-AML201 地固めD群第4コース**

H-094 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 10 日間**1 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 キロサイド注 100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day53 オンコピン注射用 0.8mg/m² Day84 注射用フィルデシン(3mg)V 2mg/m² Day10**レジメン名: JALSG-GML200 寛解導入療法(70才以上)**

H-095 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 8 日間**1 サンラビン点滴静注用 200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8
200mg/V2 ダウノマイシン静注用 30mg/m² Day1 Day2 Day3**レジメン名: JALSG-GML200 寛解導入療法(70才未満)**

H-096 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 8 日間**1 サンラビン点滴静注用 200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8
200mg/V2 ダウノマイシン静注用 40mg/m² Day1 Day2 Day3**レジメン名: JALSG-GML200 地固め第1コース**

H-097 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 19 日間**1 ノバントロン注 7mg/m² Day1 Day2 Day32 サンラビン点滴静注用 200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
200mg/V**レジメン名: JALSG-GML200 地固め第2コース**

H-098 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 19 日間**1 サンラビン点滴静注用 200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
200mg/V2 ダウノマイシン静注用 30mg/m² Day1 Day23 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3**レジメン名: JALSG-GML200 地固め第3コース**

H-099 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 19 日間**1 サンラビン点滴静注用 200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
200mg/V2 アクラシノン注射用 14mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5**レジメン名: MEC療法**

H-100 1:白血病 1:AML

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 5 日間**1 ノバントロン注 6mg/m² Day1 Day2 Day32 ラステット注 80mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day53 キロサイド注 100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5**レジメン名: Arsenic Trioxide(トリセノックス:寛解導入)**

H-101 1:白血病 2:APL

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 10 日間**

1 トリセノックス注 0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先:東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: Arsenic Trioxide(トリセノックス:後療法)

H-102 1:白血病 2:APL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 5 **日間**

1 トリセノックス注 0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

3 キロサイド注 30mg Day29

レジメン名: (患者限定)JALSG-ALL202U維持療法(3)3-4サイクル(CNS陰性)

H-109 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 42 **日間**

1 メソトレキセート注射液 150mg/m² Day1 Day15 Day29

レジメン名: JALSG-APL204 地固め第1コース

H-103 1:白血病 2:APL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 5 **日間**

1 ノバントロン注 7mg/m² Day1 Day2 Day3

2 キロサイド注 200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: DVP療法

H-110 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 7 **日間**

1 オンコピン注射用 0.03mg/kg Day1

レジメン名: JALSG-APL204 地固め第2コース

H-104 1:白血病 2:APL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 5 **日間**

1 ダウノマイシン静注用 50mg/m² Day1 Day2 Day3

2 キロサイド注 200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

2 ダウノマイシン静注用 0.7mg/kg Day1

レジメン名: Hyper CVAD コースA(1、3、5、7)

H-111 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 21 **日間**

1 注射用エンドキサン 300mg/m² Day1 Day2 Day3

レジメン名: JALSG-APL204 地固め第3コース

H-105 1:白血病 2:APL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 5 **日間**

1 イダマイシン静注用5mg 12mg/m² Day1 Day2 Day3

2 キロサイド注 140mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

2 メソトレキセート注射液 12mg Day2

3 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day4 Day11

4 ドキソルビシン塩酸塩注射液 50mg/m² Day4

レジメン名: (患者限定)JALSG-ALL202U維持療法(1)1-3サイクル(CNS陰性)

H-106 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 42 **日間**

1 メソトレキセート注射液 150mg/m² Day1 Day15 Day29

2 メソトレキセート注射液 12mg Day29

3 キロサイド注 30mg Day29

5 キロサイド注 100mg Day8

レジメン名: Hyper CVAD コースB(2、4、6、8)

H-112 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 21 **日間**

1 メソトレキセート注射液 200mg/m² Day1

2 メソトレキセート注射液 800mg/m² Day1

レジメン名: (患者限定)JALSG-ALL202U維持療法(1)4サイクル(CNS陰性)

H-107 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 42 **日間**

1 メソトレキセート注射液 150mg/m² Day1 Day15 Day29

3 キロサイド注 3000mg/m² Day2 Day3

4 メソトレキセート注射液 12mg Day2

レジメン名: (患者限定)JALSG-ALL202U維持療法(3)1-2サイクル(CNS陰性)

H-108 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 42 **日間**

1 メソトレキセート注射液 150mg/m² Day1 Day15 Day29

2 メソトレキセート注射液 12mg Day29

5 キロサイド注 100mg Day8

レジメン名: JALSG Ph(-)B-ALL213 寛解導入

H-113 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 29 **日間**

1 メソトレキセート注射液 15mg Day8 Day15

※注意点

- ・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

2 キロサイド注 40mg Day8 Day15

4 ダウノマイシン静注用 45mg/m² Day1 Day8 Day15

3 オンコビン注射用 1.3mg/m² Day8 Day15 Day22 Day29

6 キロサイド注 75mg/m² Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40

4 注射用エンドキサン 1200mg/m² Day8

7 注射用エンドキサン 1200mg/m² Day29

6 ロイナーゼ注用 5000単位/m² Day15 Day17 Day19 Day21 Day23 Day25 Day27 Day29

7 ロイナーゼ注用 5000単位/m² Day2 Day4 Day6 Day9 Day11 Day13

6 ダウノマイシン静注用 45mg/m² Day8 Day9 Day10

レジメン名: JALSG-ALL2020 維持療法

H-117 1:白血病 3:ALL

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 オンコビン注射用 1.3mg/m² Day1

レジメン名: JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め1, 4(HDAraC)

H-114 1:白血病 3:ALL

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 キロサイド注 2000mg/m² Day1 Day2 Day3

レジメン名: JALSG-ALL2020 寛解導入

H-118 1:白血病 3:ALL

薬剤 用量 投与日 コース期間: 22 日間

2 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3

1 オンコビン注射用 1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22

3 メトレキセート注射液 15mg Day1

2 ダウノマイシン静注用 60mg/m² Day1 Day2 Day3

4 キロサイド注 40mg Day1

3 注射用エンドキサン 1200mg/m² Day1

5 ロイナーゼ注用 10000単位/m² Day4

4 ロイナーゼ注用 3000単位/m² Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20

レジメン名: JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め2, 5

H-115 1:白血病 3:ALL

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 オンコビン注射用 1.3mg/m² Day1 Day15

レジメン名: JALSG-ALL2020 地固めC1

H-119 1:白血病 3:ALL

薬剤 用量 投与日 コース期間: 3 日間

2 メトレキセート注射液 15mg Day1 Day15

1 キロサイド注 2000mg/m² Day1 Day2 Day3

3 キロサイド注 40mg Day1 Day15

2 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3

4 メトレキセート注射液 3000mg/m² Day1 Day15

3 メトレキセート注射液 15mg Day1

5 ロイナーゼ注用 10000単位/m² Day3 Day17

レジメン名: JALSG-ALL2020 地固めC2A

H-120 1:白血病 3:ALL

薬剤 用量 投与日 コース期間: 18 日間

1 メトレキセート注射液 3000mg/m² Day1 Day15

レジメン名: JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め3

H-116 1:白血病 3:ALL

薬剤 用量 投与日 コース期間: 42 日間

1 メトレキセート注射液 15mg Day1 Day29

2 オンコビン注射用 1.3mg/m² Day1 Day15

2 キロサイド注 40mg Day1 Day29

3 メトレキセート注射液 15mg Day1 Day15

3 オンコビン注射用 1.3mg/m² Day1 Day8 Day15

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: JALSG-ALL2020 地固めC2B

H-121 1:白血病 3:ALL
薬剤 用量 投与日 コース期間: 18 日間1 メトレキセート注射液 100mg/m² Day1 Day152 オンコピン注射用 1.3mg/m² Day1 Day153 メトレキセート注射液 400mg/m² Day1 Day15

4 メトレキセート注射液 15mg Day1 Day15

2 メトレキセート注射液 12mg Day2 Day9

3 キロサイド注 30mg Day2 Day9

レジメン名: JALSG-Ph+ALL208 IMA 寛解導入

H-125 1:白血病 3:ALL
薬剤 用量 投与日 コース期間: 42 日間1 注射用エンドキサン 1200mg/m² Day12 ダウノマイシン静注用 60mg/m² Day1 Day2 Day33 オンコピン注射用 1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22

4 メトレキセート注射液 15mg Day29

5 キロサイド注 40mg Day29

レジメン名: JALSG-ALL2020 地固めC3

H-122 1:白血病 3:ALL
薬剤 用量 投与日 コース期間: 40 日間1 オンコピン注射用 1.3mg/m² Day1 Day8 Day152 ドキソルピシン塩酸塩注射液 30mg/m² Day1 Day8 Day15

3 メトレキセート注射液 15mg Day1 Day29

4 キロサイド注 40mg Day1 Day29

6 注射用エンドキサン 1000mg/m² Day296 キロサイド注 75mg/m² Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40

レジメン名: JALSG-Ph+ALL208 IMA 地固めC1

H-126 1:白血病 3:ALL
薬剤 用量 投与日 コース期間: 24 日間1 メトレキセート注射液 900mg/m² Day12 メトレキセート注射液 100mg/m² Day1

3 メトレキセート注射液 15mg Day1

4 キロサイド注 40mg Day1

5 キロサイド注 2000mg/m² Day2 Day3

レジメン名: JALSG-ALL202U 寛解導入(1-5週)

H-123 1:白血病 3:ALL
薬剤 用量 投与日 コース期間: 29 日間

1 メトレキセート注射液 12mg Day1 Day8 Day22

2 オンコピン注射用 1.5mg/m² Day8 Day15 Day22 Day293 ピノルピン注射用 25mg/m² Day8 Day9

4 キロサイド注 30mg Day8 Day22

6 ロイナーゼ注用 6000単位/m² Day15 Day17 Day19 Day21 Day23 Day25 Day27 Day296 注射用エンドキサン 1200mg/m² Day10

レジメン名: Nelarabine(アラノンジ)療法

H-127 1:白血病 3:ALL
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間1 アラノンジ静注用 1500mg/m² Day1 Day3 Day5

レジメン名: RELAL88

H-128 1:白血病 3:ALL
薬剤 用量 投与日 コース期間: 5 日間1 注射用フィルデシン(3mg)V 2mg/m² Day12 ノバントロン注 12mg/m² Day1 Day2 Day3

レジメン名: JALSG-ALL202U 地固め(10-11週)

H-124 1:白血病 3:ALL
薬剤 用量 投与日 コース期間: 11 日間1 メトレキセート注射液 3000mg/m² Day1 Day84 キロサイド注 1200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

6 メソトレキセート注射液 334mg/m² Day5

6 メソトレキセート注射液 166mg/m² Day5

レジメン名: プリナツモマブ 1サイクル目(体重45kg以上)

H-129 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 42 日間**

- 1 ビーリンサイト点滴静注用 9 μg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
- 2 ビーリンサイト点滴静注用 28 μg Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28

レジメン名: プリナツモマブ 1サイクル目(体重45kg未満)

H-130 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 42 日間**

- 1 ビーリンサイト点滴静注用 5 μg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
- 2 ビーリンサイト点滴静注用 15 μg/m² Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28

レジメン名: プリナツモマブ 2-5サイクル目(体重45kg以上)

H-131 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 42 日間**

- 1 ビーリンサイト点滴静注用 28 μg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28

レジメン名: プリナツモマブ 2-5サイクル目(体重45kg未満)

H-132 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 42 日間**

- 1 ビーリンサイト点滴静注用 15 μg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28

レジメン名: プリナツモマブ 6-9サイクル目(体重45kg以上)

H-133 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 84 日間**

- 1 ビーリンサイト点滴静注用 28 μg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28

レジメン名: プリナツモマブ 6-9サイクル目(体重45kg未満)

H-134 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 84 日間**

- 1 ビーリンサイト点滴静注用 15 μg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28

レジメン名: ベスポンサ単独療法(1コース目)

H-135 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

- 1 ベスポンサ点滴静注用 0.8mg/m² Day1
- 2 ベスポンサ点滴静注用 0.5mg/m² Day8 Day15

レジメン名: ベスポンサ単独療法(寛解、2コース目以降)

H-136 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

- 1 ベスポンサ点滴静注用 0.5mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: ベスポンサ単独療法(非寛解、2コース目以降)

H-137 1:白血病 3:ALL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

- 1 ベスポンサ点滴静注用 0.8mg/m² Day1
- 2 ベスポンサ点滴静注用 0.5mg/m² Day8 Day15

レジメン名: Cladribine(ロイスタチン)単独療法

H-138 1:白血病 4:CLL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 7 日間**

- 1 ロイスタチン注 0.1mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7

レジメン名: Fludarabine(フルダラ:Day1-5)

H-139 1:白血病 4:CLL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

- 1 フルダラ静注用 20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: アレムツズマブ(維持療法)

H-140 1:白血病 4:CLL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 7 日間**

- 1 マブキャンバス点滴静注 30mg Day1 Day3 Day5

レジメン名: アレムツズマブ(導入療法)

H-141 1:白血病 4:CLL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 5 日間**

- 1 マブキャンバス点滴静注 3mg Day1
- 2 マブキャンバス点滴静注 10mg Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: 大量AraC(2g 2回 3日間)

H-142 1:白血病 5:白血病 小児
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

- 1 キロサイド注 2000mg/m² Day1 Day2 Day3

レジメン名: A+AVD療法

H-144 2:悪性リンパ腫 1:Hodgkin lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

- 1 アドセトリス点滴静注用 1.2mg/kg Day1 Day15
- 2 ダカルバジン注用 375mg/m² Day1 Day15
- 3 ドキソルピシン塩酸塩注射液 25mg/m² Day1 Day15

※注意点

- ・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

4 エクザール注射用 6mg/m² Day1 Day15**レジメン名: ABVD療法**H-145 2:悪性リンパ腫 1:Hodgkin lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**1 ダカルバジン注用 375mg/m² Day1 Day152 ドキソルビシン塩酸塩注射液 25mg/m² Day1 Day153 エステルNa静注液100mg /2mL「AFP」
ヒドロコルチゾン酸4 プレオ注射用 10mg/m² Day1 Day155 エクザール注射用 6mg/m² Day1 Day15**レジメン名: BV(アドセトリス)単独療法**H-146 2:悪性リンパ腫 1:Hodgkin lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 アドセトリス点滴静注用 1.8mg/kg Day1

レジメン名: COPP(オンコピン)H-147 2:悪性リンパ腫 1:Hodgkin lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**1 注射用エンドキサン 600mg/m² Day1 Day82 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1 Day8**レジメン名: DHAP療法**H-148 2:悪性リンパ腫 1:Hodgkin lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 100mg/m² Day12 キロサイド注 2000mg/m² Day2**レジメン名: ニボルマブ療法(ホジキンリンパ腫:固定用量)**H-149 2:悪性リンパ腫 1:Hodgkin lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 オブジーボ点滴静注 240mg Day1

レジメン名: ペムブロリズマブ単剤(ホジキンリンパ腫)H-150 2:悪性リンパ腫 1:Hodgkin lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

レジメン名: CHOP療法H-151 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day12 ドキソルビシン塩酸塩注射液 50mg/m² Day13 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1**レジメン名: GOP**H-152 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1**レジメン名: Elderly NHL AR群(R-THP-COP)**H-153 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 注射用エンドキサン 650mg/m² Day12 ビノルビン注射用 40mg/m² Day13 オンコピン注射用 1mg/m² Day14 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1**レジメン名: Elderly NHL A群(THP-COP)**H-154 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 注射用エンドキサン 650mg/m² Day12 ビノルビン注射用 40mg/m² Day13 オンコピン注射用 1mg/m² Day1**レジメン名: Elderly NHL CR群(R-THP-COP)**H-155 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 注射用エンドキサン 400mg/m² Day12 ビノルビン注射用 30mg/m² Day13 オンコピン注射用 1mg/m² Day14 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・バラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先:東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: Elderly NHL C群(THP-COP)

H-156 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 400mg/m² Day1

2 ビノルビン注射用 30mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1mg/m² Day1

2 ビノルビン注射用 26mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1mg/m² Day1

レジメン名: Elderly NHL FR群(R-減量THP-COP)

H-161 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 260mg/m² Day1

2 ビノルビン注射用 20mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1mg/m² Day1

4 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: Elderly NHL DR群(R-CHOP)

H-157 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 400mg/m² Day1

2 ドキソルピシン塩酸塩注射液 30mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1mg/m² Day1

4 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

2 ビノルビン注射用 20mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1mg/m² Day1

4 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: Elderly NHL F群(減量THP-COP)

H-162 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 260mg/m² Day1

2 ビノルビン注射用 20mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1mg/m² Day1

レジメン名: Elderly NHL D群(CHOP)

H-158 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 400mg/m² Day1

2 ドキソルピシン塩酸塩注射液 30mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1mg/m² Day1

2 ビノルビン注射用 20mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1mg/m² Day1

レジメン名: MGOP療法

H-163 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day1

2 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1

3 ノバントロン注 10mg/m² Day1

レジメン名: Elderly NHL ER群(R-減量THP-COP)

H-159 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 430mg/m² Day1

2 ビノルビン注射用 26mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1mg/m² Day1

4 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: R-Bendamustine療法

H-164 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 トレアキシ点点滴静注 90mg/m² Day1 Day2

2 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: Elderly NHL E群(減量THP-COP)

H-160 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 430mg/m² Day1

レジメン名: R-CHOP療法

H-165 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・バラブラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

2	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	50mg/m ² Day1
3	オンコビン注射用	1.4mg/m ² Day1
4	リツキサン点滴静注	375mg/m ² Day1

レジメン名: R-GOP

H-166	2:悪性リンパ腫	2:NHL(first line)
薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間

1	オンコビン注射用	1.4mg/m ² Day1
2	リツキサン点滴静注	375mg/m ² Day1

レジメン名: Rituximab(リツキサン)単独療法

H-167	2:悪性リンパ腫	2:NHL(first line)
薬剤	用量 投与日	コース期間: 7 日間

1	リツキサン点滴静注	375mg/m ² Day1
---	-----------	---------------------------

レジメン名: R-MACOP-B療法

H-168	2:悪性リンパ腫	2:NHL(first line)
薬剤	用量 投与日	コース期間: 91 日間

1	注射用エンドキサン	350mg/m ² Day1 Day15 Day29 Day43 Day57 Day71
2	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	50mg/m ² Day1 Day15 Day29 Day43 Day57 Day71
3	オンコビン注射用	1.4mg/m ² Day8 Day22 Day36 Day50 Day64 Day78
4	メトレキセート注射液	300mg/m ² Day8 Day36 Day64
6	リツキサン点滴静注	375mg/m ² Day15 Day43 Day71
7	プレオ注射用	10mg/m ² Day22 Day50 Day78
7	メトレキセート注射液	100mg/m ² Day8 Day36 Day64

レジメン名: R-MCOP療法

H-169	2:悪性リンパ腫	2:NHL(first line)
薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間

1	注射用エンドキサン	750mg/m ² Day1
2	ノバントロン注	10mg/m ² Day1
3	オンコビン注射用	1.4mg/m ² Day1
4	リツキサン点滴静注	375mg/m ² Day1

レジメン名: VDS:CHOP療法

H-170	2:悪性リンパ腫	2:NHL(first line)
薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間

1	注射用エンドキサン	750mg/m ² Day1
---	-----------	---------------------------

2	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	50mg/m ² Day1
---	----------------	--------------------------

3	注射用フィルデシン(3mg)V	2.1mg/m ² Day1
---	-----------------	---------------------------

レジメン名: VDS:GOP

H-171	2:悪性リンパ腫	2:NHL(first line)
薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間

1	注射用フィルデシン(3mg)V	2.1mg/m ² Day1
---	-----------------	---------------------------

レジメン名: VDS:GOP療法(GPA点滴)

H-172	2:悪性リンパ腫	2:NHL(first line)
薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間

1	注射用エンドキサン	750mg/m ² Day1
---	-----------	---------------------------

2	注射用フィルデシン(3mg)V	2.1mg/m ² Day1
---	-----------------	---------------------------

レジメン名: VDS:Elderly NHL AR群(R-THP-GOP)

H-173	2:悪性リンパ腫	2:NHL(first line)
薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間

1	注射用エンドキサン	650mg/m ² Day1
---	-----------	---------------------------

2	ピノルビン注射用	40mg/m ² Day1
---	----------	--------------------------

3	注射用フィルデシン(3mg)V	1.5mg/m ² Day1
---	-----------------	---------------------------

4	リツキサン点滴静注	375mg/m ² Day1
---	-----------	---------------------------

レジメン名: VDS:MGOP療法

H-174	2:悪性リンパ腫	2:NHL(first line)
薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間

1	注射用エンドキサン	750mg/m ² Day1
---	-----------	---------------------------

2	注射用フィルデシン(3mg)V	2.1mg/m ² Day1
---	-----------------	---------------------------

3	ノバントロン注	10mg/m ² Day1
---	---------	--------------------------

レジメン名: VDS:R-CHOP療法

H-175	2:悪性リンパ腫	2:NHL(first line)
薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間

1	注射用エンドキサン	750mg/m ² Day1
---	-----------	---------------------------

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
 ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
 ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先:東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室
 TEL:03-3353-8112(内線33121)

2 ドキソルピシン塩酸塩
注射液 50mg/m² Day1

3 注射用フィルデシン(3
mg)V 2.1mg/m² Day1

4 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: VDS:R-GOP療法(OPA点滴)

H-176 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day1

2 注射用フィルデシン(3
mg)V 2.1mg/m² Day1

3 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: VDS:R-MGOP療法

H-177 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day1

2 ノバントロン注 10mg/m² Day1

3 注射用フィルデシン(3
mg)V 2.1mg/m² Day1

4 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: ガザイバ+CHOP療法(1コース目)

H-178 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day1

2 ドキソルピシン塩酸塩
注射液 50mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1

4 ガザイバ点滴静注100
0mg(40mL) 1000mg Day1 Day8 Day15

レジメン名: ガザイバ+CHOP療法(2コース目以降)

H-179 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day1

2 ドキソルピシン塩酸塩
注射液 50mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1

4 ガザイバ点滴静注100
0mg(40mL) 1000mg Day1

レジメン名: ガザイバ+CVP療法(1コース目)

H-180 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day1

2 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1

3 ガザイバ点滴静注100
0mg(40mL) 1000mg Day1 Day8 Day15

レジメン名: ガザイバ+CVP療法(2コース目以降)

H-181 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day1

2 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1

3 ガザイバ点滴静注100
0mg(40mL) 1000mg Day1

レジメン名: ガザイバ+ベンダムステン療法(1コース目)

H-182 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 トレアキシン点滴静注
用 90mg/m² Day1 Day2

2 ガザイバ点滴静注(10
00mg/40mL) 1000mg Day1 Day8 Day15

レジメン名: ガザイバ+ベンダムステン療法(2コース目以降)

H-183 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 トレアキシン点滴静注
用 90mg/m² Day1 Day2

2 ガザイバ点滴静注(10
00mg/40mL) 1000mg Day1

レジメン名: ガザイバ維持療法

H-184 2:悪性リンパ腫 2:NHL(first line)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 56 日間

1 ガザイバ点滴静注100
0mg(40mL) 1000mg Day1

レジメン名: Bendamustine(トレアキシン)単独療法

H-185 2:悪性リンパ腫 3:NHL(salvage)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 トレアキシン点滴静注
用 120mg/m² Day1 Day2

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
・バラブラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: BV(アドセトリス)単独療法

H-186	2: 悪性リンパ腫	3: NHL(salvage)	2	パラプラチン注射液	AUC=5 Day1
薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間

1 アドセトリス点滴静注 1.8mg/kg Day1

2

3 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day8

レジメン名: Dex-MEAM

H-187	2: 悪性リンパ腫	3: NHL(salvage)	2	注射用イホマイド	1.63g/m ² Day1 Day2 Day3
薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間

1 注射用サイメリン 60mg/m² Day12 アルケラン静注 20mg/m² Day23 ラステット注 75mg/m² Day3 Day4 Day5 Day64 キロサイド注 100mg/m² Day3 Day4 Day5 Day6

レジメン名: ICE(Hertzberg)

H-192	2: 悪性リンパ腫	3: NHL(salvage)	2	ロイスタチン注	5mg/m ² Day1 Day2 Day3
薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間

1

2 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3

3 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: R-CdM

H-193	2: 悪性リンパ腫	3: NHL(salvage)	2	ノバントロン注	12mg/m ² Day1
薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間

1

2

3 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: DHAP療法

H-188	2: 悪性リンパ腫	3: NHL(salvage)	2	注射用エンドキサン	750mg/m ² Day5
薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間

1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 100mg/m² Day12 キロサイド注 2000mg/m² Day2

レジメン名: R-Dex-MEAM

H-194	2: 悪性リンパ腫	3: NHL(salvage)	2	注射用エンドキサン	750mg/m ² Day5
薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間

1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day12 注射用サイメリン 60mg/m² Day23 アルケラン静注 20mg/m² Day34 ラステット注 75mg/m² Day4 Day5 Day6 Day7

レジメン名: EPOCH

H-189	2: 悪性リンパ腫	3: NHL(salvage)	2	キロサイド注	100mg/m ² Day4 Day5 Day6 Day7
薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間

1 ラステット注 50mg/m² Day1 Day2 Day3 Day42 ドキソルビシン塩酸塩注射液 10mg/m² Day1 Day2 Day3 Day43 オンコピン注射用 0.4mg/m² Day1 Day2 Day3 Day44 注射用エンドキサン 750mg/m² Day5

レジメン名: GCD

H-190	2: 悪性リンパ腫	3: NHL(salvage)	2	ゲムシタピン点滴静注用「ヤカルト」	1000mg/m ² Day1 Day8
薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間

1

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

5 キロサイド注 100mg/m² Day4 Day5 Day6 Day7

レジメン名: R-EPOCH(level 1)

H-195	2: 悪性リンパ腫	3: NHL(salvage)	2	注射用「ヤカルト」	1000mg/m ² Day1 Day8
薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間

1 ラステット注 50mg/m² Day1 Day2 Day3 Day42 ドキソルビシン塩酸塩注射液 10mg/m² Day1 Day2 Day3 Day43 オンコピン注射用 0.4mg/m² Day1 Day2 Day3 Day44 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: GCD-R

H-191	2: 悪性リンパ腫	3: NHL(salvage)	2	注射用「ヤカルト」	1000mg/m ² Day1 Day8
薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間

1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
 ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
 ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室
 TEL:03-3353-8112(内線33121)

5 注射用エンドキサン 750mg/m² Day52 オンコピン注射用 0.2mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4**レジメン名: R-EPOCH(level 2)**

H-196 2:悪性リンパ腫 3:NHL(salvage)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day12 ラステット注 30mg/m² Day1 Day2 Day3 Day43 オンコピン注射用 0.2mg/m² Day1 Day2 Day3 Day44 ドキソルビシン塩酸塩注射液 6mg/m² Day1 Day2 Day3 Day45 注射用エンドキサン 900mg/m² Day5**レジメン名: R-EPOCH(level 3)**

H-197 2:悪性リンパ腫 3:NHL(salvage)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day12 ラステット注 36mg/m² Day1 Day2 Day3 Day43 オンコピン注射用 0.2mg/m² Day1 Day2 Day3 Day44 ドキソルビシン塩酸塩注射液 7.2mg/m² Day1 Day2 Day3 Day45 注射用エンドキサン 1080mg/m² Day5**レジメン名: R-EPOCH(level 4)**

H-198 2:悪性リンパ腫 3:NHL(salvage)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day12 ラステット注 43.2mg/m² Day1 Day2 Day3 Day43 オンコピン注射用 0.2mg/m² Day1 Day2 Day3 Day44 ドキソルビシン塩酸塩注射液 8.65mg/m² Day1 Day2 Day3 Day45 注射用エンドキサン 1296mg/m² Day5**レジメン名: R-EPOCH(level 5)**

H-199 2:悪性リンパ腫 3:NHL(salvage)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 ラステット注 51.85mg/m² Day1 Day2 Day3 Day43 ドキソルビシン塩酸塩注射液 10.35mg/m² Day1 Day2 Day3 Day44 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day15 注射用エンドキサン 1555mg/m² Day5**レジメン名: R-EPOCH(level 6)**

H-200 2:悪性リンパ腫 3:NHL(salvage)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 ラステット注 62.2mg/m² Day1 Day2 Day3 Day42 オンコピン注射用 0.2mg/m² Day1 Day2 Day3 Day43 ドキソルビシン塩酸塩注射液 12.4mg/m² Day1 Day2 Day3 Day44 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day15 注射用エンドキサン 1866mg/m² Day5**レジメン名: R-FCM**

H-201 2:悪性リンパ腫 3:NHL(salvage)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day12 フルダラ静注用 25mg/m² Day1 Day2 Day33 注射用エンドキサン 200mg/m² Day1 Day2 Day34 ノバントロン注 8mg/m² Day1**レジメン名: R-GDP療法**

H-202 2:悪性リンパ腫 3:NHL(salvage)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day82 シスプラチン点滴静注「マルコ」 75mg/m² Day13 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1**レジメン名: R-ICE(Hertzberg)**

H-203 2:悪性リンパ腫 3:NHL(salvage)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先:東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

2 注射用イホマイド 1.63g/m² Day2 Day3 Day43 ラステット注 100mg/m² Day2 Day3 Day4

4 パラプラチン注射液 AUC=5 Day2

レジメン名: Zevalin(ゼヴァリン)111In+90YH-204 2:悪性リンパ腫 3:NHL(salvage)
薬剤 用量 投与日 コース期間: 8 日間1 リツキサン点滴静注 250mg/m² Day1 Day82 ゼヴァリン インジウム
(111In)静注用 130MBq Day13 ゼヴァリン イットリウム
(90Y)静注用 14.8MBq/kg Day8**レジメン名: HD-Ara-C(Nordic)**H-205 2:悪性リンパ腫 4:Mantle
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間1 キロサイド注 3000mg/m² Day1 Day22 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1**レジメン名: R-maxi CHOP**H-206 2:悪性リンパ腫 4:Mantle
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間1 注射用エンドキサン 1200mg/m² Day12 ドキソルビシン塩酸塩
注射液 75mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 2mg Day1

4 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1**レジメン名: VR-CAP療法(静注)**H-207 2:悪性リンパ腫 4:Mantle
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day12 ドキソルビシン塩酸塩
注射液 50mg/m² Day13 ベルケイド注射用 1.3mg/m² Day1 Day4 Day8 Day114 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1**レジメン名: VR-CAP療法(皮下注)**H-208 2:悪性リンパ腫 4:Mantle
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day12 ドキソルビシン塩酸塩
注射液 50mg/m² Day13 ベルケイド注射用 1.3mg/m² Day1 Day4 Day8 Day114 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1**レジメン名: R-CODOX-M療法(1回目:高リスク・CNS-)**H-209 2:悪性リンパ腫 5:Burkitt lymphoma
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間1 注射用エンドキサン 800mg/m² Day1 Day22 ドキソルビシン塩酸塩
注射液 50mg/m² Day13 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1 Day10

4 キロサイド注 50mg Day1 Day3

6 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day37 メソトレキセート注射液 540mg/m² Day108 メソトレキセート注射液 2460mg/m² Day10

8 メソトレキセート注射液 12mg Day1

レジメン名: R-CODOX-M療法(1回目:高リスク・CNS+)H-210 2:悪性リンパ腫 5:Burkitt lymphoma
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間1 注射用エンドキサン 800mg/m² Day1 Day22 ドキソルビシン塩酸塩
注射液 50mg/m² Day13 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1 Day10

4 キロサイド注 50mg Day1 Day3 Day5

6 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day37 メソトレキセート注射液 540mg/m² Day10

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先:東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

8 メソトレキセート注射液 2460mg/m² Day10

8 メソトレキセート注射液 12mg Day1 Day10

レジメン名: R-CODOX-M療法(1回目:低リスク)

H-211 2:悪性リンパ腫 5:Burkitt lymphoma
薬剤 用量 投与日 **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 800mg/m² Day1 Day2

2 ドキソルピシン塩酸塩注射液 50mg/m² Day1

3 オンコビン注射用 1.4mg/m² Day1 Day10

4 キロサイド注 50mg Day1

6 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day3

7 メソトレキセート注射液 540mg/m² Day10

8 メソトレキセート注射液 2460mg/m² Day10

8 メソトレキセート注射液 12mg Day1

レジメン名: R-CODOX-M療法(2,3回目:低リスク)

H-212 2:悪性リンパ腫 5:Burkitt lymphoma
薬剤 用量 投与日 **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 800mg/m² Day1 Day2

2 キロサイド注 50mg Day1

3 メソトレキセート注射液 12mg Day1

4 ドキソルピシン塩酸塩注射液 50mg/m² Day1

6 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

7 メソトレキセート注射液 540mg/m² Day10

8 メソトレキセート注射液 2460mg/m² Day10

8 オンコビン注射用 1.4mg/m² Day1 Day10

レジメン名: R-CODOX-M療法(2回目:高リスクCNS+/ー)

H-213 2:悪性リンパ腫 5:Burkitt lymphoma
薬剤 用量 投与日 **コース期間: 21 日間**

1 注射用エンドキサン 800mg/m² Day1 Day2

2 キロサイド注 50mg Day1 Day3

3 メソトレキセート注射液 12mg Day1

4 ドキソルピシン塩酸塩注射液 50mg/m² Day1

6 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

7 メソトレキセート注射液 540mg/m² Day10

8 メソトレキセート注射液 2460mg/m² Day10

8 オンコビン注射用 1.4mg/m² Day1 Day10

レジメン名: R-IVAC療法(1,2回目:高リスク・CNS-)

H-214 2:悪性リンパ腫 5:Burkitt lymphoma
薬剤 用量 投与日 **コース期間: 21 日間**

1 キロサイド注 2000mg/m² Day1 Day2

2 注射用イホマイド 1.5g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

3 ラステット注 60mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

4 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

5 メソトレキセート注射液 12mg Day5

レジメン名: R-IVAC療法(1回目:高リスク・CNS+)

H-215 2:悪性リンパ腫 5:Burkitt lymphoma
薬剤 用量 投与日 **コース期間: 21 日間**

1 キロサイド注 2000mg/m² Day1 Day2

2 注射用イホマイド 1.5g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

3 ラステット注 60mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

4 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

6 メソトレキセート注射液 12mg Day5

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
 ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
 ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先:東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室
 TEL:03-3353-8112(内線33121)

6 キロサイド注 50mg Day3 Day5

レジメン名: R-IVAC療法(2回目:高リスク-CNS+)

H-216 2:悪性リンパ腫 5:Burkitt lymphoma
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間1 キロサイド注 2000mg/m² Day1 Day2
2 注射用イホマイド 1.5g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
3 ラステット注 60mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day54 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

5 メソトレキセート注射液 12mg Day5

レジメン名: CNSリンパ腫(Bonn Cycle A)

H-217 2:悪性リンパ腫 6:CNS lymphoma
薬剤 用量 投与日 コース期間: 5 日間1 メソトレキセート注射液 4500mg/m² Day12 メソトレキセート注射液 500mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 2mg Day1

4 メソトレキセート注射液 3mg Day1 Day2 Day3 Day4

6 キロサイド注 30mg Day5

6 注射用イホマイド 0.8g/m² Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: CNSリンパ腫(Bonn Cycle B)

H-218 2:悪性リンパ腫 6:CNS lymphoma
薬剤 用量 投与日 コース期間: 19 日間

1 オンコピン注射用 2mg Day1

2 メソトレキセート注射液 3mg Day1 Day2 Day3 Day4

3 メソトレキセート注射液 500mg/m² Day14 メソトレキセート注射液 4500mg/m² Day1

6 キロサイド注 30mg Day5

6 注射用エンドキサン 200mg/m² Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: CNSリンパ腫(Bonn Cycle C)

H-219 2:悪性リンパ腫 6:CNS lymphoma
薬剤 用量 投与日 コース期間: 19 日間1 キロサイド注 3000mg/m² Day1 Day2

2 注射用フィルデシン(3mg)V 5mg Day1

3 メソトレキセート注射液 3mg Day3 Day4 Day5 Day6

4 キロサイド注 30mg Day7

レジメン名: GYVE療法

H-220 2:悪性リンパ腫 6:CNS lymphoma
薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間1 キロサイド注 50mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 キロサイド注 2000mg/m² Day2 Day3 Day4 Day53 ラステット注 200mg/m² Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: Elderly PCNSL 維持(Hoang-Xuan)

H-221 2:悪性リンパ腫 6:CNS lymphoma
薬剤 用量 投与日 コース期間: 42 日間1 メソトレキセート注射液 200mg/m² Day12 注射用サイメリン 40mg/m² Day13 メソトレキセート注射液 800mg/m² Day1

4 メソトレキセート注射液 15mg Day1

5 キロサイド注 40mg Day1

レジメン名: Elderly PCNSL 導入(Hoang-Xuan)

H-222 2:悪性リンパ腫 6:CNS lymphoma
薬剤 用量 投与日 コース期間: 41 日間1 メソトレキセート注射液 200mg/m² Day1 Day10 Day202 注射用サイメリン 40mg/m² Day13 メソトレキセート注射液 800mg/m² Day1 Day10 Day20

4 メソトレキセート注射液 15mg Day1 Day5 Day10 Day15

5 キロサイド注 40mg Day1 Day5 Day10 Day15

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先:東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: R-MVP(リツキサン375mg/m²)

H-223 2: 悪性リンパ腫 6: CNS lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

2 メトレキセート注射液 3500mg/m² Day2

3 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day2

レジメン名: GMD療法(GPT-11+MIT+DEX)

H-224 2: 悪性リンパ腫 7: T, NK cell lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 カンプト点滴静注 25mg/m² Day1 Day2

2 ノバントロン注 8mg/m² Day3

レジメン名: GMED(GPA+MTX+ETP+DEX)療法

H-225 2: 悪性リンパ腫 7: T, NK cell lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 メトレキセート注射液 300mg/m² Day1

2 注射用エンドキサン 2000mg/m² Day1

3 ラステット注 400mg/m² Day1 Day2

レジメン名: RT-2/3DeVIC療法

H-226 2: 悪性リンパ腫 7: T, NK cell lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 パラプラチン注射液 200mg/m² Day1

2 ラステット注 67mg/m² Day1 Day2 Day3

3 注射用イホマイド 1g/m² Day1 Day2 Day3

レジメン名: SMILE療法

H-227 2: 悪性リンパ腫 7: T, NK cell lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 メトレキセート注射液 2000mg/m² Day1

2 ラステット注 100mg/m² Day2 Day3 Day4

3 注射用イホマイド 1.5g/m² Day2 Day3 Day4

4 ロイナーゼ注用 6000単位/m² Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20

レジメン名: プラトレキサート療法

H-228 2: 悪性リンパ腫 7: T, NK cell lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 49 日間**

1 ジフォルタ注射液 30mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36

レジメン名: ロミデプシン療法

H-229 2: 悪性リンパ腫 7: T, NK cell lymphoma
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 イストダックス点滴静注用 14mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: LSG15

H-230 2: 悪性リンパ腫 8: ATLL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 注射用エンドキサン 350mg/m² Day1

2 ドキソルビシン塩酸塩注射液 40mg/m² Day1

3 オンコピン注射用 1mg/m² Day1

4 注射用サイメリン 60mg/m² Day8

6 ラステット注 100mg/m² Day15 Day16 Day17

7 パラプラチン注射液 250mg/m² Day15

8 注射用フィルデシン(3mg)V 2.4mg/m² Day15

8 ドキソルビシン塩酸塩注射液 30mg/m² Day8

レジメン名: Mogamulizumab(ポテリジオ)単独療法

H-231 2: 悪性リンパ腫 8: ATLL
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 63 日間**

1 ポテリジオ点滴静注 1mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50

レジメン名: MTX硝子体内注射(1回/月)(右)

H-232 2: 悪性リンパ腫 9: 硝子体注
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 メトレキセート注射液 0.4mg Day1

レジメン名: MTX硝子体内注射(1回/月)(左)

H-233 2: 悪性リンパ腫 9: 硝子体注
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 メトレキセート注射液 0.4mg Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: MTX硝子体内注射(1回/週)(右)

H-234 2:悪性リンパ腫 9:硝子体注
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 28 **日間**

1 メソトレキセート注射液 0.4mg Day1 Day8 Day15 Day22

レジメン名: MTX硝子体内注射(1回/週)(左)

H-235 2:悪性リンパ腫 9:硝子体注
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 28 **日間**

1 メソトレキセート注射液 0.4mg Day1 Day8 Day15 Day22

レジメン名: MTX硝子体内注射(2回/週)(右)

H-236 2:悪性リンパ腫 9:硝子体注
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 14 **日間**

1 メソトレキセート注射液 0.4mg Day1 Day4 Day8 Day11

レジメン名: MTX硝子体内注射(2回/週)(左)

H-237 2:悪性リンパ腫 9:硝子体注
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 14 **日間**

1 メソトレキセート注射液 0.4mg Day1 Day4 Day8 Day11

レジメン名: Bortezomib静注(1-8コース:週2回)

H-238 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 21 **日間**

1 ベルケイド注射用 1.3mg/m² Day1 Day4 Day8 Day11

レジメン名: Bortezomib静注(9コース以降:週1回)

H-239 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 35 **日間**

1 ベルケイド注射用 1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22

レジメン名: Bortezomib皮下(1-8コース:週2回)

H-240 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 21 **日間**

1 ベルケイド注射用 1.3mg/m² Day1 Day4 Day8 Day11

レジメン名: Bortezomib皮下(9コース以降:週1回)

H-241 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 35 **日間**

1 ベルケイド注射用 1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22

レジメン名: GED療法(GPA+ETP+DEX)

H-242 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 28 **日間**

1 注射用エンドキサン 400mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4

2 ラステット注 40mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4

レジメン名: DBd療法(1コース)

H-243 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 21 **日間**

1 ダラザレックス点滴静注 16mg/kg Day1 Day8 Day15

2 ベルケイド注射用 1.3mg/m² Day1 Day4 Day8 Day11

レジメン名: DBd療法(2~3コース)

H-244 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 21 **日間**

1 ダラザレックス点滴静注 16mg/kg Day1 Day8 Day15

2 ベルケイド注射用 1.3mg/m² Day1 Day4 Day8 Day11

レジメン名: DBd療法(4~8コース)

H-245 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 21 **日間**

1 ダラザレックス点滴静注 16mg/kg Day1

2 ベルケイド注射用 1.3mg/m² Day1 Day4 Day8 Day11

レジメン名: DBd療法(9コース目以降)

H-246 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 28 **日間**

1 ダラザレックス点滴静注 16mg/kg Day1

レジメン名: DLd療法(1コース)

H-247 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 28 **日間**

1 ダラザレックス点滴静注 16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22

レジメン名: DLd療法(2コース)

H-248 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 28 **日間**

1 ダラザレックス点滴静注 16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22

レジメン名: DLd療法(3~6コース)

H-249 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 28 **日間**

1 ダラザレックス点滴静注 16mg/kg Day1 Day15

レジメン名: DLd療法(7コース目以降)

H-250 3:多発性骨髄腫
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間:** 28 **日間**

1 ダラザレックス点滴静注 16mg/kg Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
 ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
 ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先:東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: ERd療法(1-2コース)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
H-251 3:多発性骨髄腫					
1 エムブリシチ点滴静注用	10mg/kg	Day1 Day8 Day15 Day22			

レジメン名: VAD療法(Out patient)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	24	日間
H-259 3:多発性骨髄腫					
1 オンコピン注射用	0.4mg	Day1 Day2 Day3 Day4			

レジメン名: ERd療法(3コース以降)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
H-252 3:多発性骨髄腫					
1 エムブリシチ点滴静注用	10mg/kg	Day1 Day15			

2 ドキソルビシン塩酸塩注射液	9mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4			
-----------------	--------------------	---------------------	--	--	--

レジメン名: AZA(ビダーザ)療法(点滴静注)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
H-260 4:骨髄異形成症候群					
1 ビダーザ注射用	75mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7			

レジメン名: Kd療法(1コース目)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
H-253 3:多発性骨髄腫					
1 カイブロリス点滴静注用	20mg/m ²	Day1 Day2			

レジメン名: AZA(ビダーザ)療法(皮下注射)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
H-261 4:骨髄異形成症候群					
1 ビダーザ注射用	75mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7			

レジメン名: Kd療法(2コース目以降)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
H-254 3:多発性骨髄腫					
1 カイブロリス点滴静注用	56mg/m ²	Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16			

レジメン名: JALSG-MDS200寛解導入療法(CA療法)15-69才

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
H-262 4:骨髄異形成症候群					
1 キロサイド注	10mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14			

レジメン名: KRd療法(13コース目以降)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
H-255 3:多発性骨髄腫					
1 カイブロリス点滴静注用	27mg/m ²	Day1 Day2 Day15 Day16			

2 アクラシノン注射用	14mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4			
-------------	---------------------	---------------------	--	--	--

レジメン名: KRd療法(1コース目)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
H-256 3:多発性骨髄腫					
1 カイブロリス点滴静注用	20mg/m ²	Day1 Day2			

レジメン名: JALSG-MDS200寛解導入療法(CA療法)70才以上

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
H-263 4:骨髄異形成症候群					
1 キロサイド注	10mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14			

レジメン名: KRd療法(2~12コース目)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
H-257 3:多発性骨髄腫					
1 カイブロリス点滴静注用	27mg/m ²	Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16			

2 アクラシノン注射用	10mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4			
-------------	---------------------	---------------------	--	--	--

レジメン名: High dose ETP療法(PBSCC)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	4	日間
H-264 5:造血幹細胞移植					
1 ラステット注	125mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4			

レジメン名: ROAD療法

薬剤	用量	投与日	コース期間:	22	日間
H-258 3:多発性骨髄腫					
1 注射用サイメリン	40mg/m ²	Day1			

レジメン名: JALSG-APL205R(HD-Ara-C)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	4	日間
H-265 5:造血幹細胞移植					
1 キロサイド注	2000mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4			

レジメン名: ROAD療法

2 オンコピン注射用	1.2mg/m ²	Day1			
------------	----------------------	------	--	--	--

レジメン名: 中等量CY療法(PBSCC)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
H-266 5:造血幹細胞移植					
1 注射用エンドキサン	3000mg/m ²	Day1			

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。 問い合わせ先:東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室
 ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。 ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。 TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: short MTX(15-10-10)

H-267 5:造血幹細胞移植 2:GVHD予防
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 11 日間**

- 1 メソトレキセート注射液 15mg/m² Day1
- 2 メソトレキセート注射液 10mg/m² Day3 Day6 Day11

レジメン名: Flu+Bu12.8(+TBI)

H-273 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 6 日間**

- 1 フルダラ静注用 30mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6
- 2 ブスルフェクス点滴静注用 3.2mg/kg Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: BU+L-PAM

H-268 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 5 日間**

- 1 ブスルフェクス点滴静注用 3.2mg/kg Day1 Day2 Day3
- 2 アルケラン静注用 70mg/m² Day4 Day5

レジメン名: Flu+Bu12.8(+TBI)-PostCY(MAC)

H-274 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 11 日間**

- 1 ブスルフェクス点滴静注用 3.2mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4
- 2 フルダラ静注用 30mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: CY+TBI

H-269 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 2 日間**

- 1 注射用エンドキサン 60mg/kg Day1 Day2

レジメン名: Flu+Bu6.4(+TBI)-PostCY(RIG)

H-275 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 11 日間**

- 1 フルダラ静注用 30mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
- 2 ブスルフェクス点滴静注用 3.2mg/kg Day3 Day4
- 3 注射用エンドキサン 40mg/kg Day10 Day11

レジメン名: FGA

H-270 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 4 日間**

- 1 フルダラ静注用 30mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4
- 2 注射用エンドキサン 300mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4
- 3 サイモグロリン点滴静注用(要フィルター) 2.5mg Day1
- 4 サイモグロリン点滴静注用(要フィルター) 3.75mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4

レジメン名: FLU+CY+ATG(若年者)

H-276 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 20 日間**

- 1 フルダラ静注用 30mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4
- 2 サイモグロリン点滴静注用25mg(要フィルター) 2.5mg Day1
- 3 サイモグロリン点滴静注用25mg(要フィルター) 0.001mg Day1
- 4 サイモグロリン点滴静注用25mg(要フィルター) 2.5mg/kg Day2
- 5 注射用エンドキサン 60mg/kg Day3 Day4

レジメン名: Flu(+TBI)-PostCY(MAC)

H-271 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 11 日間**

- 1 フルダラ静注用 30mg/m² Day1 Day2 Day3
- 2 注射用エンドキサン 50mg/kg Day10 Day11

レジメン名: Flu+Bu(静注)

H-272 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 6 日間**

- 1 フルダラ静注用 30mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6
- 2 ブスルフェクス点滴静注用 3.2mg/kg Day3 Day4

レジメン名: Flu+MEL(+TBI)

H-277 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 7 日間**

- 1 フルダラ静注用 30mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
- 2 アルケラン静注用 80mg/m² Day6

※注意点

- ・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先:東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: Flu+MEL140(+TBI)

H-278 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間1 フルダラ静注用 30mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 アルケラン静注用 70mg/m² Day6 Day7

2 キロサイド注 40mg Day1

レジメン名: Adriamycin(ドキシソルビシン)単独療法

H-285 7:その他
薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間1 ドキシソルビシン塩酸塩注射液 50mg/m² Day1

レジメン名: JALSG-APL205R(経口Bu+MEL)

H-279 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 用量 投与日 コース期間: 2 日間1 アルケラン静注用 70mg/m² Day1 Day2

レジメン名: Tocilizumab(アクテムラ)単独療法

H-286 7:その他
薬剤 用量 投与日 コース期間: 14 日間

1 アクテムラ点滴静注用 8mg/kg Day1

レジメン名: MEAM療法

H-280 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 用量 投与日 コース期間: 32 日間1 注射用サイメリン 300mg/m² Day12 キロサイド注 200mg/m² Day2 Day3 Day4 Day53 ラステット注 200mg/m² Day2 Day3 Day4 Day54 アルケラン静注用 140mg/m² Day6

レジメン名: Vincristine(オンコビン)単独療法

H-287 7:その他
薬剤 用量 投与日 コース期間: 7 日間1 オンコビン注射用 1.4mg/m² Day1

レジメン名: Vindesine(フィルデシン)単独療法

H-288 7:その他
薬剤 用量 投与日 コース期間: 7 日間1 注射用フィルデシン(3mg)V 2.1mg/m² Day1

レジメン名: MEL200

H-281 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 用量 投与日 コース期間: 2 日間1 アルケラン静注用 100mg/m² Day1 Day2

レジメン名: リツキシマブ療法(ITP)

H-289 7:その他
薬剤 用量 投与日 コース期間: 22 日間1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22

レジメン名: TBI+CPA+ETP

H-282 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 用量 投与日 コース期間: 4 日間

1 ラステット注 15mg/kg Day1 Day2

2 注射用エンドキサン 60mg/kg Day3 Day4

レジメン名: リツキシマブ療法(TTP)

H-290 7:その他
薬剤 用量 投与日 コース期間: 22 日間1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22

レジメン名: 静注用Bu+CY(移植前処置)

H-283 5:造血幹細胞移植 3:前処置
薬剤 用量 投与日 コース期間: 6 日間

1 ブスルフェクス点滴静注用 3.2mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4

2 注射用エンドキサン 60mg/kg Day5 Day6

レジメン名: 髄注(MTX10, Ara-C40, PSL10)

H-284 6:髄注
薬剤 用量 投与日 コース期間: 3 日間

1 メソレキセート注射液 10mg Day1

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

I 大腸癌

レジメン名: CAPIRI療法+Bevacizumab

I-291 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 アバスチン点滴静注 7.5mg/kg Day1

2 カンプト点滴静注 200mg/m² Day1

レジメン名: GPT-11/5-FU/I-LV

I-292 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 カンプト点滴静注 80mg/m² Day1 Day82 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 250mg/m² Day1 Day83 5-FU注 500mg/m² Day1 Day8

レジメン名: CPT-11/UFT/UZEL(3投1休)

I-293 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 カンプト点滴静注 80mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: CPT-11+セツキシマブ(継続)

I-294 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 アービタックス注射液 250mg/m² Day1 Day82 カンプト点滴静注 150mg/m² Day1

レジメン名: CPT-11+セツキシマブ(初回)

I-295 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 アービタックス注射液 400mg/m² Day12 カンプト点滴静注 150mg/m² Day13 アービタックス注射液 250mg/m² Day8

レジメン名: CPT-11+ペバシズマブ療法

I-296 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 アバスチン点滴静注 10mg/kg Day1

2 カンプト点滴静注 150mg/m² Day1

レジメン名: CPT-11単独(2回/月)

I-297 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 カンプト点滴静注 150mg/m² Day1 Day15

レジメン名: FOLFIRI

I-298 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 200mg/m² Day12 カンプト点滴静注 150mg/m² Day13 5-FU注 400mg/m² Day14 5-FU注 2400mg/m² Day1

レジメン名: FOLFIRI+Afibercept

I-299 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 ザルトラップ点滴静注 4mg/kg Day1

2 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 200mg/m² Day13 カンプト点滴静注 150mg/m² Day14 5-FU注 400mg/m² Day15 5-FU注 2400mg/m² Day1

レジメン名: FOLFIRI+Ramucirumab

I-300 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 サイラムザ点滴静注 8mg/kg Day1

2 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 200mg/m² Day13 カンプト点滴静注 150mg/m² Day14 5-FU注 400mg/m² Day15 5-FU注 2400mg/m² Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: FOLFIRI+セツキシマブ(2回目以降)

I-301 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	カンプト点滴静注	150mg/m ² Day1			
2	アービタックス注射液	250mg/m ² Day1 Day8			
3	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200mg/m ² Day1			
4	5-FU注	400mg/m ² Day1			
5	5-FU注	2400mg/m ² Day1			

2 レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 200mg/m² Day13 カンプト点滴静注 150mg/m² Day14 5-FU注 400mg/m² Day15 5-FU注 2400mg/m² Day1

レジメン名: FOLFIRI+ペバシズマブ(5)

I-305 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	アバステン点滴静注用	5mg/kg Day1			

レジメン名: FOLFIRI+セツキシマブ(初回)

I-302 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	カンプト点滴静注	150mg/m ² Day1			
2	アービタックス注射液	400mg/m ² Day1			
3	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200mg/m ² Day1			
4	5-FU注	400mg/m ² Day1			
6	アービタックス注射液	250mg/m ² Day8			
6	5-FU注	2400mg/m ² Day1			

2 レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 200mg/m² Day13 カンプト点滴静注 150mg/m² Day14 5-FU注 400mg/m² Day15 5-FU注 2400mg/m² Day1レジメン名: IRIS(CPT-11 125mg/m²+TS-1 2投2休)

I-306 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	カンプト点滴静注	125mg/m ² Day1 Day15			

レジメン名: IRIS(CPT-11 125mg/m²+TS-1 2投2休)+ペバシズマブ療法

I-307 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	アバステン点滴静注用	5mg/kg Day1 Day15			
2	カンプト点滴静注	125mg/m ² Day1 Day15			

レジメン名: FOLFIRI+パニツマブ

I-303 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg Day1			
2	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200mg/m ² Day1			
3	カンプト点滴静注	150mg/m ² Day1			
4	5-FU注	400mg/m ² Day1			
5	5-FU注	2400mg/m ² Day1			

レジメン名: IRIS(CPT-11 150mg/m²+TS-1 2投1休)

I-308 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	カンプト点滴静注	150mg/m ² Day1			

レジメン名: FOLFOXIRI

I-309 オキサリプラチン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200mg/m ² Day1			
2	エルプラット点滴静注液	85mg/m ² Day1			

レジメン名: FOLFIRI+ペバシズマブ(10)

I-304 イリノテカン

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	アバステン点滴静注用	10mg/kg Day1			

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
 ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
 ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

3 5-FU注 3200mg/m² Day14 カンプト点滴静注 150mg/m² Day1**レジメン名: mFOLFOX6**

I-310 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**1 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 200mg/m² Day12 エルブラット点滴静注液 85mg/m² Day13 5-FU注 400mg/m² Day14 5-FU注 2400mg/m² Day1**レジメン名: mFOLFOX6+セツキシマブ(2回目以降)**

I-311 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**1 エルブラット点滴静注液 85mg/m² Day12 アービタックス注射液 250mg/m² Day1 Day83 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 200mg/m² Day14 5-FU注 400mg/m² Day15 5-FU注 2400mg/m² Day1**レジメン名: mFOLFOX6+セツキシマブ(初回)**

I-312 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**1 エルブラット点滴静注液 85mg/m² Day12 アービタックス注射液 400mg/m² Day13 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 200mg/m² Day14 5-FU注 400mg/m² Day16 アービタックス注射液 250mg/m² Day86 5-FU注 2400mg/m² Day1**レジメン名: mFOLFOX6+パニツムマブ**

I-313 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 ベクティビックス点滴静注 6mg/kg Day1

2 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 200mg/m² Day13 エルブラット点滴静注液 85mg/m² Day14 5-FU注 400mg/m² Day15 5-FU注 2400mg/m² Day1**レジメン名: mFOLFOX6+ペバシズマブ(10)**

I-314 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 アバステン点滴静注 10mg/kg Day1

2 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 200mg/m² Day13 エルブラット点滴静注液 85mg/m² Day14 5-FU注 400mg/m² Day15 5-FU注 2400mg/m² Day1**レジメン名: mFOLFOX6+ペバシズマブ(5)**

I-315 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 アバステン点滴静注 5mg/kg Day1

2 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 200mg/m² Day13 エルブラット点滴静注液 85mg/m² Day14 5-FU注 400mg/m² Day15 5-FU注 2400mg/m² Day1**レジメン名: mFOLFOX7間欠投与+ペバシズマブ**

I-316 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 アバステン点滴静注 5mg/kg Day1

2 レボホリナート点滴静注「ヤクルト」 200mg/m² Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・バラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

3 エルブラット点滴静注液 85mg/m² Day1

4 5-FU注 2400mg/m² Day1

レジメン名: SOX(2週1休)

I-317 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 エルブラット点滴静注液 130mg/m² Day1

レジメン名: SOX(2週2休)

I-318 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 エルブラット点滴静注液 85mg/m² Day1 Day15

レジメン名: SOX+Bev療法

I-319 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 アバステン点滴静注用 7.5mg/kg Day1

2 エルブラット点滴静注液 130mg/m² Day1

レジメン名: TEGAFOX

I-320 オキサリプラチン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 35 日間**

1 エルブラット点滴静注液 70mg/m² Day1 Day15

レジメン名: 5-FU+MMC

I-321 フッ化ピリミジン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 マイトマイシン注 10mg/m² Day1

2 5-FU注 500mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4

レジメン名: F-I療法(5投1休)

I-322 フッ化ピリミジン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 42 日間**

1 レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 250mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29

2 5-FU注 500mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29

レジメン名: FP療法(肛門管癌)

I-323 フッ化ピリミジン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 5-FU注 500mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

2 シスプラチン点滴静注「マルコ」 100mg/m² Day1

レジメン名: sLV5FU2

I-324 フッ化ピリミジン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 200mg/m² Day1

2 5-FU注 400mg/m² Day1

3 5-FU注 2400mg/m² Day1

レジメン名: sLV5FU2+ペバシズマブ

I-325 フッ化ピリミジン

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 アバステン点滴静注用 5mg/kg Day1

2 レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 200mg/m² Day1

3 5-FU注 400mg/m² Day1

4 5-FU注 2400mg/m² Day1

レジメン名: XELOX(カペシタピン 2投1休)

I-326 フッ化ピリミジン(カペシタピン)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 エルブラット点滴静注液 130mg/m² Day1

レジメン名: XELOX+ペバシズマブ(7.5)

I-327 フッ化ピリミジン(カペシタピン)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 アバステン点滴静注用 7.5mg/kg Day1

2 エルブラット点滴静注液 130mg/m² Day1

レジメン名: カペシタピン+ペバシズマブ(7.5)

I-328 フッ化ピリミジン(カペシタピン)

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 アバステン点滴静注用 7.5mg/kg Day1

レジメン名: セツキシマブ単剤(2回目以降)

I-329 分子標的単剤

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 7 日間**

1 アービタックス注射液 250mg/m² Day1

レジメン名: セツキシマブ単剤(初回)

I-330 分子標的単剤

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 7 日間**

1 アービタックス注射液 400mg/m² Day1

※注意点

- ・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- ・バラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: パニツムマブ(単剤)

I-331 分子標的単剤

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg Day1			

J 胆道癌

レジメン名: Gemcitabine/Cisplatin

J-332

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ゲムシタビン点滴静注 用「ヤクルト」	1000mg/m ² Day1 Day8			
2	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	25mg/m ² Day1 Day8			

レジメン名: S-1+シスプラチン(day1,8:胆道)

J-333

薬剤	用量	投与日	コース期間:	35	日間
1	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	30mg/m ² Day1 Day8			

レジメン名: SOX(隣・胆道癌)

J-334

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	エルプラット点滴静注液	100mg/m ² Day1			

レジメン名: TS-1+ジェムシタピンDay1,8(胆道癌)

J-335

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ゲムシタビン点滴静注 用「ヤクルト」	1000mg/m ² Day1 Day8			

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- バラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

K 頭頸部癌

レジメン名: CBDCA、5-FU

K-336

薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間
1 パラプラチン注射液	AUC=5 Day1	
2 5-FU注	800mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6	

レジメン名: GF療法(high)

K-338

薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間
1 シスプラチン点滴静注「マルコ」	100mg/m ² Day1	
2 5-FU注	800mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6	

レジメン名: GF療法(low)

K-339

薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間
1 シスプラチン点滴静注「マルコ」	60mg/m ² Day1	
2 5-FU注	600mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6	

レジメン名: GRT(TXT)

K-340

薬剤	用量 投与日	コース期間: 7 日間
1 ドセタキセル点滴静注用	15mg Day1	

レジメン名: PF(CBDCA)+ペムプロリズマブ

K-341

薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間
1 パラプラチン注射液	AUC=5 Day1	
2 キイトルーダ点滴静注	200mg Day1	
3 5-FU注	500mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4	

レジメン名: PF(GDDP)+ペムプロリズマブ

K-342

薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間
1 5-FU注	500mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4	
2 シスプラチン点滴静注「マルコ」	100mg/m ² Day1	
3 キイトルーダ点滴静注	200mg Day1	

レジメン名: PF療法(CBDCA)+セツキシマブ(2回目以降)

K-343

薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間
1 パラプラチン注射液	AUC=5 Day1	
2 5-FU注	500mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4	
3 アービタックス注射液(100mg/20mL)	250mg/m ² Day1 Day8 Day15	

レジメン名: PF療法(CBDCA)+セツキシマブ(初回)

K-344

薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間
1 パラプラチン注射液	AUC=5 Day1	
2 5-FU注	500mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4	
3 アービタックス注射液(100mg/20mL)	400mg/m ² Day1	
4 アービタックス注射液(100mg/20mL)	250mg/m ² Day8 Day15	

レジメン名: PF療法(GDDP)+セツキシマブ(2回目以降)

K-345

薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間
1 5-FU注	500mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4	
2 シスプラチン点滴静注「マルコ」	100mg/m ² Day1	
3 アービタックス注射液(100mg/20mL)	250mg/m ² Day1 Day8 Day15	

レジメン名: PF療法(GDDP)+セツキシマブ(初回)

K-346

薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間
1 5-FU注	500mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4	
2 シスプラチン点滴静注「マルコ」	100mg/m ² Day1	
3 アービタックス注射液(100mg/20mL)	400mg/m ² Day1	
4 アービタックス注射液(100mg/20mL)	250mg/m ² Day8 Day15	

レジメン名: TPF療法

K-347

薬剤	用量 投与日	コース期間: 21 日間
1 ドセタキセル点滴静注「EE」	60mg/m ² Day1	

※注意点

- ・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

2	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	60mg/m ² Day1
3	5-FU注	600mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6

レジメン名: TPF療法変法(CBDCA)

K-348

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 21 日間**

1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	60mg/m ² Day1
2	パラプラチン注射液	AUC=5 Day1
3	5-FU注	600mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6

レジメン名: TPF療法変法(アクブラ)

K-349

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 21 日間**

1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	60mg/m ² Day1
2	アクブラ静注用	100mg/m ² Day1
3	5-FU注	600mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6

レジメン名: TXT+TS-1

K-350

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**

1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	40mg/m ² Day1
---	--------------------	--------------------------

レジメン名: アクブラ、5-FU

K-351

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 21 日間**

1	アクブラ静注用	100mg/m ² Day1
2	5-FU注	800mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6

レジメン名: ドセタキセル単独療法

K-352

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 21 日間**

1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	60mg/m ² Day1
---	--------------------	--------------------------

レジメン名: ニボルマブ療法(頭頸部癌:固定用量)

K-353

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 14 日間**

1	オブジーボ点滴静注	240mg Day1
---	-----------	------------

レジメン名: 唾液腺導管癌に対するハーセプチン投与(2回目以降)

K-354

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 21 日間**

1	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	2mg/kg Day1 Day8 Day15
---	---------------------	------------------------

2	ドセタキセル点滴静注 「EE」	60mg/m ² Day1
---	--------------------	--------------------------

レジメン名: 唾液腺導管癌に対するハーセプチン投与(初回)

K-355

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 21 日間**

1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	60mg/m ² Day1
---	--------------------	--------------------------

2	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	4mg/kg Day1
---	---------------------	-------------

3	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	2mg/kg Day8 Day15
---	---------------------	-------------------

レジメン名: 頭頸部 放射併用セツキシマブ 2回目以降

K-356

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 49 日間**

1	アービタックス注射液	250mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43
---	------------	--

レジメン名: 頭頸部 化療併用セツキシマブ 2回目以降

K-357

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 84 日間**

1	アービタックス注射液	250mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78
---	------------	--

レジメン名: 頭頸部 化療併用セツキシマブ 初回

K-358

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 7 日間**

1	アービタックス注射液	400mg/m ² Day1
---	------------	---------------------------

レジメン名: 頭頸部 放射線併用セツキシマブ 初回

K-359

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 7 日間**

1	アービタックス注射液	400mg/m ² Day1
---	------------	---------------------------

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

L 内分泌腫瘍

レジメン名: daily ザノサー療法

L-360

薬剤	用量	投与日	コース期間:	42	日間
1 ザノサー点滴静注用	500mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5			

レジメン名: weekly ザノサー療法(1000mg/m²)

L-361

薬剤	用量	投与日	コース期間:	7	日間
1 ザノサー点滴静注用	1000mg/m ²	Day1			

レジメン名: weekly ザノサー療法(1250mg/m²)

L-362

薬剤	用量	投与日	コース期間:	7	日間
1 ザノサー点滴静注用	1250mg/m ²	Day1			

レジメン名: weekly ザノサー療法(1500mg/m²)

L-363

薬剤	用量	投与日	コース期間:	7	日間
1 ザノサー点滴静注用	1500mg/m ²	Day1			

M 乳癌

レジメン名: AC療法

M-364

その他

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 ドキソルビシン塩酸塩注射液	60mg/m ²	Day1			

2 注射用エンドキサン	600mg/m ²	Day1			
-------------	----------------------	------	--	--	--

レジメン名: GMF(原法)(2投2休)

M-365

その他

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 メソトレキセート注射液	40mg/m ²	Day1 Day8			
---------------	---------------------	-----------	--	--	--

2 5-FU注	600mg/m ²	Day1 Day8			
---------	----------------------	-----------	--	--	--

レジメン名: EC90(90・600 1投2休)

M-366

その他

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 エピルビシン塩酸塩注射液「NK」	90mg/m ²	Day1			
--------------------	---------------------	------	--	--	--

2 注射用エンドキサン	600mg/m ²	Day1			
-------------	----------------------	------	--	--	--

レジメン名: FEC100(500・100・500 1投2休)

M-367

その他

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 エピルビシン塩酸塩注射液「NK」	100mg/m ²	Day1			
--------------------	----------------------	------	--	--	--

2 注射用エンドキサン	500mg/m ²	Day1			
-------------	----------------------	------	--	--	--

3 5-FU注	500mg/m ²	Day1			
---------	----------------------	------	--	--	--

レジメン名: FEC75(500・75・500 1投2休)

M-368

その他

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 エピルビシン塩酸塩注射液「NK」	75mg/m ²	Day1			
--------------------	---------------------	------	--	--	--

2 注射用エンドキサン	500mg/m ²	Day1			
-------------	----------------------	------	--	--	--

3 5-FU注	500mg/m ²	Day1			
---------	----------------------	------	--	--	--

レジメン名: TAC療法

M-369

その他

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 ドキソルビシン塩酸塩注射液	50mg/m ²	Day1			
-----------------	---------------------	------	--	--	--

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

2 ドセタキセル点滴静注
「EE」 75mg/m² Day1

3 注射用エンドキサン 500mg/m² Day1

レジメン名: TC(75-600 1投2休)

M-370 その他

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ドセタキセル点滴静注
「EE」 75mg/m² Day1

2 注射用エンドキサン 600mg/m² Day1

レジメン名: Tri-weekly Paclitaxel

M-371 その他

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 パクリタキセル注「NK」 175mg/m² Day1

レジメン名: ドセタキセル Triweekly (75 1投 2休)

M-372 その他

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ドセタキセル点滴静注
「EE」 75mg/m² Day1

レジメン名: ドセタキセルweekly(30 3投1休)

M-373 その他

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ドセタキセル点滴静注
「EE」 30mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: ハーセプチンtriweekly(2回目以降)

M-374 その他

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ハーセプチン注射用
(溶解液付) 6mg/kg Day1

レジメン名: ハーセプチンtriweekly(初回)

M-375 その他

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ハーセプチン注射用
(溶解液付) 8mg/kg Day1

レジメン名: パクリタキセル(80 3投1休)

M-376 その他

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 パクリタキセル注「NK」 80mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: パクリタキセルweekly (80×9)

M-377 その他

薬剤 用量 投与日 コース期間: 63 日間

1 パクリタキセル注「NK」 80mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57

レジメン名: CPT-11(100 4投2休)

M-378 再発

薬剤 用量 投与日 コース期間: 35 日間

1 カンプト点滴静注 100mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22

レジメン名: GEM(1250 2投1休)

M-379 再発

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ゲムシタビン点滴静注
用「ヤクルト」 1250mg/m² Day1 Day8

レジメン名: GEM+PTX(1250-175 2投1休)

M-380 再発

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 パクリタキセル注「NK」 175mg/m² Day1

2 ゲムシタビン点滴静注
用「ヤクルト」 1250mg/m² Day1 Day8

レジメン名: weekly パクリタキセル+ペバシズマブ

M-381 再発

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 アバスチン点滴静注用 10mg/kg Day1 Day15

2 パクリタキセル注「NK」 90mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: アテゾリズマブ+ナブパクリタキセル療法

M-382 再発

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 テセントリク点滴静注8
40mg/14mL 840mg Day1 Day15

2 アブラキサン点滴静注
用 100mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: アブラキサン triweekly(260 1投2休)

M-383 再発

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 アブラキサン点滴静注
用 260mg/m² Day1

レジメン名: エリブリン(1.4 2投1休)

M-384 再発

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ハラヴェン静注 1.4mg/m² Day1 Day8

レジメン名: カドサイラ Triweekly

M-385 再発

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 カドサイラ点滴静注用 3.6mg/kg Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: カルボプラチン+CPT-11

M-386 再発

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	カンプト点滴静注	90mg/m ² Day1 Day8			

2 パラプラチン注射液 AUC=2 Day1 Day8

レジメン名: カンプト3投2休

M-387 再発

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	カンプト点滴静注	100mg/m ² Day1 Day8 Day15			

レジメン名: ドセタキセル+カルボプラチン+トラスツズマブ weekly(2回目以降)

M-388 再発

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ドセタキセル点滴静注「EE」	75mg/m ² Day1			

2 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

3 ハーセプチン注射用 (溶解液付) 2mg/kg Day1 Day8 Day15

レジメン名: ナベルピン(25 2投1休)

M-389 再発

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ナベルピン注	25mg/m ² Day1 Day8			

レジメン名: ハーセプチン weekly(2回目以降)

M-390 再発

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22			

レジメン名: ハーセプチン weekly(初回)

M-391 再発

薬剤	用量	投与日	コース期間:	7	日間
1	ハーセプチン注射用 (溶解液付)	4mg/kg Day1			

レジメン名: パクリタキセル+カルボプラチン+トラスツズマブ weekly(2回目以降)

M-392 再発

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	パクリタキセル注「NK」	175mg/m ² Day1			

2 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

3 ハーセプチン注射用 (溶解液付) 2mg/kg Day1 Day8 Day15

レジメン名: ペルツズマブ(初回)

M-393 再発

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	パージエタ点滴静注	840mg Day1			

レジメン名: ペルツズマブ+トラスツズマブ

M-394 再発

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	パージエタ点滴静注	420mg Day1			

2 ハーセプチン注射用 (溶解液付) 6mg/kg Day1

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

N 脳腫瘍

レジメン名: (患者限定胎児性脳腫瘍)TMZ維持療法(150mg/m²)

N-395 悪性神経膠腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 テモダール点滴静注用 150mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: ACNU単独療法(維持療法)

N-396 悪性神経膠腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	56	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 ニドラン注射用 80mg/m² Day1

レジメン名: PAV療法

N-397 悪性神経膠腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	56	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 ニドラン注射用 80mg/m² Day1
- 2 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day8 Day29

レジメン名: テモゾロマイド注維持療法(150mg/m²)

N-398 悪性神経膠腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 テモダール点滴静注用 150mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: テモゾロマイド注維持療法(200mg/m²)

N-399 悪性神経膠腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 テモダール点滴静注用 200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: ベバシズマブ(10mg/kg)療法

N-400 悪性神経膠腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 アバステチン点滴静注用 10mg/kg Day1

レジメン名: ベバシズマブ(15mg/kg)療法

N-401 悪性神経膠腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 アバステチン点滴静注用 15mg/kg Day1

レジメン名: 放射線+ACNU併用療法(初回)

N-402 悪性神経膠腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	91	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 ニドラン注射用 80mg/m² Day1 Day36

レジメン名: 放射線+テモゾロマイド注併用(75mg/m²)延長用

N-403 悪性神経膠腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	29	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 テモダール点滴静注用 75mg/m² Day1

レジメン名: 放射線+テモゾロマイド注併用療法(75mg/m²)

N-404 悪性神経膠腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	70	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 テモダール点滴静注用 75mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33

レジメン名: (患者限定)メソトレキサートの髄注レジメン

N-405 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 メソトレキサート注射液 0.001mg Day1

レジメン名: (患者限定)レジメンHDC(1歳未満または体重10kg未満)

N-406 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤	用量	投与日	コース期間:	5	日間
----	----	-----	--------	---	----

- 1 プスルフェクス点滴静注用 1.2mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4
- 2 アルケラン静注用 5mg/kg Day5

レジメン名: (患者限定)髄芽腫レジメンA(乳児)

N-407 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 注射用エンドキサン 33mg/kg Day1 Day2 Day3
- 2 メソトレキサート注射液 0.001mg Day1
- 3 オンコピン注射用 0.05mg/kg Day1
- 4 ラステット注 5mg/kg Day1 Day2 Day3

- 5 シスプラチン点滴静注「マルレコ」 3mg/kg Day3

レジメン名: (患者限定)髄芽腫レジメンA(幼児)

N-408 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

- 1 注射用エンドキサン 1000mg/m² Day1 Day2 Day3
- 2 メソトレキサート注射液 0.001mg Day1
- 3 オンコピン注射用 1.5mg/m² Day1
- 4 ラステット注 150mg/m² Day1 Day2 Day3

- 5 シスプラチン点滴静注「マルレコ」 90mg/m² Day3

※注意点

- ・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: (患者限定) 髄芽腫レジメンAM(乳児)

N-409 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**

1 注射用エンドキサン 33mg/kg Day1 Day2 Day3

2 メソトレキセート注射液 0.001mg Day1

3 オンコピン注射用 0.05mg/kg Day1

4 ラステット注 5mg/kg Day1 Day2 Day3

6 メソトレキセート注射液 167mg/kg Day8

6 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 3mg/kg Day3**レジメン名: (患者限定) 髄芽腫レジメンB(乳児)**

N-410 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**

1 注射用エンドキサン 33mg/kg Day1 Day2 Day3

2 メソトレキセート注射液 0.001mg Day1

3 オンコピン注射用 0.05mg/kg Day1

4 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 3mg/kg Day3**レジメン名: (患者限定) 髄芽腫レジメンB(幼児)**

N-411 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**1 注射用エンドキサン 1000mg/m² Day1 Day2 Day3

2 メソトレキセート注射液 0.001mg Day1

3 オンコピン注射用 1.5mg/m² Day14 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 90mg/m² Day3**レジメン名: (患者限定) 髄芽腫レジメンBM(乳児)**

N-412 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**

1 オンコピン注射用 0.05mg/kg Day1

2 メソトレキセート注射液 0.001mg Day1

3 注射用エンドキサン 33mg/kg Day1 Day2 Day3

4 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 3mg/kg Day3

5 メソトレキセート注射液 167mg/kg Day8

レジメン名: BU/L-PAM/TOP

N-413 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 75 日間**1 ハイカムテン注射用 0.75mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

2 プスルフェクス点滴静注 1.2mg/kg Day7 Day8 Day9 Day10 Day11

3 アルケラン静注用 140mg/m² Day12**レジメン名: CARE療法(CV用)**

N-414 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 21 日間**1 パラプラチン注射液 450mg/m² Day12 ラステット注 150mg/m² Day1 Day2 Day3**レジメン名: CARE療法(DIV用)**

N-415 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 21 日間**1 ラステット注 150mg/m² Day1 Day2 Day32 パラプラチン注射液 450mg/m² Day1**レジメン名: CARE療法(外来用)**

N-416 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 21 日間**1 パラプラチン注射液 450mg/m² Day1**レジメン名: GCE療法(3日間)**

N-417 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**1 注射用エンドキサン 1000mg/m² Day12 オンコピン注射用 1.5mg/m² Day13 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day34 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 90mg/m² Day2

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
 ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
 ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室
 TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: COE療法(5日間)

N-418 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**1 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 オンコピン注射用 1.5mg/m² Day13 注射用エンドキサン 1000mg/m² Day1 Day3 Day54 シスプラチン点滴静注「マルコ」 90mg/m² Day22 パラプラチン注射液 225mg/m² Day13 注射用イホマイド 1.8g/m² Day1 Day2 Day3**レジメン名: ICE療法(5日間)**

N-424 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**1 注射用イホマイド 1.8g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 パラプラチン注射液 225mg/m² Day1 Day2 Day33 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5**レジメン名: CV療法(導入療法,①1~4週目,③7~10週目)**

N-419 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**1 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1 Day8 Day15 Day222 パラプラチン注射液 175mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22**レジメン名: ICE療法(オンコピンあり)**

N-425 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**1 オンコピン注射用 1.5mg/m² Day12 注射用イホマイド 1.8g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day53 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day54 パラプラチン注射液 225mg/m² Day1 Day2**レジメン名: CV療法(導入療法,②5~6週目)**

N-420 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 14 日間**1 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1 Day8**レジメン名: High dose ICE療法**

N-421 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**1 パラプラチン注射液 400mg/m² Day1 Day2 Day3 Day42 注射用イホマイド 2g/m² Day1 Day2 Day3 Day43 ラステット注 200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4**レジメン名: PE療法(外来用)**

N-426 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**1 パラプラチン注射液 450mg/m² Day1**レジメン名: TOP単独療法**

N-427 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 21 日間**1 ハイカムチン注射用 0.75mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5**レジメン名: high MEC療法**

N-422 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 7 日間**1 アルケラン静注用 90mg/m² Day1 Day22 ラステット注 200mg/m² Day3 Day4 Day5 Day63 パラプラチン注射液 400mg/m² Day3 Day4 Day5 Day6**レジメン名: 髄液抗癌剤投与**

N-428 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 1 日間**

1 メソトレキセート注射液 15mg Day1

2 キロサイド注 30mg Day1

レジメン名: ICE療法(3日間)

N-423 髄芽腫・胚細胞腫など

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 28 日間**1 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3**レジメン名: (患者限定)R-MPV**

N-429 中枢神経系原発悪性リンパ腫

薬剤 **用量 投与日** **コース期間: 14 日間**1 リツキサン点滴静注 500mg/m² Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
 ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
 ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

2 メソトレキセート注射液 3500mg/m² Day23 オンコビン注射用 1.4mg/m² Day2**レジメン名: 中枢神経系原発悪性リンパ腫MTX大量療法**

N-430 中枢神経系原発悪性リンパ腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 メソトレキセート注射液 3500mg/m² Day2○ **泌尿器癌****レジメン名: テムシロリムス**

O-431 腎癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	7	日間
----	----	-----	--------	---	----

1 トーリセル点滴静注 25mg Day1

レジメン名: ニボルマブ/イピリムマブ併用療法(腎癌)

O-432 腎癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 ヤーボイ点滴静注 1mg/kg Day1

2 オブジーボ点滴静注 240mg Day1

レジメン名: ニボルマブ療法(腎癌:固定用量)

O-433 腎癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 オブジーボ点滴静注 240mg Day1

レジメン名: ペムプロリズマブ+アキシチニブ(腎細胞癌)

O-434 腎癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

レジメン名: BEP療法

O-435 精巣癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day53 ブレオ注射用 20mg/m² Day2 Day9 Day16**レジメン名: GEMOX**

O-436 精巣癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 エルプラット点滴静注 130mg/m² Day12 ゲムシタビン点滴静注
用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day8**レジメン名: ICE**

O-437 精巣癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 ラステット注 150mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 注射用イホマイド 1.5g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・バラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

3 パラプラチン注射液 250mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: VeIP

O-438 精巣癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 注射用イホマイド 1.2g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

3 エクザール注射用 0.11mg/kg Day1 Day2

レジメン名: イリノテカン・ネダプラチン(IN)

O-439 精巣癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 アクブラ静注用 100mg/m² Day12 カンプト点滴静注 100mg/m² Day1 Day15

レジメン名: カルボプラチン単剤療法

O-440 精巣癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 パラプラチン注射液 AUC=7 Day1

レジメン名: tri-weekly ドセタキセル

O-441 前立腺癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ドセタキセル点滴静注
「EE」 75mg/m² Day1

レジメン名: カバジタキセル+プレドニソロン併用療法

O-442 前立腺癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ジェブタナ点滴静注 25mg/m² Day1

レジメン名: ソーフィゴ

O-443 前立腺癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ソーフィゴ静注 55kBq/kg Day1

レジメン名: DG療法

O-444 尿路上皮癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ドセタキセル点滴静注
「EE」 30mg/m² Day12 ゲムシタビン点滴静注
用「ヤクルト」 400mg/m² Day1 Day8

レジメン名: GC療法

O-445 尿路上皮癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ゲムシタビン点滴静注
用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day8 Day152 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 70mg/m² Day2

レジメン名: GC療法(カルボプラチン)

O-446 尿路上皮癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ゲムシタビン点滴静注
用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day8

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: G療法

O-447 尿路上皮癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ゲムシタビン点滴静注
用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: M-VAC

O-448 尿路上皮癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 メントレキセート注射液 30mg/m² Day1 Day15 Day222 エクザール注射用 3mg/m² Day2 Day15 Day223 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 70mg/m² Day24 ドキソルビシン塩酸塩
注射液 30mg/m² Day2

レジメン名: PG療法

O-449 尿路上皮癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 バクリタキセル注「NK」 200mg/m² Day12 ゲムシタビン点滴静注
用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: TGP療法

O-450 尿路上皮癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 バクリタキセル注「NK」 80mg/m² Day1 Day82 ゲムシタビン点滴静注
用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day83 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 50mg/m² Day2

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: ゲムシタピン+カルボプラチン+ドセタキセル療法

O-451 尿路上皮癌

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
1 ゲムシタピン点滴静注 用「ヤクルト」	800mg/m ²	Day1 Day8	21	日間
2 ドセタキセル点滴静注 「EE」	70mg/m ²	Day1		
3 パラプラチン注射液	AUC=4	Day2		

レジメン名: ピノルビン膀胱注入療法

O-452 尿路上皮癌

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
1 ピノルビン注射用	20mg	Day1	7	日間

レジメン名: ペムプロリズマブ(尿路上皮癌)

O-453 尿路上皮癌

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
1 キイトルーダ点滴静注	200mg	Day1	21	日間

レジメン名: マイトマイシンC膀胱注入療法

O-454 尿路上皮癌

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
1 マイトマイシン注	40mg	Day1	7	日間

P 皮膚癌

レジメン名: DAC-Tam療法

P-455 悪性黒色腫

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
1 ニドラン注射用	60mg/m ²	Day1	42	日間
2 ダカルバジン注用	220mg/m ²	Day1 Day2 Day3		
3 シスプラチン点滴静注 「マルレコ」	25mg/m ²	Day1 Day2 Day3		

レジメン名: DAV Feron療法(局注用)入院用

P-456 悪性黒色腫

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
1 ダカルバジン注用	110mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	28	日間
2 オンコビン注射用	0.65mg/m ²	Day1		
3 ニドラン注射用	65mg/m ²	Day1		
4 フェロン注射用300万 (溶解液付)	1本	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5		

レジメン名: DAV Feron療法(静注用)

P-457 悪性黒色腫

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
1 オンコビン注射用	0.65mg/m ²	Day1	28	日間
2 フェロン注射用300万 (溶解液付)	1本	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5		
3 ダカルバジン注用	110mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5		
4 ニドラン注射用	65mg/m ²	Day1		

レジメン名: イピリムマブ単独療法(悪性黒色腫)

P-458 悪性黒色腫

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
1 ヤーボイ点滴静注液	3mg/kg	Day1	21	日間

レジメン名: ニホルマブ+イピリムマブ併用療法1~4コース目(悪性黒色腫)

P-459 悪性黒色腫

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
1 ヤーボイ点滴静注液	3mg/kg	Day1	21	日間
2 オプジーボ点滴静注	80mg	Day1		

※注意点

- ・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: ニボルマブ療法(悪性黒色腫:固定用量)

P-460 悪性黒色腫

薬剤 用量 投与日 コース期間: 14 日間

1 オブジーボ点滴静注 240mg Day1

レジメン名: ペムプロリズマブ療法(悪性黒色腫)

P-461 悪性黒色腫

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

レジメン名: 乳房外パジェット病 Weeklyドセタキセル

P-462 乳房外パジェット病

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ドセタキセル点滴静注 25mg/m² Day1 Day8 Day15
「EE」

レジメン名: CA療法(Cisplatin+Doxorubicin)

P-463 有棘細胞癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 シスプラチン点滴静注 80mg/m² Day1
「マルコ」2 ドキソルビシン塩酸塩 50mg/m² Day2
注射液

レジメン名: CPT-11療法

P-464 有棘細胞癌

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 カンプト点滴静注 100mg/m² Day1 Day8 Day15

Q 肺癌

レジメン名: マイトマイシン(胸腔内)

Q-465 癌性胸膜炎

薬剤 用量 投与日 コース期間: 1 日間

1 マイトマイシン注 8mg Day1

レジメン名: カルボプラチン+パクリタキセル(胸腺腫)

Q-466 胸腺腫

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 パクリタキセル注「NK」 200mg/m² Day1

2 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

レジメン名: アリムタ(胸腺腫・胸腺癌)

Q-467 胸腺腫

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

レジメン名: カルボプラチン+アドリアマイシン+シクロホスファミド

Q-468 胸腺腫

薬剤 用量 投与日 コース期間: 35 日間

1 ドキソルビシン塩酸塩 50mg/m² Day1
注射液2 注射用エンドキサン 500mg/m² Day1

3 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: カルボプラチン+アムルピシン(胸腺腫・胸腺癌)

Q-469 胸腺腫

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 パラプラチン注射液 AUC=4 Day1

2 カルセド注 35mg/m² Day1 Day2 Day3

レジメン名: カルボプラチン+パクリタキセル(胸腺腫)

Q-470 胸腺腫

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 パクリタキセル注「NK」 200mg/m² Day1

2 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

レジメン名: シスプラチン+アドリアマイシン+シクロホスファミド

Q-471 胸腺腫

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 注射用エンドキサン 500mg/m² Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

2 ドキソルビシン塩酸塩
注射液 50mg/m² Day1

3 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 50mg/m² Day1

レジメン名: アテゾリズマブ+カルボプラチン+エトポシド療法(小細胞肺癌)

Q-472 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3

2 テセントリク点滴静注 1200mg Day1

3 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: アテゾリズマブ維持療法(小細胞肺癌)

Q-473 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 テセントリク点滴静注 1200mg Day1

レジメン名: アドリアマイシン+シクロホスファミド+ピンクリスチン

Q-474 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 オンコビン注射用 1mg/m² Day1 Day15

2 注射用エンドキサン 500mg/m² Day1 Day3 Day5

3 ドキソルビシン塩酸塩
注射液 40mg/m² Day1

レジメン名: アムルピシン(d1,2,3)

Q-475 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 カルセド注 40mg/m² Day1 Day2 Day3

レジメン名: イリノテカン(d1,8,15)

Q-476 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 カンプト点滴静注 60mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: カルボプラチン(d1)+イリノテカン(d1,8,15)

Q-477 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 カンプト点滴静注 60mg/m² Day1 Day8 Day15

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: カルボプラチン(d1)+エトポシド(d1,2,3)

Q-478 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: カルボプラチン(d1)+エトポシド(d1, 3)透析用

Q-479 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ラステット注 70mg/m² Day1 Day3

2 パラプラチン注射液 300mg/m² Day1

レジメン名: シスプラチン(d1)+イリノテカン(d1,8,15)

Q-480 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 カンプト点滴静注 60mg/m² Day1 Day8 Day15

2 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 60mg/m² Day1

レジメン名: シスプラチン(d1)+エトポシド(d1,2,3)

Q-481 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 80mg/m² Day1

2 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2 Day3

レジメン名: ノギテカン(d1-5)

Q-482 小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 ハイカムチン注射用 1mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: (short)シスプラチン+パメトレキセド+パピリスマブ療法

Q-483 非小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 アバスチン点滴静注用 15mg/kg Day1

2 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

3 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 75mg/m² Day1

レジメン名: (short)シスプラチン+パメトレキセド療法

Q-484 非小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

2 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 75mg/m² Day1

2 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

レジメン名: アテゾリズマブ+カルボプラチン+nab-パクリタキセル(肺癌)

Q-485 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 アブラキサン点滴静注
用 100mg/m² Day1 Day8 Day15

2 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

3 テセントリク点滴静注1
200mg/20mL 1200mg Day1

レジメン名: アテゾリズマブ療法(肺癌)

Q-490 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 テセントリク点滴静注 1200mg Day1

レジメン名: アブラキサン(d1,8,15)

Q-491 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 アブラキサン点滴静注
用 100mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: アテゾリズマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド(肺癌)

Q-486 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 テセントリク点滴静注1
200mg/20mL 1200mg Day1

2 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

3 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

レジメン名: イリノテカン(d1,8,15)

Q-492 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 カンプト点滴静注 60mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: カルボプラチン(d1)+TS-1(2投1休)

Q-493 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: アテゾリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド(肺癌)

Q-487 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 テセントリク点滴静注1
200mg/20mL 1200mg Day1

2 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

3 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 75mg/m² Day1

レジメン名: カルボプラチン(d1)+アブラキサン(d1,8,15)

Q-494 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 アブラキサン点滴静注
用 100mg/m² Day1 Day8 Day15

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: カルボプラチン(d1)+イリノテカン(d1,8,15)

Q-495 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 カンプト点滴静注 60mg/m² Day1 Day8 Day15

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: アテゾリズマブ+パシタキセル+カルボプラチン+パクリタキセル(肺癌)

Q-488 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 テセントリク点滴静注 1200mg Day1

2 パクリタキセル注「NK」 200mg/m² Day1

3 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

4 アバスチン点滴静注用 15mg/kg Day1

レジメン名: カルボプラチン(d1)+ゲムシタピン(d1,8)

Q-496 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 ゲムシタピン点滴静注
用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day8

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: アテゾリズマブ+ペメトレキセド(肺癌) 維持療法

Q-489 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21 日間**

1 テセントリク点滴静注1
200mg/20mL 1200mg Day1

レジメン名: カルボプラチン(d1)+ドセタキセル(d1,8,15)

Q-497 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

2 ドセタキセル点滴静注
用 30mg/m² Day1

3 ドセタキセル点滴静注
「EE」 30mg/m² Day8 Day15

レジメン名: カルボプラチン(d1)+パクリタキセル(d1,8,15)

Q-498 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28** **日間**

1 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

2 パクリタキセル注「NK」 70mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: カルボプラチン(d1)+パクリタキセル(d1,8,15)放射線併用

Q-499 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28** **日間**

1 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

2 パクリタキセル注「NK」 50mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: カルボプラチン(d1)+ピノレルピン(d1,8)

Q-500 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28** **日間**

1 ナベルピン注 25mg/m² Day1 Day8

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: カルボプラチン(d1)+ピノレルピン(d1,8)放射線併用

Q-501 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28** **日間**

1 ナベルピン注 20mg/m² Day1 Day8

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: カルボプラチン+ドセタキセル

Q-502 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28** **日間**

1 ドセタキセル点滴静注
「EE」 60mg/m² Day1

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: カルボプラチン+パクリタキセル

Q-503 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28** **日間**

1 パクリタキセル注「NK」 200mg/m² Day1

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: カルボプラチン+パクリタキセル+ペバシズマブ

Q-504 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21** **日間**

1 パクリタキセル注「NK」 200mg/m² Day1

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

3 アバスチン点滴静注用 15mg/kg Day1

レジメン名: カルボプラチン+ペメトレキセド

Q-505 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21** **日間**

1 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: カルボプラチン+ペメトレキセド+ペバシズマブ

Q-506 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21** **日間**

1 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

3 アバスチン点滴静注用 15mg/kg Day1

レジメン名: ゲムシタピン(d1,8)+ピノレルピン(d1,8)

Q-508 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 21** **日間**

1 ナベルピン注 25mg/m² Day1 Day8

2 ゲムシタピン点滴静注
用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day8

レジメン名: ゲムシタピン(d1,8,15)

Q-509 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28** **日間**

1 ゲムシタピン点滴静注
用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: シスプラチン(d1)+イリノテカン(d1,8,15)

Q-510 非小細胞

薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28** **日間**

1 カンプト点滴静注 60mg/m² Day1 Day8 Day15

2 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 60mg/m² Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: シスプラチン(d1)+ゲムシタピン(d1,8,15)

Q-511 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ゲムシタピン点滴静注 用「ヤクルト」	1000mg/m ² Day1 Day8 Day15			

2	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	80mg/m ² Day1			
---	---------------------	--------------------------	--	--	--

レジメン名: シスプラチン(d1)+ピノレルピン(d1,8)

Q-512 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ナベルピン注	25mg/m ² Day1 Day8			

2	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	80mg/m ² Day1			
---	---------------------	--------------------------	--	--	--

レジメン名: シスプラチン(d1)+ピノレルピン(d1,8,15)放射線併用

Q-513 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ナベルピン注	20mg/m ² Day1 Day8 Day15			

2	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	80mg/m ² Day1			
---	---------------------	--------------------------	--	--	--

レジメン名: シスプラチン(d8)+TS-1(3投2休)

Q-514 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	35	日間
1	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	60mg/m ² Day8			

レジメン名: シスプラチン(温熱・全身)

Q-515 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	1	日間
1	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	100mg Day1			

レジメン名: シスプラチン+ドセタキセル

Q-516 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	60mg/m ² Day1			
2	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	80mg/m ² Day1			

レジメン名: シスプラチン+ペムトレキセド

Q-517 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	アリムタ注射用	500mg/m ² Day1			
2	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	75mg/m ² Day1			

レジメン名: シスプラチン+ペムトレキセド+ペバシズマブ

Q-518 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	アバシチン点滴静注用	15mg/kg Day1			

2	アリムタ注射用	500mg/m ² Day1			
---	---------	---------------------------	--	--	--

3	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	75mg/m ² Day1			
---	---------------------	--------------------------	--	--	--

レジメン名: デュルバルマブ単剤療法(肺癌)

Q-519 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	イミフィンジ点滴静注	10mg/kg Day1			

レジメン名: ドセタキセル(60mg/m²)

Q-520 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	60mg/m ² Day1			

レジメン名: ドセタキセル(75mg/m²)

Q-521 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	75mg/m ² Day1			

レジメン名: ドセタキセル(d1,8,15)

Q-522 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ドセタキセル点滴静注 「EE」	30mg/m ² Day1 Day8 Day15			

レジメン名: ドセタキセル+サイラムザ療法

Q-523 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	サイラムザ点滴静注液	10mg/kg Day1			
2	ドセタキセル点滴静注 「EE」	60mg/m ² Day1			

レジメン名: ニボルマブ療法(肺癌:固定用量)

Q-524 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	オブジーボ点滴静注	240mg Day1			

レジメン名: ネダプラチン(d1)+ピノレルピン(d1,8)

Q-525 非小細胞

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	ナベルピン注	25mg/m ² Day1 Day8			
2	アクブラ静注用	80mg/m ² Day1			

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・バラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: ビノレルピン(d1,8,15)

Q-526 非小細胞

3 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ナベルピン注 25mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: ビノレルピン(d1,8,15)放射線併用

Q-527 非小細胞

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

薬剤 用量 投与日 コース期間: 28 日間

1 ナベルピン注 20mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: ペバシズマブ

Q-528 非小細胞

3 シスプラチン点滴静注 「マルコ」 75mg/m² Day1

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 アバスチン点滴静注 15mg/kg Day1

レジメン名: ペムブロリズマブ+nab-パクリタキセル+カルボプラチン

Q-529 非小細胞

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

2 アブラキサン点滴静注 用 100mg/m² Day1 Day8 Day15

3 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

レジメン名: ペムブロリズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン

Q-530 非小細胞

1 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

2 パクリタキセル注「NK」 200mg/m² Day1

3 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

レジメン名: ペムブロリズマブ+ペメトレキセド

Q-531 非小細胞

2 アバスチン点滴静注 15mg/kg Day1

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

2 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

レジメン名: ペムブロリズマブ+ペメトレキセド+カルボプラチン

Q-532 非小細胞

1 テセントリク点滴静注 1200mg Day1

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

2 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

レジメン名: ペムブロリズマブ+ペメトレキセド+シスプラチン

Q-533 非小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

2 アリムタ注射用 500mg/m² Day13 シスプラチン点滴静注 「マルコ」 75mg/m² Day1

レジメン名: ペムブロリズマブ療法(肺癌)

Q-534 非小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

レジメン名: ペメトレキセド

Q-535 非小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

レジメン名: ペメトレキセド+ペバシズマブ

Q-536 非小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 アリムタ注射用 500mg/m² Day1

2 アバスチン点滴静注 15mg/kg Day1

レジメン名: 維持療法アテゾリズマブ+ペバシズマブ療法(肺癌)

Q-537 非小細胞

薬剤 用量 投与日 コース期間: 21 日間

1 テセントリク点滴静注 1200mg Day1

2 アバスチン点滴静注 15mg/kg Day1

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

R 婦人科癌

レジメン名: (患者限定)ピンクリスチン・アクチノマイシンD療法

R-538 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 オンコビン注射用	2mg	Day1 Day8 Day15 Day22			
2 コスメゲン静注用	0.5mg	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5			

レジメン名: AP肝動注

R-539 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 アドリアシン注用	60mg/m ²	Day1			
2 動注用アイエーコール	50mg/m ²	Day1			

レジメン名: AP療法(子宮)

R-540 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 ドキソルビシン塩酸塩注射液	60mg/m ²	Day1			
2 シスプラチン点滴静注「マルコ」	50mg/m ²	Day1			

レジメン名: BEP療法

R-541 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 シスプラチン点滴静注「マルコ」	20mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5			
2 ラステット注	100mg/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5			
3 ブレオ注射用	20mg/m ²	Day2 Day9 Day16			

レジメン名: GPT-11+CDDP療法

R-542 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 カンプト点滴静注	60mg/m ²	Day1 Day8 Day15			
2 シスプラチン点滴静注「マルコ」	60mg/m ²	Day1			

レジメン名: GPT-11+NDP療法

R-543 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 カンプト点滴静注	50mg/m ²	Day1 Day8			
2 アクブラ静注用	80mg/m ²	Day1			

レジメン名: DP療法

R-544 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 ドセタキセル点滴静注「EE」	70mg/m ²	Day1			
2 シスプラチン点滴静注「マルコ」	60mg/m ²	Day1			

レジメン名: IAP療法

R-545 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 注射用イホマイド	1.5g	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5			
2 シスプラチン点滴静注「マルコ」	50mg/m ²	Day5			
3 ドキソルビシン塩酸塩注射液	25mg/m ²	Day5			

レジメン名: Ifosfamide+CDDP療法

R-546 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 注射用イホマイド	1.5g/m ²	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5			
2 シスプラチン点滴静注「マルコ」	50mg/m ²	Day5			

レジメン名: PLD(ドキシル)療法

R-547 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 ドキシル注	50mg/m ²	Day1			

レジメン名: TP(+BEV)療法

R-548 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 バクリタキセル注「NK」	175mg/m ²	Day1			
2 シスプラチン点滴静注「マルコ」	50mg/m ²	Day1			
3 アバスチン点滴静注用	15mg/kg	Day1			

レジメン名: tri-w DOC+CBDCA療法(AUC6)

R-549 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 ドセタキセル点滴静注「EE」	70mg/m ²	Day1			
2 パラプラチン注射液	AUC=6	Day1			

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室
TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: tri-w TC療法 (AUC6)

R-550 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 バクリタキセル注「NK」 175mg/m² Day1

2 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

レジメン名: tri-w ドセタキセル療法

R-551 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 ドセタキセル点滴静注「EE」 70mg/m² Day1

レジメン名: Weekly CDDP療法 (放射線併用)

R-552 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 40mg/m² Day1

レジメン名: Weekly DC療法 (AUC6)

R-553 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 ドセタキセル点滴静注「EE」 35mg/m² Day1 Day8 Day15

2 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

レジメン名: Weekly GEM療法

R-554 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: Weekly TC療法 (AUC6)

R-555 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 バクリタキセル注「NK」 70mg/m² Day1 Day8 Day15

2 パラプラチン注射液 AUC=6 Day1

レジメン名: Weekly TC療法 (分割法)

R-556 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 バクリタキセル注「NK」 60mg/m² Day1

2 パラプラチン注射液 AUC=2 Day1

レジメン名: Weekly カルボプラチン療法

R-557 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 パラプラチン注射液 150mg/m² Day1

レジメン名: Weekly バクリタキセル療法

R-558 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 バクリタキセル注「NK」 80mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: アバステン療法 (卵巣癌)

R-559 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 アバステン点滴静注 15mg/kg Day1

レジメン名: イリノテカン療法

R-560 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 カンプト点滴静注 100mg/m² Day1 Day8 Day15

レジメン名: ゲムシタビン+カルボプラチン併用療法 (AUC4)

R-561 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 パラプラチン注射液 AUC=4 Day1

2 ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」 1000mg/m² Day1 Day8

レジメン名: ゲムシタビン+ドセタキセル療法

R-562 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」 800mg/m² Day1 Day82 ドセタキセル点滴静注「EE」 70mg/m² Day8

レジメン名: ドキシル+カルボプラチン療法 (AUC5)

R-563 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 ドキシル注 30mg/m² Day1

2 パラプラチン注射液 AUC=5 Day1

レジメン名: ノギテカン療法

R-564 子宮・卵巣

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 ハイカムテン注射用 1.5mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: 異所性妊娠メソトレキセート療法

R-565 子宮外妊娠

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 メソトレキセート注射液 50mg/m² Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室
TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: (患者限定) Sequential TP療法

R-566 絨毛性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 バクリタキセル注「NK」 135mg/m² Day12 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 60mg/m² Day1

レジメン名: EMACO療法

R-567 絨毛性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 ラステット注 100mg/m² Day1 Day2

2 コスメゲン静注用 0.5mg Day1 Day2

3 メソトレキセート注射液 100mg/m² Day14 メソトレキセート注射液 200mg/m² Day16 注射用エンドキサン 600mg/m² Day86 オンコビン注射用 1mg/m² Day8

レジメン名: EP/EMA療法

R-568 絨毛性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 75mg/m² Day12 ラステット注 150mg/m² Day1

3 コスメゲン静注用 0.5mg Day8

4 メソトレキセート注射液 300mg/m² Day85 ラステット注 100mg/m² Day8

レジメン名: FA療法

R-569 絨毛性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	19	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 5-FU注 1000mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day52 コスメゲン静注用 0.35mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: MEA療法

R-570 絨毛性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	19	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 メソトレキセート注射液 200mg/m² Day12 メソトレキセート注射液 100mg/m² Day13 コスメゲン静注用 0.35mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day54 ラステット注 70mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: MTX(連投)療法

R-571 絨毛性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 メソトレキセート注射液 20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: TP/TE療法

R-572 絨毛性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 バクリタキセル注「NK」 135mg/m² Day1 Day152 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 60mg/m² Day13 ラステット注 150mg/m² Day15

レジメン名: アクチノマイシンD療法

R-573 絨毛性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 コスメゲン静注用 0.01mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

レジメン名: エトポシド療法

R-574 絨毛性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 ラステット注 60mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- バラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

U その他

レジメン名: ペムブロリズマブ療法 (MSI-H)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 キイトルーダ点滴静注 200mg Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (10mg/kg 1時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 10mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (10mg/kg 2時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 10mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (10mg/kg 3時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 10mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (5mg/kg 1時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 5mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (5mg/kg 2時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 5mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (5mg/kg 3時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 5mg/kg Day1

レジメン名: レミケード導入療法 (5mg/kg 3時間導入法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 5mg/kg Day1 Day15 Day43

レジメン名: 難治性NSへのリツキシマブ治療 (小児)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: 難治性ネフローゼ症候群のリツキシマブ加療

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (10mg/kg 2時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 10mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (5mg/kg 1時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 5mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (5mg/kg 2時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 5mg/kg Day1

レジメン名: レミケード導入療法 (5mg/kg 2時間導入法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 5mg/kg Day1 Day15 Day43

レジメン名: CVD (悪性褐色細胞腫)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 注射用エンドキサン 750mg/m² Day12 ダカルバジン注用 600mg/m² Day1 Day23 オンコピン注射用 1.4mg/m² Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (10mg/kg 2時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 10mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (5mg/kg 1時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 5mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法 (5mg/kg 2時間投与方法)

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注用 5mg/kg Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: レミケード導入療法(5mg/kg 3時間導入法)

U-593 乾癬
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 98 日間**

1 レミケード点滴静注 5mg/kg Day1 Day15 Day43

レジメン名: IFX-BS「NK」導入療法(3mg/kg 2時間導入法)

U-602 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 98 日間**

1 インフリキシマブBS点滴静注「NK」 3mg/kg Day1 Day15 Day43

レジメン名: (肝移植)術後抗体関連拒絶治療(リツキシマブ)

U-594 肝移植
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 1 日間**

1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: アクテムラ維持療法(4回目以降)

U-603 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 アクテムラ点滴静注 8mg/kg Day1

レジメン名: (肝移植)術前感作症例脱感作療法(リツキシマブ)

U-595 肝移植
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 1 日間**

1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: アクテムラ導入療法(1-3回目まで)

U-604 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 アクテムラ点滴静注 8mg/kg Day1

レジメン名: リツキサン血液型不適合肝移植術前治療

U-596 肝移植
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 1 日間**

1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: オレンシア維持療法(体重60~100kg 4回目以降)

U-605 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 オレンシア点滴静注 750mg Day1

レジメン名: シクロホスファミド パルス療法(IP)

U-597 間質性肺炎
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 注射用エンドキサン 500mg Day1

レジメン名: オレンシア維持療法(体重60kg未満 4回目以降)

U-606 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 28 日間**

1 オレンシア点滴静注 500mg Day1

レジメン名: IFX-BS「NK」維持療法(10mg/kg 2時間投与法)

U-598 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 56 日間**

1 インフリキシマブBS点滴静注「NK」 10mg/kg Day1

レジメン名: オレンシア導入療法(体重60~100kg 1-3回目)

U-607 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 オレンシア点滴静注 750mg Day1

レジメン名: IFX-BS「NK」維持療法(3mg/kg 1時間投与法)

U-599 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 56 日間**

1 インフリキシマブBS点滴静注「NK」 3mg/kg Day1

レジメン名: オレンシア導入療法(体重60kg未満 1-3回目)

U-608 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 14 日間**

1 オレンシア点滴静注 500mg Day1

レジメン名: IFX-BS「NK」維持療法(3mg/kg 2時間投与法)

U-600 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 56 日間**

1 インフリキシマブBS点滴静注「NK」 3mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法(10mg/kg 1時間投与法)

U-609 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 56 日間**

1 レミケード点滴静注 10mg/kg Day1

レジメン名: IFX-BS「NK」維持療法(5mg/kg 1時間投与法)

U-601 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 56 日間**

1 インフリキシマブBS点滴静注「NK」 5mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法(10mg/kg 2時間投与法)

U-610 関節リウマチ
薬剤 **用量** **投与日** **コース期間: 56 日間**

1 レミケード点滴静注 10mg/kg Day1

※注意点

- ・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: レミケード維持療法(3mg/kg 1時間投与法)

U-611 関節リウマチ

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注 3mg/kg Day1

レジメン名: レミケード導入療法(5mg/kg 3時間導入法)

U-620 強直性脊椎炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注 5mg/kg Day1 Day15 Day43

レジメン名: レミケード維持療法(3mg/kg 2時間投与法)

U-612 関節リウマチ

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注 3mg/kg Day1

レジメン名: エンドキサンパルス療法 15mg/kg

U-621 血管炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 注射用エンドキサン 15mg/kg Day1

レジメン名: レミケード維持療法(5mg/kg 1時間投与法)

U-613 関節リウマチ

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注 5mg/kg Day1

レジメン名: エンドキサンパルス療法 500mg/m²

U-622 血管炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 注射用エンドキサン 500mg/m² Day1

レジメン名: レミケード導入療法(3mg/kg 2時間導入法)

U-614 関節リウマチ

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注 3mg/kg Day1 Day15 Day43

レジメン名: エンドキサンパルス療法(15mg/kg 2週毎)

U-623 血管炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 注射用エンドキサン 15mg/kg Day1

レジメン名: レミケード導入療法(3mg/kg 3時間導入法)

U-615 関節リウマチ

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注 3mg/kg Day1 Day15 Day43

レジメン名: エンドキサンパルス療法(15mg/kg 3週毎)

U-624 血管炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 注射用エンドキサン 15mg/kg Day1

レジメン名: レミケード(強直性脊椎炎 1回目)

U-616 強直性脊椎炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注 5mg/kg Day1

レジメン名: リツキサン(血管炎)

U-625 血管炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 リツキサン点滴静注 375mg/m² Day1

レジメン名: レミケード(強直性脊椎炎 2回目)

U-617 強直性脊椎炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注 5mg/kg Day1

レジメン名: weekly/パクリタキセル(B法:血管肉腫)

U-626 血管肉腫

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 パクリタキセル注「NK」 100mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36

レジメン名: レミケード維持療法(5mg/kg 1時間投与法)

U-618 強直性脊椎炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注 5mg/kg Day1

レジメン名: エンドキサンパルス療法(Lupus 外来用)

U-627 糸球体腎炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 注射用エンドキサン 500mg Day1

レジメン名: レミケード維持療法(5mg/kg 2時間投与法)

U-619 強直性脊椎炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 レミケード点滴静注 5mg/kg Day1

レジメン名: エンドキサンパルス療法(Lupus 入院用)

U-628 糸球体腎炎

薬剤	用量	投与日	コース期間	日間
----	----	-----	-------	----

1 注射用エンドキサン 1000mg Day1

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: シクロホスファミドパルス療法(Lupus 小児用)

U-629 糸球体腎炎

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 注射用エンドキサン	500mg/m ²	Day1			

レジメン名: mFOLFOX6(小腸癌)

U-637 小腸癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1 レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200mg/m ²	Day1			
2 エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	Day1			
3 5-FU注	400mg/m ²	Day1			
4 5-FU注	2400mg/m ²	Day1			

レジメン名: ボルテゾミブ療法(PGNMID移植腎再発)

U-630 糸球体腎炎

薬剤	用量	投与日	コース期間:	35	日間
1 ベルケイド注射用	1.3mg/m ²	Day1 Day8 Day15 Day22			

レジメン名: (限定)(HPS)エトポシドレジメン

U-631 自己免疫関連血球貪食症候群

薬剤	用量	投与日	コース期間:	53	日間
1 ラステット注	150mg/m ²	Day1 Day4 Day8 Day11 Day18 Day25 Day32 Day39 Day46 Day53			

レジメン名: XELOX(小腸癌)

U-638 小腸癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1 エルプラット点滴静注液	130mg/m ²	Day1			

レジメン名: mFOLFOX6(十二指腸癌)

U-632 十二指腸癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1 レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200mg/m ²	Day1			
2 エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	Day1			
3 5-FU注	400mg/m ²	Day1			
4 5-FU注	2400mg/m ²	Day1			

レジメン名: カルボプラテン(d1)+イリノテカン(d1,8,15)(NEC)

U-639 神経内分泌癌(NEC)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 カンプト点滴静注	60mg/m ²	Day1 Day8 Day15			
2 パラプラテン注射液	AUC=5	Day1			

レジメン名: カルボプラテン(d1)+エトポシド(d1,2,3)(NEC)

U-640 神経内分泌癌(NEC)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 ラステット注	100mg/m ²	Day1 Day2 Day3			
2 パラプラテン注射液	AUC=5	Day1			

レジメン名: (患者限定)シクロホスファミドパルス療法

U-633 重症筋無力症

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 注射用エンドキサン	500mg/m ²	Day1			

レジメン名: アクテムラ(小児 全身型JIA)

U-634 小児リウマチ性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1 アクテムラ点滴静注用	8mg/kg	Day1			

レジメン名: シスプラチン(d1)+イリノテカン(d1,8,15)(NEC)

U-641 神経内分泌癌(NEC)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 カンプト点滴静注	60mg/m ²	Day1 Day8 Day15			
2 シスプラチン点滴静注「マルコ」	60mg/m ²	Day1			

レジメン名: アクテムラ(小児 多関節型JIA)

U-635 小児リウマチ性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 アクテムラ点滴静注用	8mg/kg	Day1			

レジメン名: シスプラチン(d1)+エトポシド(d1,2,3)(NEC)

U-642 神経内分泌癌(NEC)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 シスプラチン点滴静注「マルコ」	80mg/m ²	Day1			
2 ラステット注	100mg/m ²	Day1 Day2 Day3			

レジメン名: シクロホスファミドパルス療法(小児)

U-636 小児リウマチ性疾患

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1 注射用エンドキサン	500mg/m ²	Day1			

※注意点

- 本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- 本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- 経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: リツキサン200mg

U-643 腎移植

薬剤	用量	投与日	コース期間:	1	日間
1	リツキサン点滴静注	200mg	Day1		

レジメン名: リツキサン300mg

U-644 腎移植

薬剤	用量	投与日	コース期間:	1	日間
1	リツキサン点滴静注	300mg	Day1		

レジメン名: リツキサン375mg/m²(小児)

U-645 腎移植

薬剤	用量	投与日	コース期間:	1	日間
1	リツキサン点滴静注	375mg/m ²	Day1		

レジメン名: リツキサン375mg/m²(成人)

U-646 腎移植

薬剤	用量	投与日	コース期間:	1	日間
1	リツキサン点滴静注	375mg/m ²	Day1		

レジメン名: リツキサン500mg

U-647 腎移植

薬剤	用量	投与日	コース期間:	1	日間
1	リツキサン点滴静注	500mg	Day1		

レジメン名: アクテムラ療法(成人ステル病)

U-648 成人ステル病

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	アクテムラ点滴静注	8mg/kg	Day1		

レジメン名: KD不応例レミケード単回投与

U-649 川崎病

薬剤	用量	投与日	コース期間:	1	日間
1	レミケード点滴静注	5mg/kg	Day1		

レジメン名: タイサプリ(ナタリズマブ)

U-650 多発性硬化症(MS)

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	タイサプリ点滴静注	300mg	Day1		

レジメン名: (患者限定)シスプラチン+ペメトレキセド(腹膜中皮腫)

U-651 中皮腫 腹膜中皮腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	アリムタ注射用	500mg/m ²	Day1		
2	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	75mg/m ²	Day1		

レジメン名: シスプラチン+ペメトレキセド+ペバシズマブ(中皮腫)

U-653 中皮腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	21	日間
1	アバシチン点滴静注用	15mg/kg	Day1		

2 アリムタ注射用 500mg/m² Day13 シスプラチン点滴静注
「マルコ」 75mg/m² Day1

レジメン名: ニボルマブ療法(悪性胸膜中皮腫:固定用量)

U-654 中皮腫

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
1	オブジーボ点滴静注	240mg	Day1		

レジメン名: レミケード維持療法(5mg/kg 1時間投与法)

U-655 潰瘍性大腸炎

薬剤	用量	投与日	コース期間:	56	日間
1	レミケード点滴静注用	5mg/kg	Day1		

レジメン名: レミケード維持療法(5mg/kg 2時間投与法)

U-656 潰瘍性大腸炎

薬剤	用量	投与日	コース期間:	56	日間
1	レミケード点滴静注用	5mg/kg	Day1		

レジメン名: レミケード維持療法(5mg/kg 3時間投与法)

U-657 潰瘍性大腸炎

薬剤	用量	投与日	コース期間:	56	日間
1	レミケード点滴静注用	5mg/kg	Day1		

レジメン名: レミケード導入療法(5mg/kg 3時間導入法)

U-658 潰瘍性大腸炎

薬剤	用量	投与日	コース期間:	98	日間
1	レミケード点滴静注用	5mg/kg	Day1 Day15 Day43		

レジメン名: (患者限定)EDP+mitotane療法

U-659 副腎皮質癌

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
1	ドキシソルビシン塩酸塩 注射液	40mg/m ²	Day1		
2	ラステット注	100mg/m ²	Day2 Day3 Day4		
3	シスプラチン点滴静注 「マルコ」	40mg/m ²	Day3 Day4		

レジメン名: MGUS+CIDPへのリツキシマブ療法

U-660 慢性炎症性脱髄性多発神経根炎

薬剤	用量	投与日	コース期間:	7	日間
1	リツキサン点滴静注	375mg/m ²	Day1		

※注意点

・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。 ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。

・本レジメンを無断に複製することを禁止します。

・バラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)

レジメン名: エンドキサンパルス療法 (CIDP)

U-661 慢性炎症性脱髄性多発神経根炎

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 注射用エンドキサン 600mg/m² Day1**レジメン名: アクテムラ療法**

U-662 膠原病

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 アクテムラ点滴静注 8mg/kg Day1

レジメン名: エンドキサンパルス療法 1000mg/m²

U-663 膠原病

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 注射用エンドキサン 1000mg/m² Day1**レジメン名: エンドキサンパルス療法 400mg/m²**

U-664 膠原病

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 注射用エンドキサン 400mg/m² Day1**レジメン名: エンドキサンパルス療法 500mg/m²**

U-665 膠原病

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 注射用エンドキサン 500mg/m² Day1**レジメン名: エンドキサンパルス療法 600mg/m²**

U-666 膠原病

薬剤	用量	投与日	コース期間:	28	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 注射用エンドキサン 600mg/m² Day1**レジメン名: エンドキサンパルス療法 ユーロレジメン**

U-667 膠原病

薬剤	用量	投与日	コース期間:	14	日間
----	----	-----	--------	----	----

1 注射用エンドキサン 500mg Day1

※注意点

- ・本レジメンは保険薬局向けに公開する目的で作成しています。
- ・経口剤の情報は本レジメンには掲載していません。
- ・本レジメンを無断に複製することを禁止します。
- ・パラプラチン注の用量に「AUC」が記載されている場合はCalvert 式に準拠します。

問い合わせ先: 東京女子医科大学病院 薬剤部医薬品情報室

TEL:03-3353-8112(内線33121)