

八千代医療センター採用医薬品集（外用・インスリン自己注射）

2021年8月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：290品目 院外採用：283品目（特別購入薬：50品目）

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	アイオピジンUD点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	ア ^o ラカニジン塩酸塩	○	○
本採用	アイノフロ吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ガス	○	○
本採用	アイファガン点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	アリニジン酒石酸塩	○	○
本採用	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	50g/瓶	酸化亜鉛	○	○
院外	アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	ナ ^o フコチン		○
本採用	アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	ナ ^o フコチン	○	○
本採用	アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ブクテ ^o シナトリウム	○	○
院外・特購	アジマイシン点眼液1%	1%1mL 2.5mL/本	アジスロマイシン水和物	(限定)	○
院外	アスタット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ラノコゾール		○
院外	アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ジメチルイ ^o ピ ^o ルアズレン	○	○
本採用	アスプールの液(0.5%)	5mg/mL 50mL/本	dl-イ ^o アラニ ^o ン塩酸塩	○	○
院外	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸	200μg/吸入	モタゾ ^o ンフランカルホ ^o ン酸エステル		○
院外	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アセサイド6%消毒液OEM-2	第一剤:750mL 第二剤:750mL	過酢酸	○	○
本採用	アセサイド6%消毒液OEM-3	第一剤:875mL 第二剤:875mL	過酢酸	○	○
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	グリ ^o ラミ ^o ・チ ^o ロ ^o ル ^o レ ^o イン酸塩		○
院外	アテキユラ吸入用カプセル低用量	1カプセル中：イン ^o タ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩173μg（イン ^o タ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ルとして150μg）・モ ^o タ ^o ゾ ^o ンフランカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プ ^o セル	イン ^o タ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩・モ ^o タ ^o ゾ ^o ンフランカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プ ^o セル		○
院外	アテキユラ吸入用カプセル中用量	1カプセル中：イン ^o タ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩173μg（イン ^o タ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ルとして150μg）・モ ^o タ ^o ゾ ^o ンフランカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プ ^o セル	イン ^o タ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩・モ ^o タ ^o ゾ ^o ンフランカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プ ^o セル		○
院外	アテキユラ吸入用カプセル高用量	1カプセル中：イン ^o タ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩173μg（イン ^o タ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ルとして150μg）・モ ^o タ ^o ゾ ^o ンフランカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プ ^o セル	イン ^o タ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩・モ ^o タ ^o ゾ ^o ンフランカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プ ^o セル		○
本採用	アドエア100ディスクス28吸入用	1 ^o リス ^o ター中：サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル：72.5μg(サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルとして50μg)/100μg	サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル	○	○
院外	アドエア100ディスクス60吸入用	1 ^o リス ^o ター中：サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル：72.5μg(サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルとして50μg)/100μg	サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル		○
院外/特購	アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル36.3μg(サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルとして25μg)/125μg	サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル	(限定)	○
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル36.3μg(サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルとして25μg)/250μg	サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル		○
本採用	アドエア250ディスクス28吸入用	1 ^o リス ^o ター中：サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル：72.5μg(サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルとして50μg)/250μg	サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル	○	○
院外	アドエア250ディスクス60吸入用	1 ^o リス ^o ター中：サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル：72.5μg(サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルとして50μg)/250μg	サルメ ^o テ ^o ロ ^o ルキ ^o シ ^o ホ酸塩・フル ^o チ ^o カ ^o ゾ ^o ン ^o ピ ^o ^o ン酸エステル		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	アドエア500ディスクス28吸入用	17リスター中:サルメテロールキナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1 [°] の酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1 [°] の酸エステル	○	○
院外	アドエア500ディスクス60吸入用	17リスター中:サルメテロールキナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1 [°] の酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1 [°] の酸エステル		○
院外	アドエア50エアゾール120吸入	1噴霧中:サルメテロールキナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1 [°] の酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/50μg	サルメテロールキナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1 [°] の酸エステル		○
院外	アドフィードパップ40mg	40mg/枚 6枚/包	フルビ [®] プロフェン		○
本採用	日点アトロピン点眼液1%	5mL/本	アトロピ [®] ン硫酸塩水和物	○	○
院外	アトロベントエロゾル20μg	20μg/1噴霧	イ [®] ラト [®] ロ [®] ム臭化物水和物		○
院外	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	30吸入/1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○
院外	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	30吸入/1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○
院外	アノ [®] ロエリプタ30吸入用	17リスター中:ウメクリジ [®] ニウム62.5μg)・ヒ [®] ランテロール25μg	ウメクリジ [®] ニウム臭化物・ヒ [®] ランテロールトリフェニル酢酸塩		○
院外	アピドラ注100単位/mL	1000単位/10mL/V	インスリン グル [®] ジン(遺伝子組換え)		○
特購	アピドラ注カート	1000単位/10mL/V	インスリン グル [®] ジン(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
本採用	アピドラ注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリン グル [®] ジン(遺伝子組換え)	○	○
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	0.025mg	トリアムシノロンアセト [®] ド		○
本採用	アラセナ [®] -A軟膏3%	30mg/g 5g/本	ヒ [®] ダラ [®] レ [®] ン	○	○
本採用	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○
院外	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○
本採用	アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液10W/W%「ファイザー」	100mg/g 500mL/本	アルキル [®] ジアミノエチルグリシン塩酸塩	○	○
本採用	アルメタ軟膏	1mg/g 5g/本	アルクロメタゾ [®] ン [®] 0.1 [°] の酸エステル	○	○
院外	アレサガテープ4mg	4mg/枚 (2.23cm×3.61cm)	エメダスチンフマル酸塩貼付剤		○
院外	アレジオン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ヒ [®] ト [®] ナ [®] チ [®] ン塩酸塩		○
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ヒ [®] ト [®] ナ [®] チ [®] ン塩酸塩		○
院外	アレバール吸入用溶解液0.125%	100mL/本	フロキ [®] チ [®] ール(サ [®] リ [®] ン)		○
本採用	アロンアルファA「三共」	0.5g/管	エ [®] ル [®] 2-シア [®] アクリ [®] レート	○	○
本採用	アンテベートクリーム0.05%	0.5mg/g 5g/本	ハ [®] タ [®] マ [®] リ [®] ン酪酸エステル [®] 0.1 [°] の酸エステル	○	○
院外	アンテベートローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	ハ [®] タ [®] マ [®] リ [®] ン酪酸エステル [®] 0.1 [°] の酸エステル		○
本採用	アンテベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ハ [®] タ [®] マ [®] リ [®] ン酪酸エステル [®] 0.1 [°] の酸エステル	○	○
院外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg	アセトアミノ [®] フェン		○
本採用	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg	アセトアミノ [®] フェン	○	○
院外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg	アセトアミノ [®] フェン		○
本採用	アンベック坐剤10mg	10mg	ムル [®] チ [®] 塩酸塩水和物	○	○
院外	アンベック坐剤20mg	20mg	ムル [®] チ [®] 塩酸塩水和物		○
院外	イドメシンコーワゲル1%	10mg/g 35g/本	イント [®] メ [®] タ [®] シ [®] ン		○
院外	イドメシンコーワゾル1%	10mg/g 30g/本	イント [®] メ [®] タ [®] シ [®] ン		○
本採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット(水和物として20.76mg)	ラ [®] ニ [®] ビ [®] ル [®] オ [®] ク [®] タン酸エステル	○	○
院外	イノレット30R注	300単位/3mL/筒	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
院外	イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	スマトリ [®] ア [®] ク		○
院外	インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」	100単位/1mL 10mL/V	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
院外	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	300単位/筒	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
院外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位/キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
特購	インスリン グラ [®] ル [®] ギ [®] ンBS注カート「リ [®] ー」	300単位/筒	インスリン グラ [®] ル [®] ギ [®] ン	(限定)	(限定)
本採用	インスリン グラ [®] ル [®] ギ [®] ンBS注ミリオペン「リ [®] ー」	300単位/3mL/キット	インスリン グラ [®] ル [®] ギ [®] ン	○	○
本採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位/3mL/キット	インスリン リスプロ	○	○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	インター吸入液1%	20mg/2mL/A	クロロリク酸ナトリウム	○	○
院外	インテバクリーム1%	1%/1g	インドメタシン		○
院外	インテバン坐剤25	25mg	インドメタシン		○
本採用	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○
本採用	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	
本採用	ウルティプロ吸入用カプセル	1Cp中:グリコピロニウム50μg・インダカロール110μg	グリコピロニウム臭化物・インダカロールマレイン酸塩	○	○
院外	ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○
本採用	ウレパールローション10%	100mg/g 20g/本	尿素	○	○
本採用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ブリンゾラミド	○	○
本採用	AZ含嗽用配合細粒「NP」	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○	○
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/	オミデネバグ イソプロピル液		○
本採用	エキザルベ	混合死菌浮遊液 0.166mL(大腸菌死菌: 約1.5億個・ブドウ球菌死 菌:約1.5億個・レンサ球菌 死菌:約0.15億個・緑膿 菌死菌:約0.15億個を 含む)・ヒトコルチゾン	混合死菌浮遊液・ヒトコルチゾン	○	○
院外	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	400μg/回	アクリジニウム臭化物		○
特購	エコリシン眼軟膏	3.5g/本	エリスロマイシンラクチドリン酸塩・ポリスチンメタンサルホン酸ナトリウム軟膏	(限定)	(限定)
本採用	エスケレ坐剤「250」	250mg	抱水クロラール	○	○
院外	エスケレ坐剤「500」	500mg	抱水クロラール		○
本採用	エスケレ注射用キット「500」	500mg/筒	抱水クロラール	○	○
院外	エストラーナテープ0.18mg	0.18mg/枚	エストラジオール		○
院外	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚	エストラジオール		○
院外	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジオール		○
本採用	S P トローチ0.25mg「明治」	0.25mg	デカリウム塩化物	○	○
本採用	エタノール	500mL(15℃で 95.1~96.9vol%を含む)	エタノール	○	○
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル中;インダカロール マレイン酸塩173μg(インダカ ロールとして150μg)・グリコ ピロニウム臭化物63μg(グリ コピロニウムとして50μg)・モ メタゾンフランカルボン酸エステル80μ	インダカロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル中;インダカロール マレイン酸塩173μg(インダカ ロールとして150μg)・グリコ ピロニウム臭化物63μg(グリ コピロニウムとして50μg)・モ メタゾンフランカルボン酸エステル160	インダカロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	エピデュオゲル	15g/本	アタパレン・過酸化ベンゾイルゲル	○	○
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	M S 温シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	○	○
本採用	M S 冷シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トメントール	○	○
本採用	エムラクリーム	リトカイン25mg・プロピトカイン 25mg/g 5g/本	リトカイン・プロピトカイン	○	○
院外	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾンシロ酸エステル		○
院外	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○
院外	エンベシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール		○
本採用	エンベシド錠100mg	100mg	クロトリマゾール	○	○
院外	オイラックスHクリーム	クロタミトン100mg・ヒトコルチ ゾン2.5mg/g 5g/本	クロタミトン・ヒトコルチゾン		○
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	クロタミトン	○	○
院外	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	9μg/吸入	ホモテロルマレイン酸塩水和物		○
院外	オキサロールローション25μg/g	25μg/g 10g/本	マキサルチール		○
院外	オキサロール軟膏25μg/g	25μg/g 10g/本	マキサルチール		○
本採用	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩錠	○	○
本採用	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	オスバン消毒剤10%	500mL/本	ベンザルニウム塩化物	○	○
本採用	オゼンピック皮下注0.25mgSD	0.25mg/本	ヘマグルト [®] （遺伝子組み換え）キット	○	○
本採用	オゼンピック皮下注0.5mgSD	0.5mg/本	ヘマグルト [®] （遺伝子組み換え）キット	○	○
本採用	オゼンピック皮下注1.0mgSD	1.0mg/本	ヘマグルト [®] （遺伝子組み換え）キット	○	○
本採用	オベガードM A眼灌流液	ブドウ糖1.5mg・塩化ナトリウム6.6mg・塩化カリウム0.36mg・塩化カルシウム水和物0.18mg・硫酸マグネシウム水和物0.3mg・炭酸水素ナトリウム2.1mg/mL	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マグネシウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○	○
本採用	オベガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
院外	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	トミフェン臭化物		○
本採用	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	オラネジンナトリウム	○	
院外	オラビ錠口腔用50mg	50mg/錠	ミコザール		○
本採用	オリブ油「ヨシダ」〔滅菌済〕	25mL/本	オリブ油	○	○
院外	オルセノ軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トコフェロールトコフェリル		○
本採用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	200μg/1噴霧	シクロピド [®]	○	○
院外	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg	インドメタロールメレン酸塩		○
本採用	カデックス軟膏分包45mg	45mg/5g/包	ヨ素軟膏	○	○
院外	カミンローション	カミン8g・酸化亜鉛8g/100mL 500mL/本	カミン・酸化亜鉛		○
本採用	カリーユニ点眼液0.005%	0.05mg/mL 5mL/本	ピレキサジン	○	○
院外	キサラタン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	タナロピド		○
本採用	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	キシロカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	キシロカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	キシロカイン	○	○
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	キシロカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	キシロカイン塩酸塩	○	○
本採用	キューパール100エアゾール	100μg/1噴霧	ヘキサメチルシロキサン [®] ピロリン酸エステル	○	○
院外	強力ポステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン		○
本採用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩・ジフェニトロキサミン塩	○	○
本採用	キンダベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	クロベタリン酪酸エステル	○	○
院外・特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リパシジル塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	クラビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物		○
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 30mL/個	グリセリン	○	○
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 60mL/個	グリセリン	○	○
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 120mL/個	グリセリン	○	○
本採用	グリセリン「ヨシダ」(滅菌済)	5mL/本(84.0~87.0%を含む)	グリセリン	○	○
本採用	グリセリン「ヨシダ」〔滅菌済〕	500mL/瓶(84.0~87.0%を含む)	グリセリン	○	○
本採用	グリセリンB C液「ヨシダ」	250mL/瓶(84.0~87.0%を含む)	0.025%ベンザルニウム塩化物添加グリセリン	○	○
本採用	クリンダマイシンゲル1%「DK」	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル	○	○
院外・特購	クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	エフィコザール	(限定)	○
本採用	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール	○	○
院外	クロマイー P 軟膏	クロラムフェニコール20mg・フラジオマイシン硫酸塩5mg・プレドニゾロン3mg/g 25g/本	クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾロン		○
院外	クロマイ錠錠100mg	100mg	クロラムフェニコール		○
本採用	クロラムフェニコール錠錠100mg「F」	100mg/錠	クロラムフェニコール	○	○
本採用	ゲーベングリーム	10mg/g 50g/本	スルファジアジン銀	○	○
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール2%クリーム	○	○
本採用	ケトコナゾールローション2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール2%ローション	○	○
本採用	ケトチフェン点眼液0.05%「SW」	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェン硫酸塩	○	○
本採用	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	○	○
本採用	ケラチナミンコーワ軟膏20%	200mg/g 25g/本	尿素	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩		○
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○	○
本採用	ゴージョーMHS	60mL/本	イタノール	○	○
本採用	ゴージョーMHS	215mL/本	イタノール	○	○
院外・特購	コソプト配合点眼液	トルリミト [®] 10mg・チロ [®] 5mg/mL 5mL/本	トルリミト [®] 塩酸塩・チロ [®] マレイ [®] ン酸塩	(限定)	○
院外	コソプトミニ配合点眼液	トルリミト [®] 10mg・チロ [®] 5mg/mL 0.4mL/本	トルリミト [®] 塩酸塩・チロ [®] マレイ [®] ン酸塩		○
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	テルゴシチン		○
本採用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型	5.1cm×7.6cm	酸化セルロース	○	○
本採用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型	5.1cm×35.6cm	酸化セルロース	○	○
本採用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ニューネット	15.2cm×22.9cm	酸化セルロース	○	○
本採用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿	2.5cm×5.1cm	酸化セルロース	○	○
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ビタミンA油		○
本採用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V	肺サーファクタント製剤	○	○
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロ [®] シト [®] ラト [®] 塩酸塩	○	○
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ケチフェン [®] マル [®] 酸塩		○
本採用	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	ケチフェン [®] マル [®] 酸塩	○	○
院外	サトウザルベ軟膏20%	200mg/g	酸化亜鉛		○
院外	サラソピリン坐剤500mg	500mg/個	サラソ [®] スル [®] ファ [®] ピ [®] リジン		○
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセリン 900mg/g	サリチル酸ワセリン		○
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤		○
院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg/カプセル	ハ [®] カ [®] メ [®] タ [®] リ [®] ン [®] プ [®] ロ [®] ン [®] 酸 [®] イ [®] ス [®] テ [®] ル		○
本採用	サルタノールインヘラー100μg	100μg/1回噴霧	サル [®] タ [®] ノ [®] ル [®] 硫酸塩	○	○
院外	サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノコバ [®] ラミン		○
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ピ [®] カ [®] ル [®] ン [®] 塩酸塩		○
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ピ [®] カ [®] ル [®] ン [®] 塩酸塩	○	○
院外	サンピロ点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ピ [®] カ [®] ル [®] ン [®] 塩酸塩		○
本採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ハ [®] タ [®] マ [®] リ [®] ン [®] リ [®] ン [®] 酸 [®] イ [®] ス [®] テ [®] ル [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム	○	○
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ホ [®] ビ [®] ト [®] ン [®] ヨ [®] ト [®]	○	○
本採用	シアノコバ [®] ラミン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバ [®] ラミン液	○	○
院外	シーブ [®] 吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリ [®] コ [®] ロ [®] ム [®] 臭 [®] 化 [®] 物		○
本採用	シエルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ヒアル [®] オン [®] 酸 [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム・ コ [®] ン [®] ト [®] ロ [®] イ [®] ン [®] 硫酸 [®] イ [®] ス [®] テ [®] ル [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム [®] 液	○	
院外	ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジク [®] ア [®] ホ [®] ル [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム		○
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジク [®] ロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム		○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日」	12.5mg	ジク [®] ロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム	○	○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医」	25mg	ジク [®] ロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム	○	○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医」	50mg	ジク [®] ロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム	○	○
本採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブ [®] テ [®] リ [®] ニ [®] ト [®] 160μg・ホ [®] ル [®] テ [®] ロ [®] ル [®] マ [®] ル [®] 酸 [®] 塩 [®] 水 [®] 和 [®] 物 [®] 4.5μg/	ブ [®] テ [®] リ [®] ニ [®] ト [®] ・ホ [®] ル [®] テ [®] ロ [®] ル [®] マ [®] ル [®] 酸 [®] 塩 [®] 水 [®] 和 [®] 物 [®]	○	○
本採用	硝酸銀「ファイザー」原末	25g/瓶	硝酸銀	○	○
本採用	消毒用エタノール液「ケンエー」	500mL/本	エタノール	○	○
院外	ジルダザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ハン [®] タ [®] ザ [®] ッ [®] ク		○
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ [®] 酸 [®] ・無 [®] 機 [®] 塩 [®] 類 [®] 配 [®] 合 [®] 剤 [®] 液		○
本採用	ジンジカインゲル20%	30g/本	ア [®] ミ [®] ノ [®] ア [®] 息 [®] 香 [®] 酸 [®] エ [®] チ [®] ル [®] 液	○	○
院外	親水クリーム	-	親水クリーム		○
本採用	シンボニー皮下注50mgオートインジェク	50mg/0.5mL/キット	ゴ [®] リ [®] ム [®] マ [®] フ [®] (遺 [®] 伝 [®] 子 [®] 組 [®] 換 [®] え)	○	
本採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭 [®] 酸 [®] 水 [®] 素 [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム・無 [®] 水 [®] リ [®] ン [®] 酸 [®] 二 [®] 水 [®] 素 [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム	○	○
本採用	スープレ [®] 吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	デ [®] ス [®] フ [®] ラ [®] ン	○	○
本採用	スコピゾル眼科用液	ヒ [®] ト [®] 時 [®] シ [®] フ [®] ル [®] セ [®] ル [®] - ス [®] 15mg・ 塩 [®] 化 [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム [®] 5.5mg・塩 [®] 化 [®] カ [®] リ [®] ム [®] 1.6mg・乾 [®] 燥 [®] 炭 [®] 酸 [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム [®] 0.6mg・リ [®] ン [®] 酸 [®] 水 [®] 素 [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム [®] 水 [®] 和 [®] 物 [®] 1.8mg・ホ [®] 酸 [®] 12mg 15mL/本	ヒ [®] ト [®] 時 [®] シ [®] フ [®] ル [®] セ [®] ル [®] - ス [®] 塩 [®] 化 [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム [®] ・塩 [®] 化 [®] カ [®] リ [®] ム [®] ・乾 [®] 燥 [®] 炭 [®] 酸 [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム [®] ・リ [®] ン [®] 酸 [®] 水 [®] 素 [®] ナ [®] ト [®] リ [®] ム [®] 水 [®] 和 [®] 物 [®] ・ホ [®] 酸 [®]	○	○
院外	スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	イ [®] ブ [®] ロ [®] フェ [®] ニ [®] コ [®] ノ [®] ル		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・特購	スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェン [°] コノール	(限定)	○
本採用	ステリクロンRエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/	ケルハキシジ [°] ン [°] グルン酸塩・イタノール	○	○
院外	ステリクロンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/	ケルハキシジ [°] ン [°] グルン酸塩		○
本採用	ステリクロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/	ケルハキシジ [°] ン [°] グルン酸塩	○	○
院外	ステロネマ注腸3mg	3mg(リン酸エステルナトリウムとして3.95mg) 100mL/個	ハ [°] タメタリ [°] ン [°] リン酸エステルナトリウム		○
本採用	スピオルトレスピマット60吸入	1噴霧中 [°] チオ [°] ピ [°] ウム2.5μg 及び [°] 相 [°] チ [°] テ [°] ール2.5μg	[°] チオ [°] ピ [°] ウム臭化物水和物・ [°] 相 [°] チ [°] テ [°] ール塩酸塩	○	○
院外	スピール膏M	357g/m ² 25cm ² /枚	サリチル酸		○
本採用	スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロト [°] ニゾ [°] ン [°] 吉草酸エステル酢酸エステル	○	○
本採用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg/噴霧	[°] チオ [°] ピ [°] ウム臭化物水和物	○	○
本採用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/Cp 7Cp/シート	[°] チオ [°] ピ [°] ウム臭化物水和物	○	○
院外	スプレキュア点鼻液0.15%	15mg(酢酸塩として15.75mg)/10mL/本	ブセリン酢酸塩		○
本採用	スポンゼル	5cm×2.5cm/枚	ゼラチン	○	○
院外・特購	スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	フェナリン	(限定)	○
本採用	スミルスチック3%	30mg/g 40g/本	フェル [°] バ [°] カ	○	○
本採用	石油ベンジン	500mL/本	石油ベンジン	○	○
院外	ゼビアクスローション2%	10g/本	ゼ [°] ノ [°] サ [°] ン		○
本採用	ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	リナ [°] タ [°] ート	○	○
院外	ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	リナ [°] タ [°] ート		○
本採用	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	250mg/250mL/B	セボ [°] フル [°] ラン	○	○
院外	セラスターテープ70	70mg/枚 10枚/包	イント [°] メ [°] タ [°] ン		○
院外	セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	フェル [°] バ [°] カ		○
院外	セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	フェル [°] バ [°] カ		○
院外	セレベント50ディスクス	50μg/17 [°] リス [°] ター [°] 60 [°] リス [°] ター/個	サルメテ [°] ール [°] キ [°] チ [°] ル [°] 酸塩		○
本採用	ゾビラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	ア [°] ク [°] ビ [°] ル	○	○
院外	ゾビラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	ア [°] ク [°] ビ [°] ル		○
本採用	ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	フラジ [°] オ [°] マイ [°] ン [°] 硫酸塩	○	○
本採用	ソリアク配合注ソロスター	1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤キット	○	○
本採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット	○	○
本採用	ソルベース	500g/瓶	マクロゴール400 マクロゴール4000	○	○
本採用	ダイアアップ坐剤4	4mg	ジ [°] ア [°] セ [°] バ [°] ム	○	○
本採用	ダイアアップ坐剤6	6mg	ジ [°] ア [°] セ [°] バ [°] ム	○	○
本採用	ダイアアップ坐剤10	10mg	ジ [°] ア [°] セ [°] バ [°] ム	○	○
本採用	タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ)	ヒト [°] フィ [°] ブリ [°] ゲン [°] 5.5mg・ト [°] ン [°] ビン [°] 画 [°] 分 [°] 2.0IU・ウ [°] マ [°] コ [°] ラ [°] ゲ [°] ン [°] 2.1mg/1cm ² 4.8cm×4.8cm/枚	生体組織接着剤	○	○
本採用	タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)	ヒト [°] フィ [°] ブリ [°] ゲン [°] 5.5mg・ト [°] ン [°] ビン [°] 画 [°] 分 [°] 2.0IU・ウ [°] マ [°] コ [°] ラ [°] ゲ [°] ン [°] 2.1mg/1cm ² 9.5cm×4.8cm/枚	生体組織接着剤	○	○
院外	タチオン点眼液2%	100mg/mL 5mL/本	ケ [°] ル [°] チ [°] オン		○
院外	タプコム配合点眼液	2.5mL/本	タ [°] ル [°] プ [°] ロ [°] スト [°] ・チ [°] エ [°] ロ [°] ル [°] マ [°] レ [°] イン [°] 酸		○
院外	タプロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	タ [°] ル [°] プ [°] ロ [°] スト		○
院外	タプロスミニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	タ [°] ル [°] プ [°] ロ [°] スト		○
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	オ [°] ロ [°] サ [°] ン	○	○
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	オ [°] ロ [°] サ [°] ン	○	○
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	タ [°] ロ [°] リ [°] ム [°] ス [°] 水 [°] 和 [°] 物		○
本採用	チモプトールX E点眼液0.5%	2.5mL/A	チ [°] エ [°] ロ [°] ル [°] マ [°] レ [°] イン [°] 酸塩	○	○
本採用	ツオブテロールテープ0.5mg「久光」	0.5mg/枚	ツ [°] オブ [°] テ [°] ロ [°] ール	○	○
本採用	ツオブテロールテープ1mg「久光」	1mg/枚	ツ [°] オブ [°] テ [°] ロ [°] ール	○	○
本採用	ツオブテロールテープ2mg「久光」	2mg/枚	ツ [°] オブ [°] テ [°] ロ [°] ール	○	○
本採用	ディスオーパ消毒液0.55%	3.8L/本	フ [°] タ [°] ール	○	○
院外	ディビゲル1mg	1mg	エ [°] ス [°] ト [°] ラ [°] ジ [°] オール		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・特購	ディフェリンゲル0.1%	15g/本	アダパレン	(限定)	○
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	デキサメタゾン	○	○
本採用	デスマプレシン・スプレー2.5協和	2.5µg/1回噴霧	デスマプレシリン酢酸塩水和物	○	○
本採用	デスマプレシン点鼻液0.01%協和	2.5mL/瓶	デスマプレシリン酢酸塩水和物	○	○
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ブナジシム塩酸塩		○
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エピジヒドロコレステリン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○
院外	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物10mg・過酸化ベンゾイル30mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○
院外	デュオトラバ配合点眼液	トラホプロロスト40µg・チロルマリン酸塩5mg	トラホプロロスト・チロルマリン酸塩		○
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg	2.1mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg	4.2mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg	8.4mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg	16.8mg/枚	フェンタニル		○
本採用	テラマイシン軟膏	25g/本	チンジテラサイクリン塩酸塩・ホリミキシンB硫酸塩	○	○
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリリルチン酸		○
本採用	デルモゾールGローション	10mL/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	クロベタゾールプロピオン酸エステル		○
院外・特購	デルモベートスカルプローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	クロベタゾールプロピオン酸エステル	(限定)	○
本採用	デルモベート軟膏0.05%	5g/本	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○
本採用	テルリジー100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸	○	○
本採用	テルリジー100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸	○	○
院外	テルリジー200エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸		○
院外	テルリジー200エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸		○
院外・特購	テレミンソフト坐薬2mg	2mg	ビサゾール	(限定)	○
本採用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg	ビサゾール	○	○
特購	トービ吸入液300mg	300mg/5mL/管	トブラマイシン	(限定)	(限定)
院外	トスフロ点眼液0.3%	5mL/本	トスフロキサントシル酸塩水和物		○
院外	トプシムクリーム0.05%	10g/本	フルオキノロン		○
本採用	トプシムローション0.05%	10g/本	フルオキノロン	○	○
院外	トプシム軟膏0.05%	10g/本	フルオキノロン		○
院外・特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブラマイシン	(限定)	○
院外	ドボネックス軟膏50µg/g	10g/本	カルシポトリオール		○
院外	ドボベットのゲル	15g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベットの軟膏（15g/本）	カルシポトリオール50.0µg・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル0.643mg/g 15g/本	カルシポトリオール水和物・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベットの軟膏（30g/本）	カルシポトリオール50.0µg・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル0.643mg/g 30g/本	カルシポトリオール水和物・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル		○
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トラホプロロスト		○
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルソプロミド塩酸塩		○
本採用	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/0.5mL/キット	デュラゲルチド	○	○
本採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位/筒	インスリン デゲルゲク（遺伝子組換え）	○	○
特購	トレシーバ注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デゲルゲク（遺伝子組換え）	(限定)	(限定)
本採用	ドレニゾンテープ4µg/cm ²	7.5cm×10cm	フルトキシドール	○	○
本採用	トロンピン液モチダソフトボトル1万	10000単位	トロンピン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	ドンパリドン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	ドンパリドン	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ナウゼリン坐剤60	60mg	ドンパ [®] リドン	○	○
院外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧	50μg/噴霧	モメタゾ [®] フランカルボ [®] ン酸エステル水和		○
本採用	ナノパスニードルⅡ	34G×4mm	-	○	○
院外	ナパゲルンローション3%	50mL/本	フェルビ [®] ナカ		○
院外	ナパゲルン軟膏3%	25g/本	フェルビ [®] ナカ		○
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニゾールクリーム2%	10g/本	外科ジアル		○
院外	ニゾールローション2%	10g/本	外科ジアル		○
本採用	ニトロダームT T S 25mg	25mg/枚	ニトログリセリン	○	○
院外	ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ニブラジロール		○
院外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg/枚	ロチゾ [®] チン		○
院外・特購	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚	ロチゾ [®] チン	(限定)	○
本採用	ニュープロパッチ9mg	9mg/枚	ロチゾ [®] チン	○	○
本採用	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg/枚	ロチゾ [®] チン	○	○
本採用	ニュープロパッチ18mg	18mg/枚	ロチゾ [®] チン	○	○
院外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚	オキサジチン塩酸塩		○
本採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	フェニレフリン塩酸塩	○	○
本採用	ネオステリングリーンうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○
本採用	ネオメドロールE E 軟膏	3g/本	フラジ [®] オキシ [®] ン硫酸塩・メチル [®] プロ [®] ピ [®] ロ [®] ン	○	○
本採用	ネグミンシュガー軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホ [®] ビ [®] ト [®] ン [®] ヨ [®] ド [®]	○	○
本採用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ホ [®] フェ [®] ナ [®] ク	○	○
本採用	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○
院外	ノボラピッド30ミックス注ペンフィル	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ノボラピッド50ミックスフレックスペン	300単位/本	インスリン アスパ [®] ルト		○
院外・特購	ノボラピッド70ミックスフレックスペン	300単位/本	インスリン アスパ [®] ルト	(限定)	○
院外	ノボラピッド注インレット	300単位/3mL	インスリン アスパ [®] ルト		○
本採用	ノボラピッド注フレックスタッチ	300単位/3mL	インスリン アスパ [®] ルト	○	○
院外・特購	ノボラピッド注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン アスパ [®] ルト	(限定)	○
院外・特購	ノボラピッド注ペンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパ [®] ルト	(限定)	○
院外・特購	ノボラピッド注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパ [®] ルト	(限定)	○
院外・特購	ノボリン30 R 注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
本採用	ノボリンN注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○
院外・特購	ノボリンR注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
本採用	ノボリンR注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外・特購	ノルspanテープ10mg	10mg/枚	ブ [®] プロ [®] レ [®] ル [®] フ [®] イン	(限定)	○
院外	ノルspanテープ20mg	20mg/枚	ブ [®] プロ [®] レ [®] ル [®] フ [®] イン		○
院外	ノルspanテープ5mg	5mg/枚	ブ [®] プロ [®] レ [®] ル [®] フ [®] イン		○
院外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	ニ [®] ブ [®] ラ [®] ジ [®] ロ [®] ール		○
本採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	チ [®] オ [®] 硫酸 [®] ナ [®] トリ [®] ウム [®] ・エ [®] タ [®] ノ [®] ール	○	○
院外	白色ワセリン	100g/本	白色ワセリン		○
院外	バクスマー点鼻粉末剤3mg	3mg/瓶	ゲ [®] ル [®] ル [®] ゴ [®] ン		○
本採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	ム [®] ピ [®] ロ [®] シ [®] ン [®] カル [®] シ [®] ウム	○	○
院外	パタノール点眼液0.1%	5mL/本	オ [®] パ [®] タ [®] ジ [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩		○
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	ア [®] ス [®] レ [®] ン [®] ス [®] ル [®] ホ [®] ン [®] 酸 [®] ナ [®] トリ [®] ウム [®] 水 [®] 和 [®] 物 [®] ・炭 [®] 酸 [®] 水 [®] 素 [®] ナ [®] トリ [®] ウム		○
本採用	ハッカ油「ヨシダ」	20mL/本	ハッカ油	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化アルミニウム	5mL/瓶	塩化アルミニウム	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化コバルト2%	5mL/瓶	塩化コバルト	○	○
院外	パッチテスト試薬金属 塩化パラジウム1%	5mL/瓶	塩化パラジウム		○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化マンガン2%	5g/瓶	塩化マンガン	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化亜鉛2%	5g/瓶	塩化亜鉛	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化金酸0.2%	5mL/瓶	塩化金酸	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化第二スズ1%	5mL/瓶	塩化第二スズ	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化第二鉄2%	5mL/瓶	塩化第二鉄	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化白金酸0.5%	5mL/瓶	塩化白金酸	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 三塩化インジウム	5mL/瓶	三塩化インジウム	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 四塩化イリジウム	5mL/瓶	四塩化イリジウム	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 臭化銀2%	5g/瓶	臭化銀	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 硫酸クロム2%	5mL/瓶	硫酸クロム	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 硫酸ニッケル5%	5mL/瓶	硫酸ニッケル	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	パッチテスト試薬金属 硫酸銅1%	5mL/瓶	硫酸銅	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム	5mL/瓶	重クロム酸カリウム	○	○
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	シクロステリン		○
院外・特購	パルミコート200タービュヘイラー112吸入	200µg/1回噴霧	ブデソニド	(限定)	○
本採用	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2mL/A	ブデソニド	○	○
院外・特購	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg/A	ブデソニド	(限定)	○
院外	ハルロピテープ8mg	8mg/枚	ロピニール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ16mg	16mg/枚	ロピニール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ24mg	24mg/枚	ロピニール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ32mg	32mg/枚	ロピニール塩酸塩		○
特購	バンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	バンコマイシン	(限定)	(限定)
院外	パンデルクリーム0.1%	5g/本	酪酸ブドウ酸ピロリジン		○
本採用	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」	0.6mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	○	○
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		○
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	PA・ヨド点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184% (希釈液付)	20mL/B	オキサゲルチン	○	○
本採用	ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	0.6mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	ビオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○
本採用	ビクトーザ皮下注18mg	18.0mg/筒	リラゲルチン	○	○
本採用	ビソナーブ4mg	4mg/枚	ビソナール	○	○
院外	ビソルボン吸入液0.2%	2mg/mL	ブドウ糖キニン塩酸塩		○
院外	ビデリオン皮下注用2mgペン	2mg/キット	エセチド		○
本採用	ビスクラブ消毒液4%	4% 500mL	クロルキシリングルコン酸塩	○	○
本採用	5%ビピテン液	500mL/本	クロルキシリングルコン酸塩	○	○
院外	ベスピアロスフィア28吸入	28吸入/1キット	グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフルマル酸塩水和物吸入剤		○
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ピマリシン		○
院外	ヒューマリン3/7注カート	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ヒューマリン3/7注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
本採用	ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外	ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ヒューマリンN注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
本採用	ヒューマリンR注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	○	○
院外	ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	インスリン		○
本採用	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/KT	インスリンアスパルト混合製剤-25		○
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/KT	インスリンアスパルト混合製剤-50		○
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	インスリンアスパルト(遺伝子組み換え)		○
院外・特購	ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○
院外・特購	ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	インスリンアスパルト(遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/1キット	インスリンアスパルト(遺伝子組み換え)		○
本採用	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ハロプロリド類似物質	○	○
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ハロプロリド類似物質		○
本採用	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ハロプロリド類似物質	○	○
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/1キット	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフルマル酸塩水和物吸入剤		○
院外	5-FU軟膏5%協和	5g/本	フルオウラシル		○
院外・特購	フィアスブ注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト(遺伝子組み換え)	(限定)	○
本採用	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位/KT	インスリン アスパルト(遺伝子組み換え)	○	○
院外	フィアスブ注 ペンフィル	300単位/本	インスリン アスパルト(遺伝子組み換え)		○
本採用	フィブラストスプレー-500	1個	トラフェルミン(遺伝子組換え)	○	○
本採用	液状フェノール「タイセイ」	500mL/本	フェノール	○	○
本採用	フェノール・亜鉛華リニメント	500g/瓶	フェノール 亜鉛華リニメント	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	フェルビナクパップ70mg「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	フェルビナク	○	○
本採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○
本採用	フェントステープ1mg	1mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○
本採用	フェントステープ2mg	2mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○
本採用	フェントステープ4mg	4mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○
院外	フェントステープ6mg	6mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○
院外	フェントステープ8mg	8mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○
本採用	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	500mL/本	複方ヨード・グリセリン	○	○
本採用	フラジール錠250mg	250mg	メロニダゾール	○	○
本採用	プラスチバックU 100	30G×1cc	-	○	○
本採用	フラビタン眼軟膏0.1%	5g/本	フラビンアテニンジメクロチドナトリウム	○	○
院外	フラビタン点眼液0.05%	5mL/本	フラビンアテニンジメクロチドナトリウム	○	○
本採用	フランドルテープ40mg	40mg	硝酸イソルビド	○	○
本採用	プリベシー液0.02%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○
本採用	プリベシー液0.05%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○
院外	プリビナ液0.05%	500mL/本	ナファゾリン硝酸塩	○	○
院外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	フルチカゾンブドゥオン酸エステル	○	○
院外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	フルチカゾンブドゥオン酸エステル	○	○
本採用	フルタイド100ディスカス	100μg/1回噴霧	フルチカゾンブドゥオン酸エステル	○	○
院外	フルタイド200ディスカス	200μg/1回噴霧	フルチカゾンブドゥオン酸エステル	○	○
院外	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」28噴霧用	50μg/1回噴霧	フルチカゾンブドゥオン酸エステル	○	○
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾンブドゥオン酸エステル125μg・ホルメテロールマル酸塩水和物5μg	フルチカゾンブドゥオン酸エステル・ホルメテロールマル酸塩水和物	○	○
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:フルチカゾンブドゥオン酸エステル125μg・ホルメテロールマル酸塩水和物5μg	フルチカゾンブドゥオン酸エステル・ホルメテロールマル酸塩水和物	○	○
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾンブドゥオン酸エステル50μg・ホルメテロールマル酸塩水和物5μg	フルチカゾンブドゥオン酸エステル・ホルメテロールマル酸塩水和物	○	○
院外	フルメタクリーム	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル	○	○
院外・特購	フルメタ軟膏	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル	(限定)	○
本採用	フルメトロン点眼液0.02%	5mL/本	フルメトロン	○	○
本採用	フルメトロン点眼液0.1%	5mL/本	フルメトロン	○	○
本採用	プレグランディン腔坐剤1mg	1mg	ゲメプロスタ	○	○
院外・特購	ブレドニン眼軟膏	5g/本	ブレドニゾロン酢酸エステル	(限定)	○
特購	ブレドネマ注腸20mg	20mg/個	ブレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤	(限定)	(限定)
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	-	フルルセインナトリウム	○	○
本採用	プロクトセディル軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	カルプロニウム塩化物水和物	○	○
本採用	プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	プロピフェール	○	○
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タクロリムス水和物	○	○
院外・特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タクロリムス水和物	(限定)	○
院外・特購	プロナック点眼液0.1%	5mL/本	プロムフェナクナトリウム水和物	(限定)	○
本採用	プロベト	100g/本	白色ワセリン	○	○
本採用	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ	2mg/mL 45mL/本	プロムヘキシン塩酸塩	○	○
院外	プロメライン軟膏5万単位/g	20g/本	プロメライン	○	○
本採用	フロリドゲル経口用2%	5g/本	ミコナゾール	○	○
院外・特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	ベキソロキサシン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セフメナム塩酸塩	○	○
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セフメナム塩酸塩	○	○
院外・特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	ベキト	(限定)	○
院外	バトプティック点眼液0.5%	5mL/本	バクテリオール塩酸塩	○	○
本採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サルブタモール硫酸塩	○	○
本採用	ベノキシール点眼液0.4%	5mL/本	ベンゾブロンカイン塩酸塩	○	○
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤	○	○
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	200g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤	○	○
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	25g/本	ヘパリン類似物質軟膏	○	○
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医	50g/本	ヘパリン類似物質液	○	○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・特購	ベピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒトコルチゾン	○	○
本採用	ベリプラストPコンビセット組織接着剤	1mL/本	生体組織接着剤	○	○
本採用	ベリプラストPコンビセット組織接着剤	3mL/本	生体組織接着剤	○	○
本採用	ベリプラストPコンビセット組織接着剤	5mL/本	生体組織接着剤	○	○
院外	ペンタサ坐剤1g	1g/個	メサジン		○
院外	ペンタサ注腸1g	1g/100mL/本	メサジン		○
本採用	ペンニードルプラス	32G×4mm	-	○	○
本採用	ホーリンV錠腔用錠1mg	1mg	イストリオール	○	○
院外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚	ワロアテロール		○
院外	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚	ワロアテロール		○
院外	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚	ワロアテロール		○
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	ヒペリリン	○	○
本採用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	30mL/本	ポビドンヨード	○	○
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	50mL/本	ポビドンヨード	○	○
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250mL/本	ポビドンヨード	○	○
本採用	ポビドンヨードゲル10%「明治」	4g/個	ポビドンヨード	○	○
本採用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	500mL/本	ポビドンヨード	○	○
本採用	ボラザG坐剤	1個	トリバノシド リドカイン	○	○
院外	ボルタレンサポ12.5mg	12.5mg	ジクフェナクナトリウム		○
院外	ボルタレンサポ25mg	25mg	ジクフェナクナトリウム		○
院外	ボルタレンサポ50mg	50mg	ジクフェナクナトリウム		○
院外	ボルタレンテープ15mg	7枚/包	ジクフェナクナトリウム		○
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○
院外	マイザークリーム0.05%	5g/本	ジフルプロレトナート		○
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジフルプロレトナート		○
院外	マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」	25μg/g 10g/本	マキサカルシトール		○
本採用	マクロゴール400	500mL/本	酸化エチレンと水との縮重合体	○	○
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	マキサカルシトール・ヘタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○
本採用	ミオコールスプレー0.3mg	0.3mg/本1回噴霧	ニトクゲリセリン	○	○
本採用	ミケランL A点眼液2%	2.5mL/本	カルテロール塩酸塩	○	○
院外	ミケルナ配合点眼液	2.5mL			
本採用	ミドリM点眼液0.4%	5mL/本	トピカミド	○	○
院外	ミドリP点眼液	5mL/本	トピカミド・フェニレリン塩酸塩		○
本採用	ミドレフリンP点眼液	5mL/本	トピカミド・フェニレリン塩酸塩	○	○
院外・特購	ミステープ5mg	5mg/枚	ニトクゲリセリン	(限定)	○
院外	ミルタックスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
本採用	ミレーナ52mg	52mg/個	レボノルゲステル	○	○
本採用	ムコスタ点眼液UD2%	20mg/mL 0.35mL/本	レバミド	○	○
本採用	ムコフィリン吸入液20%	2mL/包	アセチルシステインナトリウム塩	○	○
本採用	無水エタノール	500mL/本	エタノール	○	○
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○
院外	メノエイドコンビパッチ	イストラジオール0.62mg・酢酸ルイシステイン2.70mg	イストラジオール・酢酸ルイシステイン		○
本採用	メプチンエア-10μg吸入100回	10μg/1回噴霧	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○
院外	メプチンキッドエア-5μg吸入100回	5μg/1回噴霧	プロカテロール塩酸塩水和物		○
院外	メプチンシングヘラー10μg吸入100回	10μg/1回噴霧	プロカテロール塩酸塩水和物		○
本採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○
院外	モーラステープ20mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	モーラステープL 40mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	モーラスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
本採用	モーラスパップXR120mg	7枚/包	ケトプロフェン	○	○
院外	モーラスパップXR240mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	ユーパスタコーク軟膏	100g/瓶	精製白糖 ポビドンヨード		○
院外・特購	ユベラ軟膏	56g/本	トコフェロール・ビタミンA油	(限定)	○
本採用	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリテゲルテック210単位/3mL インスリアスパート90単位	インスリテゲルテック インスリアスパート	○	○
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	ラタノプロスト	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
特購	ラパリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シロリムスゲル	(限定)	(限定)
院外	ラミシールクリーム1%	10g/本	テルビナフィン塩酸塩		○
本採用	ランタスXR注シロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリン ^g ヲルギン	○	○
院外	ランタス注シロスター	300単位/3mL/キット	インスリン ^g ヲルギン		○
院外	リクスマア皮下注300μg	300μg/mL/キット	リシチナド		○
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トコラスト		○
院外	リズモン T G点眼液0.5%	2.5mL/本	テオフェリン塩酸塩		○
特購	リテンパ耳科用250μgセット	250μg/セット	トコフェリン(遺伝子組換え)	(限定)	
本採用	リドカインテープ18mg「NP」	(18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外・特購	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚	リバスタチン	(限定)	○
院外	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚	リバスタチン		○
院外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚	リバスタチン		○
院外	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚	リバスタチン		○
本採用	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	レボカバスタチン塩酸塩	○	○
院外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025mg	レボカバスタチン塩酸塩		○
院外・特購	リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	アトピ ^o 硫酸塩水和物	(限定)	○
本採用	流動パラフィン	-	流動パラフィン	○	○
院外	リレンザ	5mg/ブリストア	ザナミビル水和物		○
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ハタメタリン酸エステルナトリウム・フ ジマリン硫酸塩		○
院外	リンデロン-D Pクリーム	5g/本	ハタメタリン酸エステル		○
本採用	リンデロン-D P軟膏	5g/本	ハタメタリン酸エステル	○	○
院外	リンデロン-V Gローション	10mL/本	ハタメタリン吉草酸エステル・ゲンタ イン硫酸塩		○
本採用	リンデロン-V G軟膏0.12%	5g/本	ハタメタリン吉草酸エステル・ゲンタ イン硫酸塩	○	○
本採用	リンデロン-V クリーム0.12%	5g/本	ハタメタリン吉草酸エステル	○	○
本採用	リンデロン-V 軟膏0.12%	5g/本	ハタメタリン吉草酸エステル	○	○
院外・特購	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg/個		(特購)	○
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ハタメタリン酸エステルナトリウム		○
院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g 80g/本	エストラジール		○
院外	ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ルコナール		○
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ビマトプロスト		○
院外	ルムジエブ注カート	300単位/本	インスリン リスプロ		○
本採用	ルムジエブ注ミリオペン	300単位/本	インスリン リスプロ	○	○
院外・特購	ルムジエブ注100単位/mL	100単位/1mL 10mL/	インスリン リスプロ	(特購)	○
本採用	ルリコンクリーム1%	10mg/g 10g/本	ルリコザール	○	○
院外	ルリコン液1%	10mg/mL 10mL/本	ルリコザール		○
院外・特購	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg・30.8g/瓶	ブデソニド注腸剤	(限定)	○
院外	レスキュラ点眼液0.12%	5mL/本	イソプロパノール		○
本採用	レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ジフェニヒドラミン	○	○
院外・特購	レペタン坐剤0.2mg	0.2mg	ブプロピオン塩酸塩	(限定)	○
院外	レベミル注インレット	300単位/3mL	インスリン デテミル		○
本採用	レベミル注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン デテミル	○	○
特購	レベミル注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デテミル	(限定)	(限定)
本採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レルベア100エリプタ14吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25μ g・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル100μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル	○	○
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25μ g・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル100μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル		○
本採用	レルベア200エリプタ14吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25μ g・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル200μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	レルベア200エリプタ30吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25μg・フルチカゾンフランカルホニン酸エステル200μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルホニン酸エステル		○
本採用	ロードーズU100	30G×1/2cc	-	○	○
本採用	ロードーズU100	30G×3/10cc	-	○	○
本採用	ロキソニンゲル1%	10mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロキソニンテープ50mg	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
院外	ロキソニンテープ100mg	100mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
院外	ロキソニンパップ100mg	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
本採用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
本採用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロコアテープ	40mg/枚	エスフルビルプロフェン・ハッカ油		○
本採用	ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○
本採用	ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○
特購	ロゼックスゲル0.75%	0.75%/g×50g	メトロニダゾールゲル	(限定)	(限定)
本採用	ワコビタル坐剤30	30mg	フェニバルビタルナトリウム	○	○