

八千代医療センター採用医薬品集（外用・インスリン自己注射）

2022年5月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要のため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

【般】：一般名マスタの処方が可能なもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：264品目 院外採用：292品目（特別購入薬：54品目）

| ※1採用区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|---------|-------------------------|--|-----------------------------------|------|------|
| 院内 | アイオピジンU D点眼液1% | 10mg/mL 0.1mL/個 | アプロカニジン塩酸塩 | ○ | |
| 院内 | アイノフロ-吸入用800ppm | 800ppm/15.7L/本 | 一酸化窒素ガス | | |
| 本採用 | アイファガン点眼液0.1% | 1mg/mL 5mL/本 | アリモニジン酒石酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | | プリモニジン・プリンゾラミド | | ○ |
| 本採用 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 50g/瓶 | 酸化亜鉛 | ○ | ○ |
| 院外 | アクアチムクリーム1% | 10mg/g 10g/本 | ナジフロキサシ | | ○ |
| 本採用 | アクアチム軟膏1% | 10mg/g 10g/本 | ナジフロキサシ | ○ | ○ |
| 本採用 | アクトシン軟膏3% | 30mg/g 30g/本 | ブクテシナトリウム | ○ | ○ |
| 院外・院内特購 | アジマイシン点眼液1% | 1%1mL 2.5mL/本 | アジスロマイシン水和物 | (限定) | ○ |
| 院外 | アスタット軟膏1% | 10mg/g 10g/本 | ラノナール | | ○ |
| 院外 | アズノールうがい液4% | 40mg/mL 5mL/本 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | | ○ |
| 本採用 | アズノール軟膏0.033% | 0.33mg/g 20g/本 | ジメチルイソプロピルアズレン | ○ | ○ |
| 本採用 | アズブル液(0.5%) | 5mg/mL 50mL/本 | dl-イソプロレタリン塩酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸 | 200μg/吸入 | エタゾリンファンカルボン酸エステル | | ○ |
| 院外 | アズレン点眼液0.02%「わかもと」 | 0.2mg/mL 5mL/本 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | | ○ |
| 本採用 | アセサイド6%消毒液OEM-2 | 第一剤:750mL 第二剤:750mL | 過酢酸 | | |
| 本採用 | アセサイド6%消毒液OEM-3 | 第一剤:875mL 第二剤:875mL | 過酢酸 | | |
| 院外 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | 5mL/本 | アリソゾラミド・フェロルマリン酸塩 | | ○ |
| 院外 | アテキュラ吸入用カプセル低用量 | 1カプセル中：インダカテロール酢酸塩173μg（インダカテロールとして150μg）・エタゾリンファンカルボン酸エステルカプセル | インダカテロール酢酸塩・エタゾリンファンカルボン酸エステルカプセル | | ○ |
| 院外 | アテキュラ吸入用カプセル中用量 | 1カプセル中：インダカテロール酢酸塩173μg（インダカテロールとして150μg）・エタゾリンファンカルボン酸エステルカプセル | インダカテロール酢酸塩・エタゾリンファンカルボン酸エステルカプセル | | ○ |
| 院外 | アテキュラ吸入用カプセル高用量 | 1カプセル中：インダカテロール酢酸塩173μg（インダカテロールとして150μg）・エタゾリンファンカルボン酸エステルカプセル | インダカテロール酢酸塩・エタゾリンファンカルボン酸エステルカプセル | | ○ |
| 本採用 | アドエア100ディスカス28吸入用 | 1ブリスター中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル：72.5μg（サルメテロールとして50μg）/100μg | サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | ○ | ○ |
| 院外 | アドエア100ディスカス60吸入用 | 1ブリスター中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル：72.5μg（サルメテロールとして50μg）/100μg | サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | | ○ |
| 院外・院内特購 | アドエア125エアゾール120吸入用 | 1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg（サルメテロールとして25μg）/125μg | サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | (限定) | ○ |
| 院外 | アドエア250エアゾール120吸入用 | 1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg（サルメテロールとして25μg）/250μg | サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | | ○ |

| ※1採用 区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|------------|--------------------------------------|---|---|------|------|
| 本採用 | アドエア250ディスクス28吸入用 | 17リスター中:サルメテロールキシナ 酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸 エステル:72.5μg(サルメテロールと して50μg)/250μg | サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル | ○ | ○ |
| 院外 | アドエア250ディスクス60吸入用 | 17リスター中:サルメテロールキシナ 酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸 エステル:72.5μg(サルメテロールと して50μg)/250μg | サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル | | ○ |
| 院外 | アドエア500ディスクス28吸入用 | 17リスター中:サルメテロールキシナ 酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸 エステル:72.5μg(サルメテロールと して50μg)/500μg | サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル | | ○ |
| 院外 | アドエア500ディスクス60吸入用 | 17リスター中:サルメテロールキシナ 酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸 エステル:72.5μg(サルメテロールと して50μg)/500μg | サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル | | ○ |
| 院外 | アドエア50エアゾール120吸入 | 1噴霧中:サルメテロールキシナ 酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸 エステル36.3μg(サルメテロールとして 25μg)/50μg | サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル | | ○ |
| 院外 | アドフィードパップ40mg | 40mg/枚 6枚/包 | フルビ [°] プロフェン | | ○ |
| 本採用 | 日点アトロピン点眼液1% | 5mL/本 | アトロ [°] ピ [°] ン硫酸塩水和物 | ○ | ○ |
| 院外 | アトロベントエロゾル20μg | 20μg/1噴霧 | イ [°] プロピ [°] ル臭化物水和物 | | ○ |
| 院外 | アニューイティ100μgエリプタ30吸入用 | 30吸入/1キット | フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル吸入剤 | | ○ |
| 院外 | アニューイティ200μgエリプタ30吸入用 | 30吸入/1キット | フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル吸入剤 | | ○ |
| 院外 | アノールエリプタ30吸入用 | 17リスター中:ウメクリジニウム 62.5μg)・ヒランテロール25μg | ウメクリジニウム臭化物・ヒランテール トリフェニル酢酸塩 | | ○ |
| 院外 | アピドラ注100単位/mL | 1000単位/10mL/V | インスリン グルリジン(遺伝子組換 | | ○ |
| 特購 | アピドラ注カート | 1000単位/10mL/V | インスリン グルリジン(遺伝子組換 | (限定) | (限定) |
| 本採用 | アピドラ注ソロスター | 300単位/3mL/キット | インスリン グルリジン(遺伝子組換 | ○ | ○ |
| 院外 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | 0.025mg | トリアムシロンアセト [°] ド | | ○ |
| 本採用 | アラセナー A軟膏3% | 30mg/g 5g/本 | ヒ [°] タ [°] ラ [°] ベン | ○ | ○ |
| 本採用 | アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用 | 27.5μg/1噴霧 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | ○ | ○ |
| 院外 | アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 | 27.5μg/1噴霧 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | | ○ |
| 院内 | アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液 10W/W%「ファイザー」 | 100mg/g 500mL/本 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | | |
| 本採用 | アルメタ軟膏 | 1mg/g 5g/本 | アルクロメタゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル | ○ | ○ |
| 院外 | アレサガテープ4mg | 4mg/枚 (2.23cm×3.61cm) | エメダスチンフマル酸塩貼付剤 | | ○ |
| 院外 | アレジオン点眼液0.05% | 0.5mg/mL 5mL/本 | レ [°] タ [°] チ [°] ン塩酸塩 | | ○ |
| 院外 | アレジオンLX点眼液0.1% | 1mg/mL 5mL/本 | レ [°] タ [°] チ [°] ン塩酸塩 | | ○ |
| 院外 | アレバール吸入用溶解液0.125% | 100mL/本 | トリ [°] ホ [°] ール(サ [°] ハリ [°] ン) | | ○ |
| 本採用 | アロンアルファA「三共」 | 0.5g/管 | エ [°] ル [°] 2-シア [°] アクリレート | ○ | ○ |
| 本採用 | アンテベートクリーム0.05% | 0.5mg/g 5g/本 | ヘ [°] タ [°] メタ [°] リン酪酸エステル [°] 0.1 [°] ホ 酸エステル | ○ | ○ |
| 院外 | アンテベートローション0.05% | 0.5mg/g 10g/本 | ヘ [°] タ [°] メタ [°] リン酪酸エステル [°] 0.1 [°] ホ 酸エステル | | ○ |
| 本採用 | アンテベート軟膏0.05% | 0.5mg/g 5g/本 | ヘ [°] タ [°] メタ [°] リン酪酸エステル [°] 0.1 [°] ホ 酸エステル | ○ | ○ |
| 院外 | アンヒバ坐剤小児用50mg | 50mg | アセトミノフェン | | ○ |
| 本採用 | アンヒバ坐剤小児用100mg | 100mg | アセトミノフェン | ○ | ○ |
| 院外 | アンヒバ坐剤小児用200mg | 200mg | アセトミノフェン | | ○ |
| 本採用 | アンベック坐剤10mg | 10mg | エ [°] ル [°] ビ [°] ネ塩酸塩水和物 | ○ | ○ |
| 院外 | アンベック坐剤20mg | 20mg | エ [°] ル [°] ビ [°] ネ塩酸塩水和物 | | ○ |
| 院外 | イドメシニコワゲル1% | 10mg/g 35g/本 | インド [°] メタ [°] シ [°] ン | | ○ |
| 院外 | イドメシニコワゾル1% | 10mg/g 30g/本 | インド [°] メタ [°] シ [°] ン | | ○ |
| 本採用 | イナビル吸入粉末剤20mg | 20mg/キット(水和物として 20.76mg) | ラニニビル [°] メタ [°] ン酸エステル | ○ | ○ |
| 院外 | イレット30R注 | 300単位/3mL/筒 | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | | ○ |
| 院外 | イミグラン点鼻液20 | 20mg/0.1mL/本 | スマリ [°] プロ [°] パ [°] ク | | ○ |
| 院外 | インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」 | 100単位/1mL 10mL/V | インスリン アスパルト(遺伝子 組換え)注射液 | | ○ |

| ※1採用区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|---------|--------------------------------|---|--|------|------|
| 院外 | インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」 | 300単位/筒 | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液 | | ○ |
| 院外 | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 | 300単位/キット | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液 | | ○ |
| 特購 | インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 | 300単位/筒 | インスリン グラルギン | (限定) | (限定) |
| 本採用 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 300単位/3mL/キット | インスリン グラルギン | ○ | ○ |
| 院外 | インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」 | 100単位/1mL、10mL/瓶 | インスリン リスプロ | | ○ |
| 本採用 | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 | 300単位/3mL/キット | インスリン リスプロ | ○ | ○ |
| 院外 | インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」 | 300単位/筒 | インスリン リスプロ | | ○ |
| 本採用 | インタール吸入液1% | 20mg/2mL/A | ケモグリク酸ナトリウム | ○ | ○ |
| 院外 | インテバンクリーム1% | 1%/1g | インドメタシン | | ○ |
| 院外 | インテバン坐剤25 | 25mg | インドメタシン | | ○ |
| 本採用 | ウエルアップハンドローション1%(500mL) | 1g/100mL 500mL/本 | ケルヒキシジンケルヒン酸塩 | | |
| 院内 | ウエルフォーム | 180mL | ケルヒキシジンケルヒン酸塩 | | |
| 院外・院内特購 | ウルティプロ吸入用カプセル | 1Cp中:グリヒピロニウム50μg・インタカテロール110μg | グリヒピロニウム臭化物・インタカテロールレイン酸塩 | (限定) | ○ |
| 院外 | ウレパールクリーム10% | 100mg/g 20g/本 | 尿素 | | ○ |
| 本採用 | ウレパールローション10% | 100mg/g 20g/本 | 尿素 | ○ | ○ |
| 本採用 | ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3% | 90g/3000mL/B | D-ソルビトール | ○ | ○ |
| 本採用 | エイゾプト懸濁性点眼液1% | 10mg/mL 5mL/本 | ブリンゾラミド | ○ | ○ |
| 本採用 | AZ含嗽用配合細粒「NP」 | 2g/包 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム | ○ | ○ |
| 院外 | エイベリス点眼液0.002% | 0.002%1mL 2.5mL/混合死菌浮遊液 | オミデネバグ イソプロピル液 | | ○ |
| 本採用 | エキザルベ | 0.166mL(大腸菌死菌:約1.5億個・ブドウ球菌死菌:約1.5億個・レンサ球菌死菌:約0.15億個・緑膿菌死菌:約0.15億個を含む)・ヒドロコルチゾン | 混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン | ○ | ○ |
| 院外 | エクリラ400μgジエヌエア60吸入用 | 400μg/回 | アクリゾニウム臭化物 | | ○ |
| 特購 | エコリシン眼軟膏 | 3.5g/本 | イリスロマイシンラクチドリン酸塩・クリスチンメチルスルホン酸ナトリウム軟膏 | (限定) | (限定) |
| 本採用 | エスケレ坐剤「250」 | 250mg | 抱水ケラール | ○ | ○ |
| 院外 | エスケレ坐剤「500」 | 500mg | 抱水ケラール | | ○ |
| 本採用 | エスケレ注腸用キット「500」 | 500mg/筒 | 抱水ケラール | ○ | ○ |
| 院外 | エストラーナテープ0.18mg | 0.18mg/枚 | エストラジオール | | ○ |
| 院外 | エストラーナテープ0.36mg | 0.36mg/枚 | エストラジオール | | ○ |
| 院外 | エストラーナテープ0.72mg | 0.72mg/枚 | エストラジオール | | ○ |
| 本採用 | S P トローチ0.25mg「明治」 | 0.25mg | テカリウム塩化物 | ○ | ○ |
| 本採用 | エタノール | 500mL(15℃で95.1~96.9vol%を含む) | エタノール | ○ | ○ |
| 院外 | エナジア吸入用カプセル中用量 | 1カプセル中;インタカテロールレイン酸塩173μg(インタカテロールとして150μg)・グリヒピロニウム臭化物63μg(グリヒピロニウムとして50μg)・モメタジノンフランカルボン酸エステル80 | インタカテロールレイン酸塩・グリヒピロニウム臭化物・モメタジノンフランカルボン酸エステル | | ○ |
| 院外 | エナジア吸入用カプセル高用量 | 1カプセル中;インタカテロールレイン酸塩173μg(インタカテロールとして150μg)・グリヒピロニウム臭化物63μg(グリヒピロニウムとして50μg)・モメタジノンフランカルボン酸エステル | インタカテロールレイン酸塩・グリヒピロニウム臭化物・モメタジノンフランカルボン酸エステル | | ○ |
| 院外 | エピデュオゲル | 15g/本 | アタパレン・過酸化ベンゾイルゲル | | ○ |
| 本採用 | エネマスター注腸散 | 98.1g/100g 400g/本 | 硫酸バリウム | ○ | ○ |
| 本採用 | M S 温シップ「タイホウ」 | 5枚/包 | サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス | ○ | ○ |
| 本採用 | M S 冷シップ「タイホウ」 | 5枚/包 | サリチル酸メチル・dl-カンフル・メントール | ○ | ○ |
| 本採用 | エムラクリーム | リトカイン25mg・フピロカイン25mg/g 5g/本 | リトカイン・フピロカイン | ○ | ○ |

| ※1採用区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|---------|-----------------------|---|--|------|------|
| 院外 | エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 | 200μg/噴霧 5.6mg/瓶 | テ`キマツ`ンシ`ル酸エステル | | ○ |
| 院外 | エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 | 62.5μg | ウメクリジニウム臭化物 | | ○ |
| 院外 | エンベシドクリーム1% | 10mg/g 10g/本 | カトリマゾール | | ○ |
| 本採用 | エンベシド錠100mg | 100mg | カトリマゾール | ○ | ○ |
| 院外 | オイラックスHクリーム | カクタミン100mg・ヒト`コルチゾ`ン2.5mg/g 5g/本 | カクタミン・ヒト`コルチゾ`ン | | ○ |
| 本採用 | オイラックスクリーム10% | 100mg/g 10g/本 | カクタミン | ○ | ○ |
| 院外 | オーキシス9μgタービュハイラー60吸入 | 9μg/吸入 | ホルモテロール硫酸塩水和物 | | ○ |
| 院外 | オキサロールローション25μg/g | 25μg/g 10g/本 | マツカルシトール | | ○ |
| 院外 | オキサロール軟膏25μg/g | 25μg/g 10g/本 | マツカルシトール | | ○ |
| 本採用 | オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」 | 600mg/錠 | オキシコナゾール硝酸塩錠 | ○ | 【般】 |
| 院内 | オキシドール | 100mL/本 | オキシドール | ○ | |
| 本採用 | オスバン消毒剤10% | 500mL/本 | ベンザルコニウム塩化物 | ○ | ○ |
| 本採用 | オゼンピック皮下注0.25mgSD | 0.25mg/本 | セマゲルフト` (遺伝子組み換え) キット | ○ | ○ |
| 本採用 | オゼンピック皮下注0.5mgSD | 0.5mg/本 | セマゲルフト` (遺伝子組み換え) キット | ○ | ○ |
| 本採用 | オゼンピック皮下注1.0mgSD | 1.0mg/本 | セマゲルフト` (遺伝子組み換え) キット | ○ | ○ |
| 院内 | オペガードM A 眼灌流液 | ブドウ糖1.5mg・塩化ナトリウム6.6mg・塩化カリウム0.36mg・塩化カルシウム水和物0.18mg・硫酸マグネシウム水和物0.3mg・炭酸水素ナトリウム2.1mg/ml | ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マグネシウム水和物・炭酸水素ナトリウム | | |
| 院内 | オペガン1.1眼粘弾剤1% | 11mg/1.1mL/筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | | |
| 院内 | オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% | 8.5mg/0.85mL/筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | | |
| 院外 | オラドールトローチ0.5mg | 0.5mg | ト`ミエン臭化物 | | ○ |
| 院内 | オラネジン消毒液1.5% | 200mL/本 | オ`ラネジ`ンク`ル`ン酸 | | |
| 院外 | オラビ錠口腔用50mg | 50mg/錠 | ミコナゾール | | ○ |
| 本採用 | オリブ油「ヨシダ」〔滅菌済〕 | 25mL/本 | オリブ油 | ○ | ○ |
| 院外 | オルセノン軟膏0.25% | 2.5g/g 30g/本 | ト`レチノ`イン`ト`コ`フェリ`ル | | ○ |
| 本採用 | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 | 200μg/1噴霧 | シクルロド` | ○ | ○ |
| 院外 | オンプレス吸入用カプセル150μg | 150μg | インダ`カテ`ロール`マ`レ`イン`酸`塩 | | ○ |
| 本採用 | カデックス軟膏分包45mg | 45mg/5g/包 | ヨ`素軟膏 | ○ | ○ |
| 院外 | カラムンローション | カラムン8g・酸化亜鉛8g/100mL 500mL/本 | カラムン・酸化亜鉛 | | ○ |
| 本採用 | ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005%「参 | 0.05mg/mL 5mL/本 | ピ`レノ`キシ`ン | ○ | ○ |
| 院外 | キサラタン点眼液0.005% | 50μg/mL 2.5mL/本 | ラタノ`ロ`スト | | ○ |
| 本採用 | キシロカインゼリー2% | 20mg/mL 30mL/本 | リド`カイン`塩酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | キシロカインビスカス2% | 20mg/mL 100mL/瓶 | リド`カイン`塩酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | キシロカインポンプスプレー8% | 80mg/mL 80g/瓶 | リド`カイン | ○ | ○ |
| 本採用 | キシロカイン液「4%」 | 40mg/mL 100mL/瓶 | リド`カイン`塩酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | キシロカイン点眼液4% | 40mg/mL 20mL/瓶 | リド`カイン`塩酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | キューパール100エアゾール | 100μg/1噴霧 | ヘ`ク`マツ`ンシ`ル`酸`エステル | ○ | ○ |
| 院外 | 強力ポステリザン(軟膏) | 2g/本 | 大腸菌死菌浮遊液・ヒト`コルチゾ`ン | | ○ |
| 本採用 | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 | 10g/本 | ヒト`コルチゾ`ン`酢酸`エステル・フラジ`オ`マイシン`硫酸塩・ジ`フェニト`ラミン`塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | キングバート軟膏0.05% | 0.5mg/g 5g/本 | ク`ロ`マツ`ン`酪酸`エステル | ○ | ○ |
| 院外・院内特購 | グラナテック点眼液0.4% | 4mg/mL 5mL/本 | リパ`ス`シル`塩酸塩水和物 | (限定) | ○ |
| 院外 | クラビット点眼液1.5% | 15mg/mL 5mL/本 | レホ`ポ`キサ`ン`水和物 | | ○ |
| 本採用 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | 50g/100g 30mL/個 | グリセリン | ○ | ○ |
| 本採用 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | 50g/100g 60mL/個 | グリセリン | ○ | 【般】 |
| 本採用 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | 50g/100g 120mL/個 | グリセリン | ○ | ○ |
| 本採用 | グリセリン「ヨシダ」(滅菌済) | 25mL/本 (84.0~87.0%を含む) | グリセリン | ○ | ○ |
| 本採用 | グリセリン「ヨシダ」(滅菌済) | 500mL/瓶 (84.0~87.0%を含む) | グリセリン | ○ | ○ |
| 本採用 | グリセリンB C液「ヨシダ」 | 250mL/瓶 (84.0~87.0%を含む) | 0.025%ベンザルコニウム塩化物 添加グリセリン | ○ | ○ |
| 本採用 | クリンダマイシゲル1%「DK」 | 10mg/g 10g/本 | クリンダ`マイシン`リン`酸`エステル | ○ | ○ |

| ※1採用 区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|-------------|------------------------------|---|---------------------------------------|------|------|
| 院外・ 院内特購 | クレナフィン爪外用液10% | 100mg/g 3.56g(4mL)/本 | エフィコナゾール | (限定) | ○ |
| 本採用 | クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 | 10mg/g 10g/本 | クロトリマゾール | ○ | 【般】 |
| 院外 | クロマイー P 軟膏 | クロラムフェニコール20mg・フラジ マイシン硫酸塩5mg・プレドニ ゾロン3mg/a 25g/本 | クロラムフェニコール・フラジ マイシン硫酸塩・プレドニ ゾロン | | ○ |
| 院外 | クロマイ臍錠100mg | 100mg | クロラムフェニコール | | ○ |
| 本採用 | クロラムフェニコール臍錠100mg「F」 | 100mg/錠 | クロラムフェニコール | ○ | ○ |
| 本採用 | ゲーベンクリーム | 10mg/g | スルファジジン銀 | ○ | ○ |
| 本採用 | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 2%1g 10g/本 | ケトコナゾール2%クリーム | ○ | 【般】 |
| 本採用 | ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 | 0.5mg/mL 5mL/本 | ケトチフェン硫酸塩 | ○ | 【般】 |
| 本採用 | ケトプロフェンテープ20mg「BMD」 | 7枚/包 | ケトプロフェン | ○ | 【般】 |
| 本採用 | ケラチナミンコーワ軟膏20% | 200mg/g 25g/本 | 尿素 | ○ | ○ |
| 院外 | ゲンタシン軟膏0.1% | 1mg/g 10g/本 | ゲンタマイシン硫酸塩 | | ○ |
| 本採用 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 | 1mg/g 10g/本 | ゲンタマイシン硫酸塩 | ○ | 【般】 |
| 院内 | ゴージョーMHS | 60mL/本 | イタノール | | |
| 院内 | ゴージョーMHS | 215mL/本 | イタノール | | |
| 院外・ 院内特購 | コソプト配合点眼液 | トルゲラミド 10mg・フェニ 5mg/mL 5mL/本 | トルゲラミド 塩酸塩・フェニ ン酸塩 | (限定) | ○ |
| 院外 | コソプトミニ配合点眼液 | トルゲラミド 10mg・フェニ 5mg/mL 0.4mL/本 | トルゲラミド 塩酸塩・フェニ ン酸塩 | | ○ |
| 院外 | コレクチム軟膏0.5% | 5mg/g 5g/本 | テルコシチブ | | ○ |
| 院外 | コレクチム軟膏0.25% | 0.25%1g | テルコシチブ | | ○ |
| 院内 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型 | 5.1cm×7.6cm | 酸化セルロース | | |
| 院内 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型 | 5.1cm×35.6cm | 酸化セルロース | | |
| 院内 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ユニット | 15.2cm×22.9cm | 酸化セルロース | | |
| 院内 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿 | 2.5cm×5.1cm | 酸化セルロース | | |
| 院外 | ザーネ軟膏0.5% | 5mg(5000単位)/g 500g/瓶 | ビタミンA油 | | ○ |
| 本採用 | サーファクテン気管注入用120mg | 120mg/V | 肺サーファクタント製剤 | ○ | ○ |
| 本採用 | サイプレジン1%点眼液 | 10mg/mL 10mL/本 | シクロピリトール塩酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | ザジテン点眼液0.05% | 0.5mg/mL 5mL/本 | ケトチフェン硫酸塩 | | ○ |
| 本採用 | ザジテン点鼻液0.05% | 0.5mg/mL 8mL/本 | ケトチフェン硫酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | サトウザルベ軟膏20% | 200mg/g | 酸化亜鉛 | | ○ |
| 院外 | サラソピリン坐剤500mg | 500mg/個 | サラソピリン | | ○ |
| 院外 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | サリチル酸100mg・白色ワセ リン900mg/g | サリチル酸ワセリン | | ○ |
| 院外 | サリベートエアゾール | 50g/個 | リン酸二カリウム・無機塩類配 合剤噴霧剤 | | ○ |
| 院外 | サルコートカプセル外用50μg | 50μg/カプセル | ヘキサメチレンピロリドン | | ○ |
| 本採用 | サルタノールインヘラー100μg | 100μg/1回噴霧 | サルタノール硫酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | サンコバ点眼液0.02% | 0.2mg/mL 5mL/本 | シアノコバラミン | | ○ |
| 院外 | サンピロ点眼液1% | 10mg/mL 5mL/本 | ピロピロリン酸塩 | | ○ |
| 本採用 | サンピロ点眼液2% | 20mg/mL 5mL/本 | ピロピロリン酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | サンピロ点眼液3% | 30mg/mL 5mL/本 | ピロピロリン酸塩 | | ○ |
| 本採用 | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 5mg/5mL/本 | ヘキサメチレンピロリドン | ○ | ○ |
| 本採用 | 産婦人科用イソジンクリーム5% | 250g/本 | ポピドンヨード | ○ | ○ |
| 本採用 | シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 | 5mL/本 | シアノコバラミン液 | ○ | ○ |
| 院外 | シープリ吸入用カプセル50μg | 50μg/Cp 7Cp/シート | グリコピロリン酸臭化物 | | ○ |
| 本採用 | シエルガン0.5眼粘弾剤 | 0.5mL/1筒 | ヒアルロン酸ナトリウム・ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム液 | | |
| 院外 | ジクアス点眼液3% | 30mg/mL 5mL/本 | ジクアロリドナトリウム | | ○ |
| 本採用 | ジクトルテープ75mg | 75mg1枚 | ジクロフェナクナトリウム | ○ | ○ |
| 院外 | ジクロード点眼液0.1% | 1mg/mL 5mL/本 | ジクロフェナクナトリウム | | ○ |
| 本採用 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日」 | 12.5mg | ジクロフェナクナトリウム | ○ | ○ |
| 本採用 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医」 | 25mg | ジクロフェナクナトリウム | ○ | ○ |
| 本採用 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医」 | 50mg | ジクロフェナクナトリウム | ○ | ○ |
| 特購 | ジムソ膀胱内注入液50% | 50%50mL1瓶 | ジメチルホルムアミド液 | (限定) | (限定) |
| 本採用 | シムピコートタービュヘイラー60吸入 | ブテソニド 160μg・ホルメテ ル硫酸塩水和物4.5μg/ 500mL/本 | ブテソニド・ホルメテ ル硫酸塩水和物 | ○ | ○ |
| 本採用 | 消毒用エタノール液「ケンエー」 | 500mL/本 | エタノール | ○ | ○ |

| ※1採用区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|---------|-----------------------|--|---|------|------|
| 院外 | ジルダザック軟膏3% | 30mg/g 10g/本 | ハンダザック | | ○ |
| 院外 | 人工涙液マイティア点眼液 | 5mL/瓶 | ホウ酸・無機塩類配合剤液 | | ○ |
| 本採用 | ジンジカインゲル20% | 30g/本 | アミノ安息香酸エチル液 | ○ | ○ |
| 院外 | 親水クリーム | - | 親水クリーム | | ○ |
| 本採用 | シンボニー皮下注50mgオートインジェク | 50mg/0.5mL/キット | ゴリムアブブ(遺伝子組換え) | ○ | |
| 本採用 | 新レシカルボン坐剤 | 1個 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | ○ | ○ |
| 本採用 | スープレン吸入麻酔液 | 1mL/mL 240mL/瓶 | デスフルラン | ○ | ○ |
| 本採用 | スコピゾル眼科用液 | ヒトロキシフェルロース15mg・塩化ナトリウム5.5mg・塩化カリウム1.6mg・乾燥炭酸ナトリウム0.6mg・リン酸水素ナトリウム水和物1.8mg・杓酸12mg 15mL/本 | ヒトロキシフェルロース・塩化ナトリウム・塩化カリウム・乾燥炭酸ナトリウム・リン酸水素ナトリウム水和物・杓酸 | ○ | ○ |
| 院外 | スタデルムクリーム5% | 50mg/g 10g/本 | イブプロフェン°コノール | | ○ |
| 本採用 | スタデルム軟膏5% | 50mg/g 10g/本 | イブプロフェン°コノール | ○ | ○ |
| 本採用 | ステリクロンRエタノール液0.5 | 0.5g/100mL 500mL/ | ケルハキシジノケルン酸塩・イタノール | ○ | ○ |
| 院外 | ステリクロンW液0.02 | 0.02g/100mL 500mL/ | ケルハキシジノケルン酸塩 | | ○ |
| 本採用 | ステリクロンW液0.5 | 0.5g/100mL 500mL/ | ケルハキシジノケルン酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | ステロネマ注腸3mg | 3mg(リン酸エステルナトリウムとして3.95mg) 100mL/個 | ヘタメタゾリン酸エステルナトリウム | | ○ |
| 本採用 | スピオルトレスピマツト60吸入 | 1噴霧中フルオロウム2.5μg及び和剤2.5μg | フルオロウム臭化物水和物・和剤 | ○ | ○ |
| 院外 | スピール膏M | 357g/m2 25cm2/枚 | サリチル酸 | | ○ |
| 本採用 | スピラゾン軟膏0.3% | 3mg/g 5g/本 | プロトニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ○ | ○ |
| 本採用 | スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入 | 2.5μg/噴霧 | フルオロウム臭化物水和物 | ○ | ○ |
| 院外・院内特購 | スピリーバ吸入用カプセル18μg | 18μg/Cp 7Cp/シート | フルオロウム臭化物水和物 | (限定) | ○ |
| 院外 | スプレキア点鼻液0.15% | 15mg(酢酸塩として15.75mg)/10mL/本 | ブセリン酢酸塩 | | ○ |
| 本採用 | スポンゼル | 5cm×2.5cm/枚 | ゼラチン | ○ | ○ |
| 院外・院内特購 | スミスリンローション5% | 50mg/g 30g/本 | フェトリン | (限定) | ○ |
| 本採用 | 石油ベンジン | 500mL/本 | 石油ベンジン | ○ | ○ |
| 院外 | ゼビアックスローション2% | 10g/本 | ゼノキサシン | | ○ |
| 本採用 | ゼフナートクリーム2% | 20mg/g 10g/本 | リナフター | ○ | ○ |
| 院外 | ゼフナート外用液2% | 20mg/mL 10mL/本 | リナフター | | ○ |
| 本採用 | セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 | 250mg/250mL/B | セボフルラン | ○ | ○ |
| 院外 | セルタッチパップ70 | 70mg/枚 7枚/包 | フェルビナク | | ○ |
| 院外 | セルタッチパップ140 | 140mg/枚 7枚/包 | フェルビナク | | ○ |
| 院外 | セレベント50ディスクス | 50μg/17リスター 60リスター/個 | サルメテロールシナナ酸塩 | | ○ |
| 本採用 | ゾビラックス眼軟膏3% | 30mg/g 5g/本 | アシクロビル | ○ | ○ |
| 院外 | ゾビラックス軟膏5% | 50mg/g 5g/本 | アシクロビル | | ○ |
| 本採用 | ソフラチュール貼付剤10cm | 10cm×10cm 10.8mg/枚 | フラジマイン硫酸塩 | ○ | ○ |
| 院外・院内特購 | ソリアア配合注ソロスター | 1キット | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤キット | (限定) | ○ |
| 本採用 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 1キット | インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット | ○ | ○ |
| 本採用 | ソルベース | 500g/瓶 | マクロゴール400 マクロゴール4000 | ○ | ○ |
| 本採用 | ダイアアップ坐剤4 | 4mg | ジアセパム | ○ | ○ |
| 本採用 | ダイアアップ坐剤6 | 6mg | ジアセパム | ○ | ○ |
| 本採用 | ダイアアップ坐剤10 | 10mg | ジアセパム | ○ | ○ |
| 院内 | タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ) | ヒトファイブリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウロキナーゼ2.1mg/1cm2 4.8cm×4.8cm/枚 | 生体組織接着剤 | | |

| ※1採用 区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|-------------|-------------------------------|--|---|------|------|
| 院内 | タコシール組織接着用シート（レギュラーサイズ） | ヒトフィブリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン2.1mg/1cm ² 9.5cm×4.8cm/枚 | 生体組織接着剤 | | |
| 院外 | タチオン点眼用2% | 100mg/mL 5mL/本 | グルチオン | | ○ |
| 院外 | タブコム配合点眼液 | 2.5mL/本 | タフル [®] ロスト・チロ [®] ルマリン酸 | | ○ |
| 院外 | タブロス点眼液0.0015% | 15μg/mL 2.5mL/本 | タフル [®] ロスト | | ○ |
| 院外 | タブロスミニ点眼液0.0015% | 0.3mL/本 | タフル [®] ロスト | | ○ |
| 本採用 | タリビッド眼軟膏0.3% | 3mg/g 3.5g/本 | チロ [®] チン | ○ | ○ |
| 本採用 | タリビッド耳科用液0.3% | 3mg/mL 5mL/本 | チロ [®] チン | ○ | ○ |
| 院外 | タリムス点眼液0.1% | 0.1%5mL/本 | タロ [®] ムス水和物 | | ○ |
| 本採用 | チモプ [®] ールX E点眼液0.5% | 2.5mL/A | チロ [®] ルマリン酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | ツムラ紫雲膏 | 500g×1瓶 | 紫雲膏 | | ○ |
| 本採用 | ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 0.5mg/枚 | ツロ [®] ブテロール | ○ | 【般】 |
| 本採用 | ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 1mg/枚 | ツロ [®] ブテロール | ○ | 【般】 |
| 本採用 | ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 2mg/枚 | ツロ [®] ブテロール | ○ | 【般】 |
| 院内 | ディスオーバ消毒液0.55% | 3.8L/本 | フタル | | |
| 院外 | デイビゲル1mg | 1mg | イストラジ [®] オール | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ディフェリンゲル0.1% | 15g/本 | アダ [®] パレン | (限定) | ○ |
| 本採用 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 5g/本 | デ [®] キサメタゾン | ○ | 【般】 |
| 本採用 | デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリン」 | 2.5μg/1回噴霧 | デ [®] スマプレシン酢酸塩水和物 | ○ | ○ |
| 本採用 | デスマプレシン点鼻液0.01%協和 | 2.5mL/瓶 | デ [®] スマプレシン酢酸塩水和物 | ○ | ○ |
| 院外 | デタントール0.01%点眼液 | 5mL/本 | ブ [®] ナジ [®] ン塩酸塩 | | ○ |
| 本採用 | テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 | 0.6g/本 | エピジヒドロコlestリン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏 | ○ | ○ |
| 院外 | デュアック配合ゲル | クリンダマイシンリン酸エステル水和物10mg・過酸化ベンゾイル30mg/g 10g/本 | クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル | | ○ |
| 院外 | デュオトラバ配合点眼液 | トラホ [®] プ [®] ロスト40μg・チロ [®] ルマリン酸塩5mg | トラホ [®] プ [®] ロスト・チロ [®] ルマリン酸塩 | | ○ |
| 院外 | デュロテップM Tパッチ2.1mg | 2.1mg/枚 | フェンタニル | | ○ |
| 院外 | デュロテップM Tパッチ4.2mg | 4.2mg/枚 | フェンタニル | | ○ |
| 院外 | デュロテップM Tパッチ8.4mg | 8.4mg/枚 | フェンタニル | | ○ |
| 院外 | デュロテップM Tパッチ16.8mg | 16.8mg/枚 | フェンタニル | | ○ |
| 本採用 | テラマイシン軟膏 | 25g/本 | チキシト [®] サイクリン塩酸塩・ホ [®] リミキ [®] ンB硫酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | デルマクリンA軟膏1% | 10mg/g 10g/本 | グリチル [®] チン酸 | | ○ |
| 本採用 | デルモゾールGローション | 10mL/本 | ハ [®] タメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | デルモベートクリーム0.05% | - | ク [®] ハ [®] タ [®] リ [®] ール [®] ロ [®] ビ [®] チ [®] ン酸エステル | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | デルモベートスカルプローション0.05% | 0.5mg/g 10g/本 | ク [®] ハ [®] タ [®] リ [®] ール [®] ロ [®] ビ [®] チ [®] ン酸エステル | (限定) | ○ |
| 本採用 | デルモベート軟膏0.05% | 5g/本 | ク [®] ハ [®] タ [®] リ [®] ール [®] ロ [®] ビ [®] チ [®] ン酸エステル | ○ | ○ |
| 本採用 | テリルジ-100エリプタ14吸入用 | 14吸入/キット | フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸 | ○ | ○ |
| 院外 | テリルジ-100エリプタ30吸入用 | 30吸入/キット | フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸 | | ○ |
| 本採用 | テリルジ-200エリプタ14吸入用 | 14吸入/キット | フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸 | ○ | ○ |
| 院外 | テリルジ-200エリプタ30吸入用 | 30吸入/キット | フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸 | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | テレミンソフト坐薬2mg | 2mg | ビ [®] サジ [®] ル | (限定) | ○ |
| 本採用 | テレミンソフト坐薬10mg | 10mg | ビ [®] サジ [®] ル | ○ | ○ |
| 特購 | トービ吸入液300mg | 300mg/5mL/管 | ト [®] ブ [®] マイシ [®] ン | (限定) | (限定) |
| 本採用 | トスフロ点眼液0.3% | 5mL/本 | トス [®] フロキサシ [®] ト [®] シ [®] ル酸塩水和物 | ○ | ○ |
| 院外 | トブシムクリーム0.05% | 10g/本 | フル [®] オ [®] ニ [®] ト [®] | | ○ |
| 本採用 | トブシムローション0.05% | 10g/本 | フル [®] オ [®] ニ [®] ト [®] | ○ | ○ |
| 院外 | トブシム軟膏0.05% | 10g/本 | フル [®] オ [®] ニ [®] ト [®] | | ○ |

| ※1採用 区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|-------------|-----------------------|--|------------------------------------|------|------|
| 院外・ 院内特購 | トブラシン点眼液0.3% | 5mL/本 | トブマイシン | (限定) | ○ |
| 院外 | ドボネックス軟膏50μg/g | 10g/本 | カルシポトリオール | | ○ |
| 院外 | ドボベットゲル | 15g/本 | カルシポトリオール水和物・ベタ メタゾンジプロピオン酸エステル | | ○ |
| 院外 | ドボベット軟膏 (15g/本) | カルシポトリオール50.0μg・ベタ メタゾンジプロピオン酸エステル 0.643mg/g 15g/本 | カルシポトリオール水和物・ベタメタ ゾンジプロピオン酸エステル | | ○ |
| 院外 | ドボベット軟膏 (30g/本) | カルシポトリオール50.0μg・ベタ メタゾンジプロピオン酸エステル 0.643mg/g 30g/本 | カルシポトリオール水和物・ベタメタ ゾンジプロピオン酸エステル | | ○ |
| 院外 | トラバタンズ点眼液0.004% | 2.5mL/本 | トラホプロロスト | | ○ |
| 院外 | トルソプト点眼液1% | 5mL/本 | トルソラミト塩酸塩 | | ○ |
| 本採用 | トルリシティブ下注0.75mgアテオス | 0.75mg/0.5mL/キット | テュラグルトド | ○ | ○ |
| 本採用 | トレシーバ注 フレックスタッチ | 300単位/筒 | インスリン デカグルテク (遺伝子組 換え) | ○ | ○ |
| 特購 | トレシーバ注 ペンフィル | 300単位/筒 | インスリン デカグルテク (遺伝子組 換え) | (限定) | (限定) |
| 本採用 | ドレニゾンテープ4μg/cm2 | 7.5cm×10cm | フルドコキシコルチド | ○ | ○ |
| 本採用 | トロンピン液モチダソフトボトル1万 | 10000単位 | トロンピン | ○ | ○ |
| 本採用 | ナウゼリン坐剤10 | 10mg | ドンパロリドン | ○ | ○ |
| 本採用 | ナウゼリン坐剤30 | 30mg | ドンパロリドン | ○ | ○ |
| 本採用 | ナウゼリン坐剤60 | 60mg | ドンパロリドン | ○ | ○ |
| 院外 | ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧 | 50μg/噴霧 | メタゾンフランカルボン酸エステル水和 | | ○ |
| 本採用 | ナノバスニードルⅡ | 34G×4mm | - | ○ | ○ |
| 院外 | ナパゲルンローション3% | 50mL/本 | フェルビナク | | ○ |
| 院外 | ナパゲルン軟膏3% | 25g/本 | フェルビナク | | ○ |
| 院外 | ニコチネルTTS10 | (17.5mg)10cm2 /1枚 | ニコチン | | ○ |
| 院外 | ニコチネルTTS20 | (35mg)20cm2 /1枚 | ニコチン | | ○ |
| 院外 | ニコチネルTTS30 | (52.5mg)30cm2 /1枚 | ニコチン | | ○ |
| 院外 | ニゾールクリーム2% | 10g/本 | ケトナゾール | | ○ |
| 院外 | ニゾールローション2% | 10g/本 | ケトナゾール | | ○ |
| 本採用 | ニトログラムTTS25mg | 25mg/枚 | ニトグリセリン | ○ | ○ |
| 院外 | ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」 | 5mL/本 | ニブラジロール | | ○ |
| 院外 | ニュープロパッチ2.25mg | 2.25mg/枚 | ニチダチン | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ニュープロパッチ4.5mg | 4.5mg/枚 | ニチダチン | (限定) | ○ |
| 本採用 | ニュープロパッチ9mg | 9mg/枚 | ニチダチン | ○ | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ニュープロパッチ13.5mg | 13.5mg/枚 | ニチダチン | (限定) | ○ |
| 本採用 | ニュープロパッチ18mg | 18mg/枚 | ニチダチン | ○ | ○ |
| 院外 | ネオキシテープ73.5mg | 73.5mg/枚 | ナジブチン塩酸塩 | | ○ |
| 本採用 | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | 10mL/本 | フェニレリン塩酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | ネオステリングリーナうがい液0.2% | 340mL/瓶 | ベンゼトニウム塩化物液 | ○ | ○ |
| 本採用 | ネオメドロールE E軟膏 | 3g/本 | フラジマイン硫酸塩・メチルプロ ピオン | ○ | ○ |
| 本採用 | ネグミンシュガー軟膏 | 100g/瓶 | 精製白糖 ホピトニョド | ○ | ○ |
| 本採用 | ネバナック懸濁性点眼液0.1% | 1mg/mL 5mL/本 | ネフェタク | ○ | ○ |
| 本採用 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 300単位/3mL | インスリン | ○ | ○ |
| 院外 | ノボラピッド30ミックス注ペンフィル | 300単位/3mL | インスリン | | ○ |
| 院外 | ノボラピッド50ミックスフレックスペン | 300単位/本 | インスリン アスパルト | | ○ |
| 院外 | ノボラピッド注インレット | 300単位/3mL | インスリン アスパルト | | ○ |
| 本採用 | ノボラピッド注フレックスタッチ | 300単位/3mL | インスリン アスパルト | ○ | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ノボラピッド注フレックスペン | 300単位/3mL | インスリン アスパルト | (限定) | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ノボラピッド注ペンフィル | 300単位/3mL | インスリン アスパルト | (限定) | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ノボラピッド注100単位/mL | 1000単位/10mL | インスリン アスパルト | (限定) | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ノボリン30 R注フレックスペン | 300単位/3mL | インスリン | (限定) | ○ |
| 本採用 | ノボリンN注フレックスペン | 300単位/3mL | インスリン | ○ | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ノボリンR注フレックスペン | 300単位/3mL | インスリン | (限定) | ○ |

| ※1採用 区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---|------|------|
| 本採用 | ノボリンR注 100単位/mL | 1000単位/10mL | インスリン | ○ | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ノルスパンテープ10mg | 10mg/枚 | ブプロピルフィン | (限定) | ○ |
| 院外 | ノルスパンテープ20mg | 20mg/枚 | ブプロピルフィン | | ○ |
| 院外 | ノルスパンテープ5mg | 5mg/枚 | ブプロピルフィン | | ○ |
| 院外 | バイエッタ皮下注10μgペン300 | 300単位/筒 | イクセチド [®] | | ○ |
| 院外 | バイエッタ皮下注5μgペン300 | 300単位/筒 | イクセチド [®] | | ○ |
| 院外 | ハイバジールコーワ点眼液0.25% | 5mL/本 | コブラジール | | ○ |
| 本採用 | ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 | 2% 500mL | チオ硫酸ナトリウム・エタノール | ○ | ○ |
| 院外 | 白色ワセリン | 100g/本 | 白色ワセリン | | ○ |
| 院外 | バクスマー点鼻粉末剤3mg | 3mg/瓶 | ゲルコゴン | | ○ |
| 本採用 | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 3g/本 | Δ ⁺ ロシカルシウム | ○ | ○ |
| 院外 | パタノール点眼液0.1% | 5mL/本 | オパタジン塩酸塩 | | ○ |
| 院外 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 | 2g/包 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・ 炭酸水素ナトリウム | | ○ |
| 院内 | ハッカ油「ヨシダ」 | 20mL/本 | ハッカ油 | ○ | |
| 院外 | パピロックミニ点眼液0.1% | 0.4mL/本 | シクロステリン | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | パルミコート200タービュヘイラー112吸入 | 200μg/1回噴霧 | ブデソニド [®] | (限定) | ○ |
| 本採用 | パルミコート吸入液0.25mg | 0.25mg/2mL/A | ブデソニド [®] | ○ | ○ |
| 院外・ 院内特購 | パルミコート吸入液0.5mg | 0.5mg/A | ブデソニド [®] | (限定) | ○ |
| 院外 | ハルロピテープ8mg | 8mg/枚 | 0 ⁺ ニール塩酸塩 | | ○ |
| 院外 | ハルロピテープ16mg | 16mg/枚 | 0 ⁺ ニール塩酸塩 | | ○ |
| 院外 | ハルロピテープ24mg | 24mg/枚 | 0 ⁺ ニール塩酸塩 | | ○ |
| 院外 | ハルロピテープ32mg | 32mg/枚 | 0 ⁺ ニール塩酸塩 | | ○ |
| 特購 | バンコマイシン眼軟膏1% | 5g/本 | バンコマイシン | (限定) | (限定) |
| 院外 | パンドルクリーム0.1% | 5g/本 | 酪酸 ⁺ 0 ⁺ オン酸ヒド ⁺ ロルチゾン | | ○ |
| 本採用 | ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 | 5mL/本 | ヒアルロン酸ナトリウム | ○ | 【般】 |
| 院内 | ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」 | 0.6mL/筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 | | |
| 院外 | ヒアレイン点眼液0.1% | 5mL/本 | ヒアルロン酸ナトリウム | | ○ |
| 院外 | ヒアレイン点眼液0.3% | 3mg/mL 5mL/本 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | | ○ |
| 本採用 | ヒアレインミニ点眼液0.3% | 0.4mL/本 | ヒアルロン酸ナトリウム | ○ | ○ |
| 本採用 | PA・ヨード点眼・洗眼液 | 0.2%/1mL | ポリビニルアルコールヨウ素液 | ○ | ○ |
| 本採用 | ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%（希釈液付） | 20mL/B | チシゲルチオ | ○ | ○ |
| 院内 | ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% | 0.6mL/本 | ヒアルロン酸ナトリウム | | |
| 院内 | ビオンラビング消毒液0.2W/V% | 300mL/本 | ベンザルコニウム塩化物 | | |
| 本採用 | ビクトーザ皮下注18mg | 18.0mg/筒 | リラゲルチド [®] | ○ | ○ |
| 本採用 | ビソノテープ4mg | 4mg/枚 | ビソノール | ○ | ○ |
| 院外 | ビソルボン吸入液0.2% | 2mg/mL | ブ ⁺ ム ⁺ キシリン塩酸塩 | | ○ |
| 院外 | ビデュリオン皮下注用2mgペン | 2mg/キット | イクセチド [®] | | ○ |
| 院内 | ヒビスクラブ消毒液4% | 4% 500mL | カルキジジ ⁺ グ ⁺ ル ⁺ ン ⁺ 酸 ⁺ 塩 ⁺ | | |
| 本採用 | 5%ヒビテン液 | 500mL/本 | カルキジジ ⁺ グ ⁺ ル ⁺ ン ⁺ 酸 ⁺ 塩 ⁺ | ○ | ○ |
| 院外 | ビバスピエアロスフィア28吸入 | 28吸入/1キット | グリコピロニウム臭化物・ホルモ テロールフル酸塩水和物吸 | | ○ |
| 院外 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」 | 5mL/本 | ピマリシン | | ○ |
| 院外 | ヒューマリン3/7注カート | 300単位/3mL | インスリン | | ○ |
| 院外 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | 300単位/3mL | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | | ○ |
| 本採用 | ヒューマリンN注100単位/mL | 1000単位/10mL | インスリン | ○ | ○ |
| 院外 | ヒューマリンN注カート | 300単位/3mL | インスリン | | ○ |
| 院外 | ヒューマリンN注ミリオペン | 300単位/3mL | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | | ○ |
| 本採用 | ヒューマリンR注ミリオペン | 300単位/3mL | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | ○ | ○ |
| 院外 | ヒューマリンR注カート | 300単位/3mL | インスリン | | ○ |
| 本採用 | ヒューマリンR注100単位/mL | 1000単位/10mL | インスリン | ○ | ○ |
| 院外 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 300単位/KT | インスリン ⁺ 0 ⁺ 混合製剤-25 | | ○ |
| 院外 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 300単位/KT | インスリン ⁺ 0 ⁺ 混合製剤-50 | | ○ |
| 院外 | ヒューマログ注カート | 300単位/筒 | インスリン ⁺ 0 ⁺ (遺伝子組み換 | | ○ |

| ※1採用 区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|-------------|-----------------------------------|---|--|------|------|
| 院外・ 院内特購 | ヒューマログ注100単位/mL | 1000単位/10mL | インスリン | (限定) | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ヒューマログ注ミリオペン | 300単位/3mL | インスリンスパン [®] (遺伝子組み換え) | (限定) | ○ |
| 院外 | ヒューマログ注ミリオペンHD | 300単位/1キット | インスリンスパン [®] (遺伝子組み換え) | | ○ |
| 本採用 | ヒルドイドクリーム0.3% | 25g/本 | ハ [®] リン類似物質 | ○ | ○ |
| 院外 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 25g/本 | ハ [®] リン類似物質 | | ○ |
| 本採用 | ヒルドイドローション0.3% | 25g/本 | ハ [®] リン類似物質 | ○ | ○ |
| 院外 | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | 56吸入/1キット | ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフルマル酸塩水和物吸入剤 | | ○ |
| 院外 | 5-FU軟膏5%協和 | 5g/本 | フルオウラシル | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | フィアスブ注 100単位/mL | 1000単位/10mL | インスリン アスパルト (遺伝子組み換え) | (限定) | ○ |
| 本採用 | フィアスブ注 フレックスタッチ | 300単位/KT | インスリン アスパルト (遺伝子組み換え) | ○ | ○ |
| 院外 | フィアスブ注 ペンフィル | 300単位/本 | インスリン アスパルト (遺伝子組み換え) | | ○ |
| 本採用 | フィブラストスプレー500 | 1個 | トラフェルミン (遺伝子組換え) | ○ | ○ |
| 本採用 | フェノール・亜鉛華リニメント | 500g/瓶 | フェノール 亜鉛華リニメント | ○ | ○ |
| 院外 | フェルビナクパップ70mg「ユートク」 | 70mg/枚 7枚/包 | フェルビナク | | ○ |
| 本採用 | フェントステープ0.5mg | 0.5mg/枚 | フェンタニル塩酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | フェントステープ1mg | 1mg/枚 | フェンタニル塩酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | フェントステープ2mg | 2mg/枚 | フェンタニル塩酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | フェントステープ4mg | 4mg/枚 | フェンタニル塩酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | フェントステープ6mg | 6mg/枚 | フェンタニル塩酸塩 | | ○ |
| 院外 | フェントステープ8mg | 8mg/枚 | フェンタニル塩酸塩 | | ○ |
| 本採用 | 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 | 500mL/本 | 複方ヨード・グリセリン | ○ | ○ |
| 本採用 | フラジール錠250mg | 250mg | メロニダゾール | ○ | ○ |
| 本採用 | プラスチックバックU 100 | 30G×1cc | - | ○ | ○ |
| 本採用 | フラビタン眼軟膏0.1% | 5g/本 | フラビンアデニンジメチルクロトニウム | ○ | ○ |
| 院外 | フラビタン点眼液0.05% | 5mL/本 | フラビンアデニンジメチルクロトニウム | | ○ |
| 本採用 | フランドルテープ40mg | 40mg | 硝酸イソルビド [®] | ○ | ○ |
| 本採用 | プリベシー液0.02% | 500mL/本 | ベンザルコニウム塩化物 | ○ | ○ |
| 本採用 | プリベシー液0.05% | 500mL/本 | ベンザルコニウム塩化物 | ○ | ○ |
| 院外 | プリビナ液0.05% | 500mL/本 | ナファゾリン硝酸塩 | | ○ |
| 院外 | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | 50μg/1回噴霧 | フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル | | ○ |
| 院外 | フルタイド100μgエアゾール60吸入用 | 100μg/1回噴霧 | フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル | | ○ |
| 本採用 | フルタイド100ディスカス | 100μg/1回噴霧 | フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル | ○ | ○ |
| 院外 | フルタイド200ディスカス | 200μg/1回噴霧 | フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル | | ○ |
| 院外 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」28噴霧用 | 50μg/1回噴霧 | フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル | | ○ |
| 院外 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | 1噴霧中:フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル125μg・ホルモテロールフルマル酸塩水和物5μg | フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物 | | ○ |
| 本採用 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 1噴霧中:フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル125μg・ホルモテロールフルマル酸塩水和物5μg | フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物 | ○ | ○ |
| 院外 | フルティフォーム50エアゾール56吸入用 | 1噴霧中:フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル50μg・ホルモテロールフルマル酸塩水和物5μg | フルチカゾン [®] 0 [®] 酢酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物 | | ○ |
| 院外 | フルメタクリーム | 5g/本 | メタゾランフランカルボン酸エステル | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | フルメタ軟膏 | 5g/本 | メタゾランフランカルボン酸エステル | (限定) | ○ |
| 本採用 | フルメトロン点眼液0.02% | 5mL/本 | フルロメトロン | ○ | ○ |
| 本採用 | フルメトロン点眼液0.1% | 5mL/本 | フルロメトロン | ○ | ○ |
| 院内 | プレグランディン膣坐剤1mg | 1mg | ゲメ [®] ロスト | ○ | |
| 院外・ 院内特購 | プレドニン眼軟膏 | 5g/本 | プレドニゾロン酢酸エステル | (限定) | ○ |
| 特購 | プレドネマ注腸20mg | 20mg/個 | プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤 | (限定) | (限定) |
| 本採用 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | - | フルロセインナトリウム | ○ | ○ |
| 本採用 | プロクトセディル軟膏 | 2g/本 | 外用痔疾患用薬 | ○ | ○ |
| 院外 | プロジン外用液5% | 30mL/本 | カル [®] コニウム塩化物水和物 | | ○ |

| ※1採用 区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|-------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|------|
| 本採用 | プロスタンディン軟膏0.003% | 10g/本 | プロスタノール | ○ | ○ |
| 院外 | プロトピック軟膏0.03%小児用 | 5g/本 | タクロイム水和物 | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | プロトピック軟膏0.1% | 5g/本 | タクロイム水和物 | (限定) | ○ |
| 院外・ 院内特購 | プロナック点眼液0.1% | 5mL/本 | プロメチナクナトリウム水和物 | (限定) | ○ |
| 本採用 | プロベト | 100g/本 | 白色ワリン | ○ | ○ |
| 本採用 | プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ | 2mg/mL 45mL/本 | プロムヘキシン塩酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | プロメライン軟膏5万単位/g | 20g/本 | プロメライン | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ベガモックス点眼液0.5% | 5mL/本 | ベキノキサシン塩酸塩 | (限定) | ○ |
| 本採用 | ベストロン耳鼻科用1% | 5mL/本 | セフメキシム塩酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | ベストロン点眼用0.5% | 5mL/本 | セフメキシム塩酸塩 | ○ | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ベセルナクリーム5% | 12.5mg/包 | ベキト | (限定) | ○ |
| 院外 | ベトプティック点眼液0.5% | 5mL/本 | ベタメゾール塩酸塩 | | ○ |
| 本採用 | ベネトリン吸入液0.5% | 5mg/mL | サルブタモール硫酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | ベノキシル点眼液0.4% | 5mL/本 | ベキソプロピオン塩酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 「PP」 | 100g/本 | ヘパリン類似物質噴霧剤 | | ○ |
| 院外 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日 医工」 | 100g/本 | ヘパリン類似物質噴霧剤 | | ○ |
| 本採用 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニブ ロ」 | 25g/本 | ヘパリン類似物質軟膏 | ○ | ○ |
| 院外 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医 | 50g/本 | ヘパリン類似物質液 | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ベピオゲル2.5% | 25mg/g 15g/本 | 過酸化ベンゾイル | (限定) | ○ |
| 本採用 | ヘモポリゾン軟膏 | 2g/本 | 大腸菌死菌浮遊液・ヒトコルチ ゾン | ○ | ○ |
| 院内 | ベリプラスト Pコンビセット組織接着用 | 1mL/本 | 生体組織接着剤 | | |
| 院内 | ベリプラスト Pコンビセット組織接着用 | 3mL/本 | 生体組織接着剤 | | |
| 院外 | ペンタサ坐剤1g | 1g/個 | メサジン | | ○ |
| 院外 | ペンタサ注腸1g | 1g/100mL/本 | メサジン | | ○ |
| 本採用 | ペンニードルプラス | 32G×4mm | - | ○ | ○ |
| 本採用 | ホーリンV錠腫用錠1mg | 1mg | エストロール | ○ | ○ |
| 院外 | ホクナリンテープ0.5mg | 0.5mg/枚 | プロプレノール | | ○ |
| 院外 | ホクナリンテープ1mg | 1mg/枚 | プロプレノール | | ○ |
| 院外 | ホクナリンテープ2mg | 2mg/枚 | プロプレノール | | ○ |
| 本採用 | ボスミン外用液0.1% | 1mg/mL | エピネリン | ○ | ○ |
| 本採用 | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 | 30mL/本 | ポビドンヨード | ○ | 【般】 |
| 本採用 | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 | 50mL/本 | ポビドンヨード | ○ | ○ |
| 本採用 | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 | 250mL/本 | ポビドンヨード | ○ | ○ |
| 本採用 | ポビドンヨードゲル10%「明治」 | 4g/個 | ポビドンヨード | ○ | ○ |
| 本採用 | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 | 500mL/本 | ポビドンヨード | ○ | ○ |
| 本採用 | ボラザG坐剤 | 1個 | トリメジノリトカイン | ○ | ○ |
| 院外 | ボルタレンサボ12.5mg | 12.5mg | ジクロフェナクナトリウム | | ○ |
| 院外 | ボルタレンサボ25mg | 25mg | ジクロフェナクナトリウム | | ○ |
| 院外 | ボルタレンサボ50mg | 50mg | ジクロフェナクナトリウム | | ○ |
| 院外 | ボルタレンテープ15mg | 7枚/包 | ジクロフェナクナトリウム | | ○ |
| 本採用 | マイクロファインプラス | 32G×4mm | - | ○ | ○ |
| 院外 | マイクロファインプラス | 31G×8mm | - | | ○ |
| 院外 | マイザークリーム0.05% | 5g/本 | ジフルプレトナート | | ○ |
| 院外 | マイザー軟膏0.05% | 5g/本 | ジフルプレトナート | | ○ |
| 院外 | マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」 | 25μg/g 10g/本 | マキサカルシトール | | ○ |
| 院内 | マクロゴール400 | 500mL/本 | 酸化エチレンと水との縮重合体 | ○ | ○ |
| 院外 | マーデュオックス軟膏 | 10g/本 | マキサカルシトール・ヘタメチン酪酸エス テルプロピオン酸エステル | | ○ |
| 本採用 | ミオコールスプレー0.3mg | 0.3mg/本1回噴霧 | ニトグリセリン | ○ | ○ |
| 本採用 | ミケラン L A点眼液2% | 2.5mL/本 | カルテオール塩酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | ミケルナ配合点眼液 | 2.5mL | カルテオール塩酸塩・タクロイム | | ○ |
| 本採用 | ミドリンM点眼液0.4% | 5mL/本 | トピカミド | ○ | ○ |
| 院外 | ミドリンP点眼液 | 5mL/本 | トピカミド・フェニレリン塩酸塩 | | ○ |
| 本採用 | ミドレフリンP点眼液 | 5mL/本 | トピカミド・フェニレリン塩酸塩 | ○ | ○ |

| ※1採用 区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|-------------|------------------------|--|---|------|------|
| 院外・ 院内特購 | ミリステープ5mg | 5mg/枚 | ニコチンリセリン | (限定) | ○ |
| 院外 | ミルタックスパップ30mg | 7枚/包 | ケトプロフェン | | ○ |
| 院内 | ミレーナ52mg | 52mg/個 | レボノルゲストレル | ○ | |
| 本採用 | ムコスタ点眼液U D 2% | 20mg/mL 0.35mL/本 | レバミピト | ○ | ○ |
| 本採用 | ムコファイリン吸入液20% | 2mL/包 | アセチルシステインナトリウム塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | 無水エタノール | 500mL/本 | エタノール | ○ | ○ |
| 院外 | メサデルムローション0.1% | 1mg/g | デキサメタゾン [®] 0.1% 酢酸エステル | | ○ |
| 院外 | メサデルム軟膏0.1% | - | デキサメタゾン [®] 0.1% 酢酸エステル | | ○ |
| 本採用 | 滅菌精製水 | 500mL/本 | 精製水 | ○ | ○ |
| 院外 | メノエイドコンビパッチ | エストラジオール0.62mg・酢酸 ノルエチステロン2.70mg | エストラジオール・酢酸ノルエチステロン | | ○ |
| 本採用 | メプチンエア-10μg吸入100回 | 10μg/1回噴霧 | プロピフェロール塩酸塩水和物 | ○ | ○ |
| 院外 | メプチンキッドエア-5μg吸入100回 | 5μg/1回噴霧 | プロピフェロール塩酸塩水和物 | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | メプチンシングヘラー-10μg吸入100回 | 10μg/1回噴霧 | プロピフェロール塩酸塩水和物 | (限定) | ○ |
| 本採用 | メプチン吸入液ユニット0.3mL | 30μg/0.3mL/A | プロピフェロール塩酸塩水和物 | ○ | ○ |
| 院外 | モーラステープ20mg | 7枚/包 | ケトプロフェン | | ○ |
| 院外 | モーラステープL 40mg | 7枚/包 | ケトプロフェン | | ○ |
| 院外 | モーラスパップ30mg | 7枚/包 | ケトプロフェン | | ○ |
| 本採用 | モーラスパップXR120mg | 7枚/包 | ケトプロフェン | ○ | ○ |
| 院外 | モーラスパップXR240mg | 7枚/包 | ケトプロフェン | | ○ |
| 院外 | ユーバスタコーワ軟膏 | 100g/瓶 | 精製白糖 ホピトニョト | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ユベラ軟膏 | 56g/本 | トコフェロール・ビタミンA油 | (限定) | ○ |
| 本採用 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | インスリンデグ [®] 210単位 /3mL インスリンアスパルト90単位 | インスリンデグ [®] インスリンアスパルト | ○ | ○ |
| 本採用 | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」 | 50μg/mL 2.5mL/本 | ラタノプロスト | ○ | 【般】 |
| 特購 | ラパリムスゲル0.2% | 2mg/g 10g/本 | シロリムスゲル | (限定) | (限定) |
| 院外 | ラミシールクリーム1% | 10g/本 | アミドナフリン塩酸塩 | | ○ |
| 本採用 | ランタスXR注ソロスター | 450単位/1.5mL/キット | インスリングルキニン | ○ | ○ |
| 院外 | ランタス注ソロスター | 300単位/3mL/キット | インスリングルキニン | | ○ |
| 院外 | リキスマア皮下注300μg | 300μg/mL/キット | リキセチド | | ○ |
| 院外 | リザベン点眼液0.5% | 5mL/本 | トランラスト | | ○ |
| 院外 | リズモン T G点眼液0.5% | 2.5mL/本 | アゼロルマレイン酸塩 | | ○ |
| 特購 | リテインバ耳科用250μgセット | 250μg/セット | トコフェリン(遺伝子組換え) | (限定) | |
| 本採用 | リドカインテープ18mg「NP」 | (18mg)30.5mm× 50.0mm1枚 | リドカイン貼付剤 | ○ | ○ |
| 院外 | リドメックスコーワクリーム0.3% | 3mg/g 5g/本 | プロト [®] ニゾ [®] の吉草酸エステル酢酸 エステル | | ○ |
| 院外 | リドメックスコーワローション0.3% | 3mg/g 10g/本 | プロト [®] ニゾ [®] の吉草酸エステル酢酸 エステル | | ○ |
| 院外 | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 3mg/g 5g/本 | プロト [®] ニゾ [®] の吉草酸エステル酢酸 エステル | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | リバスタッチパッチ4.5mg | 4.5mg/枚 | リバスタッチ | (限定) | ○ |
| 院外 | リバスタッチパッチ9mg | 9mg/枚 | リバスタッチ | | ○ |
| 院外 | リバスタッチパッチ13.5mg | 13.5mg/枚 | リバスタッチ | | ○ |
| 院外 | リバスタッチパッチ18mg | 18mg/枚 | リバスタッチ | | ○ |
| 本採用 | リボスチン点眼液0.025% | 5mL/本 | レボバクソフィン塩酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 0.025mg | レボバクソフィン塩酸塩 | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | リュウアト1%眼軟膏 | 3.5g/本 | アトロ [®] ン硫酸塩水和物 | (限定) | ○ |
| 院外 | リレンザ | 5mg/ブリスト | ザナミビル水和物 | | ○ |
| 院外 | 点眼・点鼻用リンデロンA液 | 5mL/本 | ヘタメタリンリン酸エステルナトリウム・フ ジオキシム硫酸塩 | | ○ |
| 院外 | リンデロン-D P クリーム | 5g/本 | ヘタメタリンリン酸エステルナトリウム・フ ジオキシム硫酸塩 | | ○ |
| 本採用 | リンデロン-D P 軟膏 | 5g/本 | ヘタメタリンリン酸エステルナトリウム・フ ジオキシム硫酸塩 | ○ | ○ |
| 院外 | リンデロン-V G ローション | 10mL/本 | ヘタメタリン [®] 吉草酸エステル・ゲソタ マイン硫酸塩 | | ○ |
| 本採用 | リンデロン-V G 軟膏0.12% | 5g/本 | ヘタメタリン [®] 吉草酸エステル・ゲソタ マイン硫酸塩 | ○ | ○ |
| 本採用 | リンデロン-V クリーム0.12% | 5g/本 | ヘタメタリン [®] 吉草酸エステル | ○ | ○ |

| ※1採用 区分 | 薬品名 | 規格 | 一般名 | ※2院内 | ※2院外 |
|-------------|---------------------------------|---|---|------|------|
| 本採用 | リンデロン-V軟膏0.12% | 5g/本 | ハタメタゾン吉草酸エステル | ○ | ○ |
| 院外・ 院内特購 | リンデロン坐剤0.5mg | 0.5mg/個 | | (限定) | ○ |
| 院外 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 5mg/5mL/本 | ハタメタゾンリン酸エステルナトリウム | | ○ |
| 院外 | ル・エストロジェル0.06% | 0.06%1g 80g/本 | エストラジオールゲル | | ○ |
| 院外 | ルコナック爪外用液5% | 50mg/1g | ルリコナール | | ○ |
| 院外 | ルミガン点眼液0.03% | 0.3mg/L | ヒマトプロスト | | ○ |
| 院外 | ルムジェブ注カート | 300単位/本 | インスリン リスプロ | | ○ |
| 本採用 | ルムジェブ注ミリオペン | 300単位/本 | インスリン リスプロ | ○ | ○ |
| 院外・ 院内特購 | ルムジェブ注100単位/mL | 100単位/1mL 10mL/ 本 | インスリン リスプロ | (限定) | ○ |
| 本採用 | ルリコンクリーム1% | 10mg/g 10g/本 | ルリコナール | ○ | ○ |
| 院外 | ルリコン液1% | 10mg/mL 10mL/本 | ルリコナール | | ○ |
| 院外・ 院内特購 | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 48mg・30.8g/瓶 | ブデソニド注腸剤 | (限定) | ○ |
| 院外 | レスキュラ点眼液0.12% | 5mL/本 | イプロピロメトロン | | ○ |
| 本採用 | レスタミンコーワクリーム1% | 500g/瓶 | ジフェニトランミン | ○ | ○ |
| 院外・ 院内特購 | レパタン坐剤0.2mg | 0.2mg | ブプロピルフィン塩酸塩 | (限定) | ○ |
| 院外 | レベミル注インレット | 300単位/3mL | インスリン デテミル | | ○ |
| 本採用 | レベミル注フレックスペン | 300単位/3mL | インスリン デテミル | ○ | ○ |
| 特購 | レベミル注 ペンフィル | 300単位/筒 | インスリン デテミル | (限定) | (限定) |
| 本採用 | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 | 15mg/mL 5mL/本 | レボフロキサシン水和物 | ○ | ○ |
| 本採用 | レルベア100エリプタ14吸入用 | 17リスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル100μg | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル | ○ | ○ |
| 院外 | レルベア100エリプタ30吸入用 | 17リスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル100μg | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル | | ○ |
| 本採用 | レルベア200エリプタ14吸入用 | 17リスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル200μg | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル | ○ | ○ |
| 院外 | レルベア200エリプタ30吸入用 | 17リスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル200μg | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル | | ○ |
| 本採用 | ロードーズU100 | 30G×1/2cc | - | ○ | ○ |
| 本採用 | ロードーズU100 | 30G×3/10cc | - | ○ | ○ |
| 本採用 | ロキソニンゲル1% | 10mg/g | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ○ | ○ |
| 院外 | ロキソニンテープ50mg | 50mg/枚 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | | ○ |
| 院外 | ロキソニンテープ100mg | 100mg/枚 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | | ○ |
| 院外 | ロキソニンパップ100mg | 7枚/包 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | | ○ |
| 本採用 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 | 50mg/枚 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ○ | ○ |
| 院外 | ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイ ホウ」 | 7枚/包 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | | ○ |
| 本採用 | ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケ ミア」 | 7枚/包 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ○ | ○ |
| 院外 | ロコアテープ | 40mg/枚 | エスフルビプロフェン・ルッカ油 | | ○ |
| 本採用 | ロコイドクリーム0.1% | 5g/本 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | ○ | ○ |
| 本採用 | ロコイド軟膏0.1% | 5g/本 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | ○ | ○ |
| 特購 | ロゼックスゲル0.75% | 0.75%/g×50g | メトロニダゾールゲル | (限定) | (限定) |
| 本採用 | ワコビタール坐剤30 | 30mg | フェバールビタールナトリウム | ○ | ○ |