

八千代医療センター採用医薬品集（外用・自己注射）

2024年05月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要のため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

【般】：一般名マスタの処方が可能なもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：248品目 院外採用：310品目（特別購入薬：60目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	アイオピジンU D点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	アプロキニジン塩酸塩	○	
院内	アイノフロー吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ガス		
本採用	アイファガン点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	アリモニジン酒石酸塩	○	○
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液		プリモニジン・プリンゾラミド		○
本採用	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	50g/瓶	酸化亜鉛	○	○
院外	亜鉛華軟膏「ヨシダ」		酸化亜鉛		○
院外	アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	ナジフロキサシ		○
本採用	アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	ナジフロキサシ	○	○
本採用	アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ブクテジシナトリウム	○	○
院外・院内特購	アジマイシン点眼液1%	1%1mL 2.5mL/本	アジスロマイシン水和物	(限定)	○
院外	アスタット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ラノナール		○
院外	アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ジメチルイソプロピルアズレン	○	○
本採用	アスプールの液(0.5%)	5mg/mL 50mL/本	dI-イソプロピリン塩酸塩	○	○
院外	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸	200μg/吸入	エモタゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アセサイド6%消毒液OEM-2	第一剤:750mL 第二剤:750mL	過酢酸		
本採用	アセサイド6%消毒液OEM-3	第一剤:875mL 第二剤:875mL	過酢酸		
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	アリゾラミド・フェロルマリン酸塩		○
院外	アテキュラ吸入用カプセル低用量	1カプセル中：インタカテロール酢酸塩173μg（インタカテロールとして150μg）・エモタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	インタカテロール酢酸塩・エモタゾンフランカルボン酸エステルカプセル		○
院外	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル中：インタカテロール酢酸塩173μg（インタカテロールとして150μg）・エモタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	インタカテロール酢酸塩・エモタゾンフランカルボン酸エステルカプセル		○
院外	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル中：インタカテロール酢酸塩173μg（インタカテロールとして150μg）・エモタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	インタカテロール酢酸塩・エモタゾンフランカルボン酸エステルカプセル		○
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/50μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
院外・院内特購	アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/125μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	(限定)	○
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/250μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
本採用	アドエア100ディスクス28吸入用	1ディスクス中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル72.5μg(サルメテロールとして50μg)/100μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	スマートリフタ		○
院外	インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」	100単位/1mL 10mL/V	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
院外	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	300単位/筒	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
院外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位/キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
特購	インスリン グルギンBS注カート「リリー」	300単位/筒	インスリン グルギン	(限定)	(限定)
本採用	インスリン グルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/キット	インスリン グルギン	○	○
院外	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	100単位/1mL、10mL/瓶	インスリン リスプロ		○
本採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位/3mL/キット	インスリン リスプロ	○	○
院外	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位/筒	インスリン リスプロ		○
本採用	インター吸入液1%	20mg/2mL/A	カモグリク酸ナトリウム	○	○
院外	インテパンクリーム1%	1%/1g	インドメタシン		○
院外	インテパン坐剤25	25mg	インドメタシン		○
本採用	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	クロルヘキシジングルコン酸塩		
院内	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジングルコン酸塩		
院外	ウルティプロ吸入用カプセル	1Cp中:グリヒピロニウム50μg・インタカテロール110μg	グリヒピロニウム臭化物・インタカテロールレイン酸塩		○
院外	ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○
本採用	ウレパールローション10%	100mg/g 20g/本	尿素	○	○
本採用	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3%	90g/3000mL/B	D-ソルビトール	○	○
本採用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ブリンゾラミド	○	○
本採用	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2g/包	アズレスリン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○	【般】
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/混合死菌浮遊液	オミデネバグ イソプロピル液		○
本採用	エキザルベ	0.166mL(大腸菌死菌:約1.5億個・ブドウ球菌死菌:約1.5億個・レンサ球菌死菌:約0.15億個・緑膿菌死菌:約0.15億個を含む)・ヒドロコルチゾン	混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン	○	○
本採用	エクラープラスター20μg/cm ²	7.5cm×10cm	デブロンプロピオン酸エステル	○	○
院外	エクリラ400μg ジェムエア60吸入用	400μg/回	アクリゾニウム臭化物		○
特購	エコリシン眼軟膏	3.5g/本	イリスロマイシンナクトヒン酸塩・リスフランメタンスルホン酸ナトリウム軟膏	(限定)	(限定)
本採用	エスケレ坐剤「250」	250mg	抱水クローラル	○	○
院外	エスケレ坐剤「500」	500mg	抱水クローラル		○
本採用	エスケレ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水クローラル	○	○
院外	エストラーナテープ0.18mg	0.18mg/枚	エストラジオール		○
院外	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚	エストラジオール		○
院外	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジオール		○
本採用	S P トローチ0.25mg「明治」	0.25mg	テカリニウム塩化物	○	○
本採用	エタノール	500mL(15°Cで95.1~96.9vol%を含む)	エタノール	○	○
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル中;インタカテロールレイン酸塩173μg(インタカテロールとして150μg)・グリヒピロニウム臭化物63μg(グリヒピロニウムとして50μg)・モメタゾンフランカルボン酸エステル80μg	インタカテロールレイン酸塩・グリヒピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル中;インタカテロールレイン酸塩173μg(インタカテロールとして150μg)・グリヒピロニウム臭化物63μg(グリヒピロニウムとして50μg)・モメタゾンフランカルボン酸エステル80μg	インタカテロールレイン酸塩・グリヒピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	エヌジェン皮下注24mgペン	24mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)		○
院外	エヌジェン皮下注60mgペン	60mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)		○
院外	エピデュオゲル	15g/本	アタロリン・過酸化ベンゾイルゲル		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	M S 温シブ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウカ ^{ラシ} エキス	○	○
本採用	M S 冷シブ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・l-メントール	○	○
本採用	エムラクリーム	リド ^カ イン25mg・フ ^ロ ピ ^ト カイン 25mg/g 5g/本	リド ^カ イン・フ ^ロ ピ ^ト カイン	○	○
院外	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾン ^ハ °シル酸エステル		○
院外	エンクラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○
院外	エンペシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	ケトリマゾール		○
院外	オイラックスHクリーム	ケタミト ^ン 100mg・ヒト ^コ ル ^チ ゾ ^ン 2.5mg/g 5g/本	ケタミト ^ン ・ヒト ^コ ル ^チ ゾ ^ン		○
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	ケタミト ^ン	○	○
院外	オーキ西斯9μg タービュヘイラー60吸入	9μg/吸入	ホルモロ ^ル マル酸塩水和物		○
院外	オキサロールローション25μg / g	25μg/g 10g/本	マキサルチール		○
院外	オキサロール軟膏25μg / g	25μg/g 10g/本	マキサルチール		【般】
本採用	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩錠	○	【般】
院内	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○	
本採用	オスバン消毒剤10%	500mL/本	ベンザ ^ル ルコニウム塩化物	○	○
本採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg/本	セマ ^グ ル ^ト (遺伝子組み換え) キ ^ト	○	○
院内	オペガードM A 眼灌流液	ブ ^ド ウ糖1.5mg・塩化ナ ^リ ウム6.6mg・塩化カリウム 0.36mg・塩化カルシウム水和 物0.18mg・硫酸マグネシウム 水和物0.3mg・炭酸水素ナ ^リ ウム2.1mg/ml	ブ ^ド ウ糖・塩化ナ ^リ ウム・塩化カリ ウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マ グネシウム水和物・炭酸水素ナ ^リ ウム		
院内	オペガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナ ^リ ウム		
院内	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ヒアルロン酸ナ ^リ ウム		
院外	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	ト ^ミ フェン臭化物		○
院内	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	オ ^ラ ネジ ^ン グ ^ル コ ^ン 酸		
院外	オラビ錠口腔用50mg	50mg/錠	ミコ ^ナ ゾール		○
本採用	オリブ油「ヨシダ」	25mL/本〔滅菌済〕	オリブ油	○	○
院外	オルセノン軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トルチ ^ニ ン ト ^コ フェ ^リ ル		○
本採用	オルバスコ200μg インヘラー56吸入用	200μg/1噴霧	シ ^ク リ ^ニ ト ^ド	○	○
院外	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg	イン ^ダ カ ^テ ロ ^ル マ ^レ イン酸塩		○
院外	ガチフロ点眼液0.3%	5mL/本	ガ ^チ フロ ^サ シ ^ン 水和物		○
本採用	カデックス軟膏分包45mg	45mg/5g/包	ヨ ^ク 素軟膏	○	○
院外	カラムンローション* (丸石)	カ ^ラ ミ ^ン 8g・酸化亜鉛 8g/100mL 500mL/本	カ ^ラ ミ ^ン ・酸化亜鉛		○
本採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参	0.05mg/mL 5mL/本	ピ ^レ ノ ^キ シ ^ン	○	○
院外	キサラタン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	ラ ^タ ノ ^ド ロ ^ス ト		○
本採用	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	リ ^ド カ ^イ ン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	リ ^ド カ ^イ ン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	リ ^ド カ ^イ ン	○	○
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	リ ^ド カ ^イ ン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	リ ^ド カ ^イ ン塩酸塩	○	○
本採用	キューバル100エアゾール	100μg/1噴霧	ハ ^ク メ ^タ ゾ ^ン ° ^ハ ° ^シ ル酸エステル	○	○
院外	強力ポステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒト ^コ ル ^チ ゾ ^ン		○
本採用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ヒト ^コ ル ^チ ゾ ^ン 酢酸エステル・フラジ ^オ マイ ^シ ン硫酸塩・ジ ^フ ェ ^ニ ト ^ラ ミ ^ン 塩	○	○
本採用	キングバート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ケ ^ハ ° ^タ ゾ ^ン 酪酸エステル	○	○
院外	グラアルファ配合点眼液	5mL/本	リ ^パ ス ^ジ ル塩酸塩水和物・プリ モ ^ニ ジ ^ン 酒石酸塩		○
院外・ 院内特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リ ^パ ° ^シ ル塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	クラビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	レ ^ボ フロ ^サ シ ^ン 水和物		○
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 30mL/個	グ ^リ セ ^リ ン	○	○
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 60mL/個	グ ^リ セ ^リ ン	○	【般】
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 120mL/個	グ ^リ セ ^リ ン	○	○
本採用	グリセリン「ケンエー」	25mL/本 (84.0~87.0%を含む)	グ ^リ セ ^リ ン	○	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	グリセリンBC液「ヨシダ」	250mL/瓶 (84.0~87.0%を含む)	0.025%ベンザルコニウム塩化物 添加グリセリン	○	○
本採用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル	○	○
院外・ 院内特購	クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	エフィコナゾール	(限定)	○
本採用	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール	○	【般】
院外	クロマイーP軟膏	クロラムフェニコール20mg・フラジ マイシン硫酸塩5mg・プレドニ ゾロン3mg/g 25g/本	クロラムフェニコール・フラジ マイシン硫酸塩・プレドニ ゾロン		○
院外	クロマイ腔錠100mg	100mg	クロラムフェニコール		○
本採用	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	100mg/錠	クロラムフェニコール	○	○
本採用	ゲーベンクリーム1%	10mg/g	スルファジジン銀	○	○
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール2%クリーム	○	【般】
本採用	ケトチフェン点眼液0.05%「SW」	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェン硫酸塩	○	【般】
本採用	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	○	【般】
本採用	ケラチナミンコーワクリーム20%	200mg/g 25g/本	尿素	○	○
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩		○
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○	【般】
院外・ 院内特購	コソプト配合点眼液	トルゾラミド 10mg・フェドール 5mg/mL 5mL/本	トルゾラミド 塩酸塩・フェドール メリン酸塩	(限定)	○
院外	コソプトミニ配合点眼液	トルゾラミド 10mg・フェドール 5mg/mL 0.4mL/本	トルゾラミド 塩酸塩・フェドール メリン酸塩		○
本採用	コレクチム軟膏0.25%	2.5mg/g 5g/本	デルゴシチン	○	○
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	デルゴシチン		○
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ビタミンA油		○
本採用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V	肺サーファクタント製剤	○	○
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロピリトール塩酸塩	○	○
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェン硫酸塩		○
本採用	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	ケトチフェン硫酸塩	○	○
院内	サニサーウ	250mL/本	イタノール	○	
院内	サニサーウ	60mL/本	イタノール	○	
院外	サラゾピリン坐剤500mg	500mg/個	サラゾスルファピリジン		○
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセ リン900mg/g	サリチル酸ワセリン		○
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配 合剤噴霧剤		○
院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg/カプセル	ベンザルコニウムリン酸エステル		○
本採用	サルタノールインヘラー100μg	100μg/1回噴霧	サルタノール硫酸塩	○	○
院外	サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノコバラミン		○
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩		○
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩	○	○
院外	サンピロ点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩		○
本採用	サンバタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ベンザルコニウムリン酸エステルナトリウム	○	○
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ホルモニド	○	○
本採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバラミン液	○	○
院外	シープリ吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリヒドニウム臭化物		○
本採用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ヒアルロン酸ナトリウム・ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム液	○	○
院外	ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルナトリウム		○
院外	ジクアスLX点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルナトリウム		○
本採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム	○	○
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジクロフェナクナトリウム		○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日 医工」	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医	50mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
特購	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶	ジメチルスルホキシド液	(限定)	(限定)
本採用	シムビコートタービューヘイラー60吸入	ブデソニド 160μg・ホルモ ル硫酸塩水和物4.5μg/ 吸入	ブデソニド・ホルモ ル硫酸塩水和物	○	○
本採用	消毒用イタノール「ケンエー」	500mL/本	イタノール	○	○
院外	ジルドザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ベンザルコニウム		○
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ酸・無機塩類配合剤液		○
本採用	ジンジカインゲル20%	30g/本	アミノ安息香酸エチル液	○	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン2.1mg/1cm ² [9.5cm×4.8cm/枚(レギュラーサイズ)]	生体組織接着剤		
院外	タチオン点眼用2%	100mg/mL 5mL/本	グルチオン		○
院外	タブコム配合点眼液	2.5mL/本	タフル [®] ロスト・チロ [®] ルマリン酸		○
院外	タブロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	タフル [®] ロスト		○
院外	タブロスミニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	タフル [®] ロスト		○
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	チロ [®] チジン	○	○
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	チロ [®] チジン	○	○
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	タロリムス水和物		○
本採用	チモプトルX E点眼液0.5%	2.5mL/A	チロ [®] ルマリン酸塩	○	○
院外	ツムラ紫雲膏	500g×1瓶	紫雲膏		○
本採用	ツロプテロールテープ0.5mg「久光」	0.5mg/枚	ツロプテロール	○	【般】
本採用	ツロプテロールテープ1mg「久光」	1mg/枚	ツロプテロール	○	【般】
本採用	ツロプテロールテープ2mg「久光」	2mg/枚	ツロプテロール	○	【般】
院内	ティスオーパ消毒液0.55%	3.8L/本	フタル		
院外	ティビゲル1mg	1mg	イストラジオール		○
院外・院内特購	ティフェリングル0.1%	15g/本	アダパレン	(限定)	○
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	デキサメタゾン	○	【般】
本採用	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリ	2.5μg/1回噴霧	デスモプレシン酢酸塩水和物	○	○
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ブナジシン塩酸塩		○
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エピジヒドロコlestリン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○
院外	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物10mg・過酸化ベンゾイル30mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○
院外	デュオトラバ配合点眼液	トラホ [®] ロ [®] ロスト40μg・チロ [®] ルマリン酸塩5mg	トラホ [®] ロ [®] ロスト・チロ [®] ルマリン酸塩		○
院外	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg/枚	フェンタニル		○
本採用	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	25g/本	チキシトサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	○	○
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリチルチン酸		○
本採用	デルモゾールgローション	10mL/本	ハ [®] タメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	クハ [®] タゾール [®] ロ [®] ロ [®] チ [®] チ [®] 酸エステル		○
院外・院内特購	デルモベートスカルプローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	クハ [®] タゾール [®] ロ [®] ロ [®] チ [®] チ [®] 酸エステル	(限定)	○
本採用	デルモベート軟膏0.05%	5g/本	クハ [®] タゾール [®] ロ [®] ロ [®] チ [®] チ [®] 酸エステル	○	○
本採用	テリルジ-100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸	○	○
院外	テリルジ-100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸		○
本採用	テリルジ-200エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸	○	○
院外	テリルジ-200エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸		○
院外・院内特購	テレミンソフト坐薬2mg	2mg	ヒ [®] サジブル	(限定)	○
本採用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg	ヒ [®] サジブル	○	○
特購	トービ吸入液300mg	300mg/5mL/管	トブ [®] マイシン	(限定)	(限定)
本採用	トスフロ点眼液0.3%	5mL/本	トスフロキサシトシ酸塩水和物	○	○
院外	トプシムクリーム0.05%	10g/本	フルオ [®] ニト [®]		○
本採用	トプシムローション0.05%	10g/本	フルオ [®] ニト [®]	○	○
院外	トプシム軟膏0.05%	10g/本	フルオ [®] ニト [®]		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブマイシン	(限定)	○
院外	ドボネックス軟膏50μg/g	10g/本	カルシポトリオール		○
院外	ドボベットゲル	15g/本	カルシポトリオール水和物・ベタ メタゾンジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベット軟膏	カルシポトリオール50.0μg・ヘタ メタゾンジプロピオン酸エステル 0.643mg/g 15g/本	カルシポトリオール水和物・ヘタメタゾ ンジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベット軟膏	カルシポトリオール50.0μg・ヘタ メタゾンジプロピオン酸エステル 0.643mg/g 30g/本	カルシポトリオール水和物・ヘタメタゾ ンジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベットフォーム	60g/本	カルシポトリオール水和物・ベタ メタゾンジプロピオン酸エステル		○
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トラホプロロスト		○
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルグラミド塩酸塩		○
本採用	トルリシティ皮下注0.75mg/g アテオス	0.75mg/0.5mL/キット	テュラゲルフト	○	○
本採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位/筒	インスリン デカゲルテク (遺伝子組 換え)	○	○
特購	トレシーバ注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デカゲルテク (遺伝子組 換え)	(限定)	(限定)
本採用	トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	10000単位	トロンピン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	ドンパロリン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	ドンパロリン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤60	60mg	ドンパロリン	○	○
院外	ナゾネックス点鼻液50μg/g 112噴霧用	50μg/噴霧	メタゾンフランカルボン酸エステル水和		○
本採用	ナノバスニードルⅡ	34G×4mm	-	○	○
院外	ナパゲルンローション3%	50mL/本	フェルビナク		○
院外	ナパゲルン軟膏3%	25g/本	フェルビナク		○
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニゾールクリーム2%	10g/本	ケトナゾール		○
院外	ニゾールローション2%	10g/本	ケトナゾール		○
本採用	ニトロダームTTS25mg	25mg/枚	ニトグリセリン	○	○
院外	ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ニブラジロール		○
院外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg/枚	メチルフェニ		○
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚	メチルフェニ	(限定)	○
本採用	ニュープロパッチ9mg	9mg/枚	メチルフェニ	○	○
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg/枚	メチルフェニ	(限定)	○
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ18mg	18mg/枚	メチルフェニ	(限定)	○
院外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚	チンチン塩酸塩		○
本採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	フェニレリン塩酸塩	○	○
本採用	ネオステリングリーナうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○
本採用	ネオメドロールE E軟膏	3g/本	フラジマイシン硫酸塩・メチルプロ ピオン	○	○
本採用	ネグミンシュガー軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホピトニョト	○	○
本採用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ホピフェナク	○	○
院外・ 院内特購	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
院外	ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト		○
本採用	ノボラピッド注 フレックスタッチ	300単位/3mL	インスリン アスパルト	○	○
院外・ 院内特購	ノボラピッド注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○
院外・ 院内特購	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○
本採用	ノボラピッド注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト	○	○
院外・ 院内特購	ノボリン30 R 注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
本採用	ノボリンN注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ノボリンR注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ノボリンR注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ノルスパンテープ10mg	10mg/枚	ブプレリウム	(限定)	○
院外	ノルスパンテープ20mg	20mg/枚	ブプレリウム		○
院外	ノルスパンテープ5mg	5mg/枚	ブプレリウム		○
院外	バイエッタ皮下注10μgペン300	300単位/筒	イキサチド		○
院外	バイエッタ皮下注5μgペン300	300単位/筒	イキサチド		○
院外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	コブラジール		○
本採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	チオ硫酸ナトリウム・イタノール	○	○
院外	白色ワセリン	100g/本	白色ワセリン		○
院外	バクスマー一点鼻粉末剤3mg	3mg/瓶	ゲルコロン		○
本採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	Δ ⁺ ロシカルシウム	○	○
院外	パタノール点眼液0.1%	5mL/本	和パタジウム塩酸塩		○
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・ 炭酸水素ナトリウム		○
院内	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/本	ハッカ油	○	
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	シクロスポリン		○
院外・ 院内特購	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	200μg/1回噴霧	ブデソニド	(限定)	○
本採用	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2mL/A	ブデソニド	○	○
院外・ 院内特購	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg/A	ブデソニド	(限定)	○
院外	ハルロピテープ8mg	8mg/枚	0.1%ニール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ16mg	16mg/枚	0.1%ニール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ24mg	24mg/枚	0.1%ニール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ32mg	32mg/枚	0.1%ニール塩酸塩		○
特購	バンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	バンコマイシン	(限定)	(限定)
院外	パンドルクリーム0.1%	5g/本	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン		○
本採用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	【般】
院内	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」	0.6mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム液		
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		○
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液	20mL/B (希釈液付)	チンクワロン	○	○
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.6mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		
院内	ビオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベンザルコニウム塩化物		
院外・ 院内特購	ビクトーザ皮下注18mg	18.0mg/筒	リガルクト	(限定)	○
本採用	ビソノテープ4mg	4mg/枚	ビソノール	○	○
院外	ビソルボン吸入液0.2%	2mg/mL	ブロムヘキシン塩酸塩		○
院外	ビデュリオン皮下注用2mgペン	2mg/キット	イキサチド		○
院内	ビスクラブ消毒液4%	4% 500mL	グルキジジック [®] ルン酸塩		
本採用	5%ビピテン液	500mL/本	グルキジジック [®] ルン酸塩	○	○
院外	ビベスピエアロスフィア28吸入	28吸入/1キット	グリコピロニウム臭化物・ホルモ テロールフル酸塩水和物吸		○
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ピマリシン		○
院外	ヒューマリン3/7注カート	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ヒューマリン3/7注ミリオベン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
本採用	ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外	ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ヒューマリンN注ミリオベン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
本採用	ヒューマリンR注ミリオベン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	○	○
院外	ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	インスリン		○
本採用	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外	ヒューマログミックス25注ミリオベン	300単位/KT	インスリンリソ [®] 混合製剤-25		○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/KT	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾞ(混合製剤-50)		○
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾞ(遺伝子組み換え)		○
院外・院内特購	ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	ｲﾝｽﾘﾝ	(限定)	○
院外・院内特購	ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾞ(遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/1キット	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾞ(遺伝子組み換え)		○
本採用	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ﾊﾟﾘﾝ類似物質	○	○
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ﾊﾟﾘﾝ類似物質		○
本採用	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ﾊﾟﾘﾝ類似物質	○	○
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/1キット	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ・ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物・ホルモテロールフルマル酸塩水和物吸入剤		○
院外	5-FU軟膏5%協和	5g/本	ﾌﾙｵﾗｼﾞﾙ		○
院外・院内特購	フィアスブ注 100単位/mL	1000単位/10mL	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・院内特購	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位/KT	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外	フィアスブ注 ペンフィル	300単位/本	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組み換え)		○
本採用	フィブラストスプレー500	1個	ﾄﾗﾌﾞﾞﾙﾐﾝ(遺伝子組換え)	○	○
本採用	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	500g/瓶	ﾌﾞﾙｲﾝ 亜鉛華リニメント	○	○
院外	フェルビナクパップ70mg「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	ﾌﾞﾙｲﾝ		○
本採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg/枚	ﾌﾞﾙｲﾝ	○	○
本採用	フェントステープ1mg	1mg/枚	ﾌﾞﾙｲﾝ	○	○
本採用	フェントステープ2mg	2mg/枚	ﾌﾞﾙｲﾝ	○	○
本採用	フェントステープ4mg	4mg/枚	ﾌﾞﾙｲﾝ	○	○
院外	フェントステープ6mg	6mg/枚	ﾌﾞﾙｲﾝ		○
院外	フェントステープ8mg	8mg/枚	ﾌﾞﾙｲﾝ		○
本採用	複方ヨード・グリセリン* (小堺)	500mL/本	複方ヨード・グリセリン	○	○
本採用	フাজィール錠250mg	250mg	ﾌﾞﾙｲﾝ	○	○
本採用	プラスチバックU 100	30G×1cc	-	○	○
本採用	フランドルテープ40mg	40mg	硝酸ｲﾝﾌﾞﾙ	○	○
本採用	ブピベシー液0.02%	500mL/本	ﾊﾞﾝｶﾞﾙｺﾞﾆｳﾑ塩化物	○	○
本採用	ブピベシー液0.05%	500mL/本	ﾊﾞﾝｶﾞﾙｺﾞﾆｳﾑ塩化物	○	○
院外	ブピベシー液0.05%	500mL/本	ﾌﾞﾙｲﾝ		○
院外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	ﾌﾙｶﾘﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)		○
院外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	ﾌﾙｶﾘﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)		○
本採用	フルタイド100ディスカス	100μg/1回噴霧	ﾌﾙｶﾘﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)	○	○
院外	フルタイド200ディスカス	200μg/1回噴霧	ﾌﾙｶﾘﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)		○
本採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	27.5μg/1噴霧	ﾌﾙｶﾘﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)	○	【般】
院外	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」28噴霧用	50μg/1回噴霧	ﾌﾙｶﾘﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)		○
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾン(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)50μg・ホルモテロールフルマル酸塩水和物5μg	ﾌﾙｶﾘﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)・ホルモテロールフルマル酸塩水和物		○
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾン(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)125μg・ホルモテロールフルマル酸塩水和物5μg	ﾌﾙｶﾘﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)・ホルモテロールフルマル酸塩水和物		○
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:フルチカゾン(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)125μg・ホルモテロールフルマル酸塩水和物5μg	ﾌﾙｶﾘﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)・ホルモテロールフルマル酸塩水和物	○	○
院外	フルメタクリーム	5g/本	ﾓﾓｸﾞﾗﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)		○
院外・院内特購	フルメタ軟膏	5g/本	ﾓﾓｸﾞﾗﾝﾌﾞ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)	(限定)	○
本採用	フルメトロン点眼液0.02%	5mL/本	ﾌﾙﾓﾄﾞﾝ	○	○
本採用	フルメトロン点眼液0.1%	5mL/本	ﾌﾙﾓﾄﾞﾝ	○	○
院内	プレグランディン膣坐剤1mg	1mg	ﾌﾞﾙｲﾝ	○	
院外・院内特購	プレドニン眼軟膏	5g/本	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)	(限定)	○
特購	プレドネマ注腸20mg	20mg/個	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ(β ₂ -ｵﾝ酸エステル)ナトリウム注腸剤	(限定)	(限定)
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	-	ﾌﾙﾓﾄﾞﾝ	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	プロクトセディル軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	カル [®] ロウム塩化物水和物		○
本採用	プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	アル [®] ロスタジル アルファデクス	○	○
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タクロイムス水和物		○
院外・ 院内特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タクロイムス水和物	(限定)	○
本採用	プロナック点眼液0.1%	5mL/本	ブ [®] ムフェナクナトリウム水和物	○	○
本採用	プロベト	100g/本	白色ワレリン	○	○
本採用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ	2mg/mL 45mL/本	ブ [®] ムヘキシン塩酸塩	○	○
院外	ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジエイド ルフ)	20g/本	ブロメライン		○
院外・ 院内特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	モキシロキサシン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セフメキシム塩酸塩	○	○
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セフメキシム塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	イミモト [®]	(限定)	○
本採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サルブ [®] タメル硫酸塩	○	○
本採用	ベノキシル点眼液0.4%	5mL/本	オキシ [®] プロ [®] ロ [®] イン塩酸塩	○	○
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 「PP」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日 医工」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニブ ロ」	25g/本	ヘパリン類似物質軟膏	○	○
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医	50g/本	ヘパリン類似物質液		○
院外・ 院内特購	ベピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒト [®] コロチ ゾン	○	○
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL/本	生体組織接着剤	○	
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL/本	生体組織接着剤	○	
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL/本	生体組織接着剤	○	
院外・ 院内特購	ペンタサ坐剤1g	1g/個	メサジン	(限定)	○
院外	ペンタサ注腸1g	1g/100mL/本	メサジン		○
本採用	ペンニードルプラス	32G×4mm	-	○	○
本採用	ホーリンV腔用錠1mg	1mg	イストリオール	○	○
院外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚	ツロ [®] テロール		○
院外	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚	ツロ [®] テロール		○
院外	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚	ツロ [®] テロール		○
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	ヒ [®] ネフリン	○	○
本採用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	30mL/本	ポ [®] ビドンヨード [®]	○	【般】
本採用	ポビドンヨードゲル10%「イワキ」	50g/本	ポ [®] ビドンヨード [®] ゲル	○	○
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	50mL/本	ポ [®] ビドンヨード [®]	○	○
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250mL/本	ポ [®] ビドンヨード [®]	○	○
本採用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	500mL/本	ポ [®] ビドンヨード [®]	○	○
本採用	ボラザ [®] g 坐剤	1個	トリ [®] ア [®] ノ [®] スト [®] リ [®] ト [®] ガイ [®]	○	○
院外	ボルタレンサポ12.5mg	12.5mg	ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] トリ [®] ウム		○
院外	ボルタレンサポ25mg	25mg	ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] トリ [®] ウム		○
院外	ボルタレンサポ50mg	50mg	ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] トリ [®] ウム		○
院外	ボルタレンテープ15mg	7枚/包	ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] トリ [®] ウム		○
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○
院外	マイザークリーム0.05%	5g/本	ジ [®] フル [®] ア [®] レ [®] ト [®] ナ [®] ト		○
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジ [®] フル [®] ア [®] レ [®] ト [®] ナ [®] ト		○
院内	マクロゴール400	500mL/本	酸化エチレンと水との縮重合体	○	○
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	マ [®] キ [®] カル [®] シ [®] ト [®] ル [®] ・ハ [®] タ [®] メ [®] タ [®] ジ [®] ン [®] 酪 [®] 酸 [®] エ [®] ス テル [®] ロ [®] ヒ [®] オ [®] 酸 [®] エ [®] ステ [®] ル		○
院外	マンジャロ皮下注2.5mg アテオス	2.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○
院外	マンジャロ皮下注5mg アテオス	5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○
院外	マンジャロ皮下注7.5mg アテオス	7.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○
本採用	ミオコールスプレー0.3mg	0.3mg/本1回噴霧	ニコ [®] グリセリン	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ミケラン L A点眼液2%	2.5mL/本	カルテオール塩酸塩	○	○
院外	ミケルナ配合点眼液	2.5mL	カルテオール塩酸塩・ラノプロスト		
本採用	ミドリンM点眼液0.4%	5mL/本	トピカミド	○	○
院外	ミドリンP点眼液	5mL/本	トピカミド・フェニレリン塩酸塩		○
本採用	ミドレプリンP点眼液	5mL/本	トピカミド・フェニレリン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ミリステープ5mg	5mg/枚	ニコチンリセリン	(限定)	○
院外	ミルタックスパップ30mg	7枚/包	ケトロフィン		○
院内	ミレーナ52mg	52mg/個	レボルゲストル	○	
本採用	ムコスタ点眼液UD2%	20mg/mL 0.35mL/本	レバミピド	○	○
本採用	ムコファイリン吸入液20%	2mL/包	アセチルシステインナトリウム塩	○	○
本採用	無水エタノール「マルイシ」	500mL/本	エタノール	○	○
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	デキサメタゾン酢酸エステル		○
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	デキサメタゾン酢酸エステル		○
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○
院外	メノエイドコンパッチ	イストラジオール0.62mg・酢酸 ルイジステロン2.70mg	イストラジオール・酢酸ルイジステロン		○
本採用	メプチンエア-10μg吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピカテロール塩酸塩水和物	○	○
院外	メプチンキッドエア-5μg吸入100回	5μg/1回噴霧	プロピカテロール塩酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	メプチンシングヘラー-10μg吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピカテロール塩酸塩水和物	(限定)	○
本採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	プロピカテロール塩酸塩水和物	○	○
院外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	ジファミラスト軟膏		○
院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ジファミラスト軟膏		○
院外	モ-ラステープ20mg	7枚/包	ケトロフィン		○
院外	モ-ラステープL40mg	7枚/包	ケトロフィン		○
院外	モ-ラスパップ30mg	7枚/包	ケトロフィン		○
本採用	モ-ラスパップXR120mg	7枚/包	ケトロフィン	○	○
院外	モ-ラスパップXR240mg	7枚/包	ケトロフィン		○
院外	ユーパスタコーワ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホピトニョト		○
院外・ 院内特購	ユベラ軟膏	56g/本	トコフェロール・ビタミンA油	(限定)	○
院外・ 院内特購	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリンデグデルク210単位 /3mL インスリンアスパルト90単位	インスリンデグデルク インスリンアスパルト	(限定)	○
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	ラタノプロスト	○	【般】
特購	ラパリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シロリムスゲル	(限定)	(限定)
院外	ラミシールクリーム1%	10g/本	リビドナフィン塩酸塩		○
本採用	ランタスXR注ソロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリングルキニン	○	○
院外	ランタス注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリングルキニン		○
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トアラスタ		○
院外	リズモン T g点眼液0.5%	2.5mL/本	フェニルメチン酸塩		○
特購	リテンバ耳科用250μgセット	250μg/セット	トコフェリン(遺伝子組換え)	(限定)	
本採用	リドカインテープ18mg「NP」	(18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	プロピカテロール・ジ草酸エステル酢酸 エステル		○
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	プロピカテロール・ジ草酸エステル酢酸 エステル		○
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロピカテロール・ジ草酸エステル酢酸 エステル		○
院外・ 院内特購	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚	リバスタグミン	(限定)	○
院外	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚	リバスタグミン		○
院外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚	リバスタグミン		○
院外	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚	リバスタグミン		○
本採用	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	レボカルバシチン塩酸塩	○	○
院外	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	0.025mg	レボカルバシチン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	アトロチン硫酸塩水和物	(限定)	○
院外	リレンザ	5mg/ブリストア	ザナミビル水和物		○
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ヘタメタリン酸エステルナトリウム・ラ ジチル硫酸塩		○
院外	リンデロン-D Pクリーム	5g/本	ヘタメタリン酸エステル		○

