

八千代医療センター採用医薬品集（外用・自己注射）

2025年4月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要のため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：251品目 院外採用：322品目（特別購入薬：60品目）

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院内	アイオピジンU D点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	ア [°] ラ [°] ロ [°] ジ [°] ン塩酸塩	○			
院内	アイノフロー吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ガス	○			
本採用	アイファガン点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	アリ [°] ロ [°] ジ [°] ン酒石酸塩	○	○		
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本	プリ [°] モ [°] ニ [°] ジ [°] ン・プリ [°] ンゾ [°] ラミド		○		
院外・ 院内特購	アウィクリ注 フレックスタッチ総量300単位	300単位/キット	イン [°] ス [°] リ [°] ン イ [°] ンテ [°] ク（遺伝子組換え）	（限定）	○		
本採用	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	50g/瓶	酸化亜鉛	○	○		
院外	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	500g/瓶	酸化亜鉛		○		○
院外	アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	ナジ [°] ブ [°] ロ [°] キ [°] シン		○	【般】	
本採用	アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	ナジ [°] ブ [°] ロ [°] キ [°] シン	○	○		
本採用	アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ブ [°] ク [°] レ [°] デ [°] シンナトリウム	○	○		
院外・ 院内特購	アジマイシン点眼液1%	1%1mL 2.5mL/本	アジ [°] ス [°] ロ [°] マイシン水和物	（限定）	○		
院外	アスタット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ラ [°] ノ [°] コ [°] サ [°] ビ [°] ール		○		
院外	アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	アズ [°] レ [°] ニス [°] ルホ [°] ン酸ナトリウム水和物		○		
本採用	アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ジ [°] メ [°] チ [°] ルイ [°] ア [°] ロ [°] ビ [°] ルアズ [°] レ [°] ン	○	○		
本採用	アスプール液(0.5%)	5mg/mL 50mL/本	dI-イ [°] ブ [°] レ [°] ナリン塩酸塩	○	○		
院外	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸	200μg/吸入	モ [°] メ [°] タ [°] リ [°] ソ [°] フ [°] ランカ [°] ルホ [°] ン酸エステル		○		
院外	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	アズ [°] レ [°] ニス [°] ルホ [°] ン酸ナトリウム水和物		○		
本採用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	100mg/個	アセトアミノフェン100mg坐剤	○		【般】	
院内	アセサイド6%消毒液O E M－2	第一剤:750mL 第二剤:750mL	過酢酸	○			
院内	アセサイド6%消毒液O E M－3	第一剤:875mL 第二剤:875mL	過酢酸	○			
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	アリ [°] ンゾ [°] ラミド [°] ・チ [°] モ [°] ロ [°] ル [°] レ [°] イン酸塩		○		
院外	アテキユラ吸入用カプセル低用量	1カプセル中：イン [°] タ [°] カ [°] テ [°] ロ [°] ール酢酸塩173μg（イン [°] タ [°] カ [°] テ [°] ロ [°] ールとして150μg）・モ [°] メ [°] タ [°] リ [°] ソ [°] フ [°] ランカ [°] ルホ [°] ン酸エステルカ [°] プ [°] セル	イン [°] タ [°] カ [°] テ [°] ロ [°] ール酢酸塩・モ [°] メ [°] タ [°] リ [°] ソ [°] フ [°] ランカ [°] ルホ [°] ン酸エステルカ [°] プ [°] セル		○		
院外	アテキユラ吸入用カプセル中用量	1カプセル中：イン [°] タ [°] カ [°] テ [°] ロ [°] ール酢酸塩173μg（イン [°] タ [°] カ [°] テ [°] ロ [°] ールとして150μg）・モ [°] メ [°] タ [°] リ [°] ソ [°] フ [°] ランカ [°] ルホ [°] ン酸エステルカ [°] プ [°] セル	イン [°] タ [°] カ [°] テ [°] ロ [°] ール酢酸塩・モ [°] メ [°] タ [°] リ [°] ソ [°] フ [°] ランカ [°] ルホ [°] ン酸エステルカ [°] プ [°] セル		○		
院外	アテキユラ吸入用カプセル高用量	1カプセル中：イン [°] タ [°] カ [°] テ [°] ロ [°] ール酢酸塩173μg（イン [°] タ [°] カ [°] テ [°] ロ [°] ールとして150μg）・モ [°] メ [°] タ [°] リ [°] ソ [°] フ [°] ランカ [°] ルホ [°] ン酸エステルカ [°] プ [°] セル	イン [°] タ [°] カ [°] テ [°] ロ [°] ール酢酸塩・モ [°] メ [°] タ [°] リ [°] ソ [°] フ [°] ランカ [°] ルホ [°] ン酸エステルカ [°] プ [°] セル		○		
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	1噴霧中：サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールキ [°] シ [°] ナ [°] ホ [°] 酸塩・フル [°] チ [°] カ [°] リ [°] ン [°] ア [°] ロ [°] ビ [°] ン酸エステル36.3μg(サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールとして25μg)/50μg	サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールキ [°] シ [°] ナ [°] ホ [°] 酸塩・フル [°] チ [°] カ [°] リ [°] ン [°] ア [°] ロ [°] ビ [°] ン酸エステル		○		
院外・ 院内特購	アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中：サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールキ [°] シ [°] ナ [°] ホ [°] 酸塩・フル [°] チ [°] カ [°] リ [°] ン [°] ア [°] ロ [°] ビ [°] ン酸エステル36.3μg(サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールとして25μg)/125μg	サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールキ [°] シ [°] ナ [°] ホ [°] 酸塩・フル [°] チ [°] カ [°] リ [°] ン [°] ア [°] ロ [°] ビ [°] ン酸エステル	（限定）	○		
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中：サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールキ [°] シ [°] ナ [°] ホ [°] 酸塩・フル [°] チ [°] カ [°] リ [°] ン [°] ア [°] ロ [°] ビ [°] ン酸エステル36.3μg(サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールとして25μg)/250μg	サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールキ [°] シ [°] ナ [°] ホ [°] 酸塩・フル [°] チ [°] カ [°] リ [°] ン [°] ア [°] ロ [°] ビ [°] ン酸エステル		○		
本採用	アドエア100ディスクス28吸入用	1ブリスター中：サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールキ [°] シ [°] ナ [°] ホ [°] 酸塩・フル [°] チ [°] カ [°] リ [°] ン [°] ア [°] ロ [°] ビ [°] ン酸エステル72.5μg(サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールとして50μg)/100μg	サル [°] メ [°] テ [°] ロ [°] ールキ [°] シ [°] ナ [°] ホ [°] 酸塩・フル [°] チ [°] カ [°] リ [°] ン [°] ア [°] ロ [°] ビ [°] ン酸エステル	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	アドエア100ディスクス60吸入用	17リスター中：サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル：72.5μg(サルメテロールとして50μg)/100μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル		○	
本採用	アドエア250ディスクス28吸入用	17リスター中：サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル：72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル	○	○	
院外	アドエア250ディスクス60吸入用	17リスター中：サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル：72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル		○	
院外	アドエア500ディスクス28吸入用	17リスター中：サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル：72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル		○	
院外	アドエア500ディスクス60吸入用	17リスター中：サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル：72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル		○	
院外	アドフィードパップ40mg	40mg/枚 7枚/包	フルビド [®] ロフィン		○	
本採用	日点アトロピン点眼液1%	5mL/本	アトロピン硫酸塩水和物	○	○	
院外	アトロバントエロゾル20μg	20μg/1噴霧	イプラト [®] ロム臭化物水和物		○	
院外	アニュイティ100μg エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○	
院外	アニュイティ200μg エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○	
院外	アノーロエリプタ30吸入用	17リスター中：ウメクリジニウム62.5μg)・ヒランテール25μg	ウメクリジニウム臭化物・ヒランテールトリフェニル酢酸塩		○	
院外	アピドラ注100単位/mL	1000単位/10mL/V	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)		○	
特購	アピドラ注カート	1000単位/10mL/V	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	アピドラ注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	0.025mg	トリアムシロンアセトイド [®]		○	
本採用	アラセナー A軟膏3%	30mg/g 5g/本	ヒダラセン	○	○	【般】
院外	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】
院外	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】
院外	アリケイス吸入液590mg	590mg/8.4mL/瓶	アマカシン硫酸塩		○	○
院外	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg/枚	トネパ [®] ジル		○	
院外	アリドネパッチ55mg	55mg/枚	トネパ [®] ジル		○	
本採用	アルメタ軟膏	1mg/g 5g/本	アルクロメタゾン [®] 0.1° [○] 酢酸エステル	○	○	
院外	アレサガテープ4mg	4mg/枚 (2.23cm×3.61cm)	エメダスチンフマル酸塩貼付剤		○	
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	5mg/g	11°ナステキ塩酸塩クリーム		○	
院外	アレジオン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	11°ナステキ塩酸塩		○	
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	11°ナステキ塩酸塩		○	
院外	アレバール吸入用溶解液0.125%	100mL/本	フロキサ [®] ール(サハ [®] リノ)		○	
本採用	アンテベートクリーム0.05%	0.5mg/g 5g/本	ヘタマタゾン酪酸エステル [®] 0.1° [○] 酢酸エステル	○	○	
院外	アンテベートローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	ヘタマタゾン酪酸エステル [®] 0.1° [○] 酢酸エステル		○	
本採用	アンテベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ヘタマタゾン酪酸エステル [®] 0.1° [○] 酢酸エステル	○	○	
院外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg	アセトアミノフェン		○	【般】
院外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg	アセトアミノフェン		○	【般】
院外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	アンベック坐剤10mg	10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
院外	アンベック坐剤20mg	20mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○	
院外	【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	300mg	イソコナゾール硝酸塩			【般】
院外	イドメシニコワゲル1%	10mg/g 35g/本	インドメタシン		○	【般】
院外	イドメシニコワゾル1%	10mg/g 30g/本	インドメタシン		○	
本採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット(水と物として20.76mg)	ラニミビルオクタン酸エステル	○	○	
院外	イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	スマトリ [®] タン		○	
院外	インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」	100単位/1mL 10mL/V	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○	
院外	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	300単位/筒	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○	
院外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位/キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
特購	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位/筒	インスリン グラルギン	(限定)	(限定)		
本採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/キット	インスリン グラルギン	○	○		
院外	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	100単位/1mL、10mL/ 瓶	インスリン リスプロ		○		
本採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノ フィ」	300単位/3mL/キット	インスリン リスプロ	○	○		
院外	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位/筒	インスリン リスプロ		○		
本採用	インタール吸入液1%	20mg/2mL/A	クロモリク酸ナトリウム	○	○		
院外	インテバクリーム1%	1%/1g	インドメタシン		○		
院外	インテバン坐剤25	25mg	インドメタシン		○		
院内	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	クロルヘキシジングルコン酸塩	○			
院内	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	○			
院外	ウーゴービ皮下注0.25mg SD	0.25mg/0.5mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウーゴービ皮下注0.5mg SD	0.5mg/0.5mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウーゴービ皮下注1.0mg SD	1mg/0.5mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウーゴービ皮下注1.7mg SD	1.7mg/0.75mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウルティブロ吸入用カプセル	1Cp中:グリコピロニウム50μ g・インダカテロール110μg	グリコピロニウム臭化物・インダカ テロールマレイン酸塩		○		
院外	ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○		
本採用	ウレパールローション10%	100mg/g 20g/本	尿素	○	○		
本採用	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3%	90g/3000mL/B	D-ソリビトール	○	○		
本採用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	プリニツラムド	○	○		
本採用	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・ 炭酸水素ナトリウム	○		【般】	
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/ 混合死菌浮遊液	オミデナバグ イソプロピル液		○		
本採用	エキザルバ	0.166mL(大腸菌死菌: 約1.5億個・ブドウ球菌死 菌:約1.5億個・レンサ球菌 死菌:約0.15億個・緑膿 菌死菌:約0.15億個を含 有)・ヒドロコルチゾン	混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾ ン	○	○		
本採用	エクラープラスター20μg/cm2	7.5cm×10cm	デプロトロンプロピオン酸エステル	○	○		
院外	エクリラ400μg ジェヌエア60吸入用	400μg/回	アリジニウム臭化物		○		
特購	エコリシン眼軟膏	3.5g/本	エリスロマイシンラクチド・リン酸塩・ポリス トマンスルホン酸ナトリウム軟膏	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	エスケレ坐剤「250」	250mg	抱水クロール	(限定)	○		
院外	エスケレ坐剤「500」	500mg	抱水クロール		○		
本採用	エスケレ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水クロール	○	○		
院外	エストラーナテープ0.18mg	0.18mg/枚	エストラジオール		○		
院外	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚	エストラジオール		○		
院外	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジオール		○		
本採用	S P トローチ0.25mg「明治」	0.25mg	デカリニウム塩化物	○	○		
本採用	エタノール	500mL(15℃で 95.1～96.9vol%を含む)	エタノール	○	○		
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル中; インダカテロール マレイン酸塩173μg (インダカ テロールとして150μg)・グリ コピロニウム臭化物63μg (グ リコピロニウムとして50μg)・モ メタゾンフランカルボン酸エステル80	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピ ロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボ ン酸エステル		○		
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル中; インダカテロール マレイン酸塩173μg (インダカ テロールとして150μg)・グリ コピロニウム臭化物63μg (グ リコピロニウムとして50μg)・モ メタゾンフランカルボン酸エステル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピ ロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボ ン酸エステル		○		
院外	エヌジェンラ皮下注24mgペン	24mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン（遺伝子組換		○		
院外	エヌジェンラ皮下注60mgペン	60mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン（遺伝子組換		○		
院外	エビデュオゲル	15g/本	アダパレン・過酸化ベンゾイルゲル		○		
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸バリウム	○	○		
本採用	M S 温シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシ エキス	○	○		
本採用	M S 冷シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トメントール	○	○		
本採用	エムラクリーム	リトカイン25mg・プロピ ル25mg/g 5g/本	リトカイン・プロピル	○	○		
院外	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾン・シロ酸エステル		○		
院外	エングラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	エンペシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	カトリマゾール		○	【般】	
院外	オイラックスHクリーム	カタミト100mg・ヒトコルチゾン2.5mg/g 5g/本	カタミト・ヒトコルチゾン		○		
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	カタミト	○	○		
院外	オーキ西斯9μg タービュヘイラー60吸入	9μg/吸入	ホルモロルマル酸塩水和物		○		
院外	オキサロールローション25μg / g	25μg/g 10g/本	マキカルシール		○		
院外	オキサロール軟膏25μg / g	25μg/g 10g/本	マキカルシール		○	【般】	
本採用	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩錠	○		【般】	
院内	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○			
本採用	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	アバロパラチド酢酸塩注射液	○	○		
本採用	オスバン消毒液10%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○		
本採用	オゼックス点眼液0.3%	0.3%/mL	トスフロキサシントシル酸塩水和物点眼液	○	○		
本採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg/本	セマグルチン（遺伝子組み換え）キット	○	○		
院内	オベガードMA眼灌流液	ブドウ糖1.5mg・塩化ナトリウム6.6mg・塩化カリウム0.36mg・塩化カルシウム水和物0.18mg・硫酸マグネシウム水和物0.3mg・炭酸水素ナトリウム2.1mg/mL	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マグネシウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○			
院内	オベガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○			
院内	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○			
院外	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	トミフェン臭化物		○		
院内	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	オラネジングルコン酸	○			
院外	オラビ錠口腔用50mg	50mg/錠	ミコナゾール		○		
本採用	オリブ油「ヨシダ」	25mL/本〔滅菌済〕	オリブ油	○	○		
院外	オルセノン軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トリチノイントロフェリル		○		
本採用	オルベスコ200μg インヘラー56吸入用	200μg/1噴霧	シクレリト	○	○		
院外	オンブレス吸入用カプセル150μg	150μg	インダカテロールマレイン酸塩		○		
院外	ガチフロ点眼液0.3%	5mL/本	ガチフロキサシン水和物		○		○
本採用	カデックス軟膏分包45mg	45mg/5g/包	ヨウ素軟膏	○	○		
院外	カラムンローション*（丸石）	カラムン8g・酸化亜鉛8g/100mL 500mL/本	カラムン・酸化亜鉛		○		
本採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参	0.05mg/mL 5mL/本	ピレノキシン	○	○		
院外	キサラン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	タラノロロスト		○	【般】	
本採用	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	リトカイン塩酸塩	○	○		
本採用	キシロカインピスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	リトカイン塩酸塩	○	○		
本採用	キシロカインボンブスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	リトカイン	○	○		
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	リトカイン塩酸塩	○	○		
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	リトカイン塩酸塩	○	○		
本採用	キューバル100エアゾール	100μg/1噴霧	ベカメタゾノプロピオン酸エステル	○	○		
院外	強力ボステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒトコルチゾン		○	【般】	
本採用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ヒトコルチゾン酢酸エステル・フラジーマイシン硫酸塩・ジフェニトロキシム塩	○	○	【般】	
本採用	キンダバート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	クロハダシン酪酸エステル	○	○	【般】	
院外	グラアルファ配合点眼液	5mL/本	リパスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩		○		
院外・ 院内特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リパシジル塩酸塩水和物	(限定)	○		
院外	クラビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物		○		
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 30mL/個	グリセリン	○	○		
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 60mL/個	グリセリン	○		【般】	
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 120mL/個	グリセリン	○	○		
本採用	グリセリン「ケンエー」	25mL/本(84.0~87.0%を含む) (滅菌済)	グリセリン	○	○		
本採用	グリセリンBC液「ヨシダ」	250mL/瓶 (84.0~87.0%を含む)	0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン	○	○		
本採用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	エフィナゾール	(限定)	○		
本採用	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール	○		【般】	
院外	【般】クロトリマゾール錠100mg	100mg	クロトリマゾール			【般】	
院外	クロマイーP軟膏	クロラムフェニコール20mg・フラジーマイシン硫酸塩5mg・プロトニゾン3mg/g 25g/本	クロラムフェニコール・フラジーマイシン硫酸塩・プロトニゾン		○	【般】	
院外	クロマイ錠100mg	100mg	クロラムフェニコール		○		
本採用	クロラムフェニコール錠100mg「F」	100mg/錠	クロラムフェニコール	○	○		
本採用	ゲーベングリーム1%	10mg/g	スルファジアジン銀	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール	○		【般】	
本採用	ケトチフェン点眼液0.05%「SW」	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェンフル酸塩	○		【般】	
本採用	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	○		【般】	
本採用	ケラチナミンコーワクリーム20%	200mg/g 25g/本	尿素	○	○	【般】	
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩		○		
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○		【般】	
院外・ 院内特購	コソプト配合点眼液	トルバミド [®] 10mg・フェロ [®] 5mg/mL 5mL/本	トルバミド [®] 塩酸塩・フェロ [®] マレイン酸塩	(限定)	○		
院外	コソプトミニ配合点眼液	トルバミド [®] 10mg・フェロ [®] 5mg/mL 0.4mL/本	トルバミド [®] 塩酸塩・フェロ [®] マレイン酸塩		○		
本採用	コレクチム軟膏0.25%	2.5mg/g 5g/本	デルゴ [®] シニコ [®]	○	○		
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	デルゴ [®] シニコ [®]		○		
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ヒ [®] タミンA油		○		
本採用	サーファクテン気管注入用120mg q	120mg/V	肺サーファクタント製剤	○	○		
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロ [®] ペン [®] トレート塩酸塩	○	○		
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェンフル酸塩		○	【般】	
本採用	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	ケトチフェンフル酸塩	○	○	【般】	
院内	サニサーウW	250mL/本	イタノール	○			
院内	サニサーウW	60mL/本	イタノール	○			
院外	サラゾピリン坐剤500mg q	500mg/個	サラゾ [®] スルファピ [®] リジン		○		
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセリン900mg/g	サリチル酸ワセリン		○		
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤		○		
院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg/カプセル	バ [®] グメタゾ [®] ン [®] ピ [®] ン酸エステル		○		
本採用	サルタノールインヘラー100μg	100μg/1回噴霧	サルバ [®] タモール硫酸塩	○	○		
院外	サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノバ [®] ラミン		○	【般】	
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ピ [®] ロカル [®] ン塩酸塩		○		
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ピ [®] ロカル [®] ン塩酸塩	○	○		
院外	サンピロ点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ピ [®] ロカル [®] ン塩酸塩		○		
本採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	バ [®] タメタゾ [®] ンリン酸エステルナトリウム	○	○	【般】	
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ポ [®] ビ [®] ト [®] ンヨート [®]	○	○		
本採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバラミン液	○	○		
院外	シーブリ吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリ [®] ヒ [®] ロ [®] ニウム臭化物		○		
本採用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ヒアル [®] ロン酸ナトリウム・コン [®] ドロ [®] イチン硫酸エステルナトリウム液	○	○		
院外	ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホル [®] ナトリウム		○		
院外	ジクアスLX点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホル [®] ナトリウム		○		
本採用	ジクトルテープ75mg q	75mg1枚	ジク [®] ロフェナク [®] ナトリウム	○	○		
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジク [®] ロフェナク [®] ナトリウム		○		
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	12.5mg	ジク [®] ロフェナク [®] ナトリウム	○	○		
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg	ジク [®] ロフェナク [®] ナトリウム	○	○		
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg	ジク [®] ロフェナク [®] ナトリウム	○	○		
特購	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶	ジメチル [®] スル [®] ホキシ [®] ト [®] 液	(限定)	(限定)		
本採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブ [®] デ [®] リ [®] ニド [®] 160μg・ホ [®] ル [®] フェ [®] ロ [®] ルフル酸塩水和物4.5μg/	ブ [®] デ [®] リ [®] ニド [®] ・ホ [®] ル [®] フェ [®] ロ [®] ルフル酸塩水和物	○	○		
本採用	消毒用エタノール「ケンエー」	500mL/本	イタノール	○	○		
院外	小児用レルベア50エリプタ30吸入用	1 [®] ブ [®] リ [®] スター [®] 中 [®] ・ヒ [®] ラン [®] フェ [®] ロ [®] ル25μg・フル [®] チ [®] カ [®] ゾ [®] ン [®] フラン [®] カル [®] ホ [®] ン [®] 酸エステル50μg	ヒ [®] ラン [®] フェ [®] ロ [®] ルトリ [®] フェ [®] ニ [®] ル酢酸塩・フル [®] チ [®] カ [®] ゾ [®] ン [®] フラン [®] カル [®] ホ [®] ン [®] 酸エステル吸入剤		○		
院外	ジルダザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ハン [®] ダ [®] ザ [®] ック		○		
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ [®] 酸・無機塩類配合剤液		○		
本採用	ジンジカインゲル20%	30g/本	アミノ安息香酸エチル液	○	○		
院外	親水クリーム「ホエイ」	-	親水クリーム		○		
本採用	シンポニー皮下注50mg q オートインジェク	50mg/0.5mL/キット	ゴ [®] リ [®] ムマ [®] ア [®] (遺伝子組換え)	○	○		
本採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	○	○		
本採用	スープレン吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	デ [®] スフル [®] ラン	○	○		
本採用	スコピゾル眼科用液	ピ [®] ト [®] ロ [®] キシ [®] フル [®] ヒ [®] ロ [®] ス15mg・塩化ナトリウム5.5mg・塩化カリウム1.6mg・乾燥炭酸ナトリウム0.6mg・リン酸水素ナトリウム水和物1.8mg・ホ [®] 酸12mg 15mL/本	ピ [®] ト [®] ロ [®] キシ [®] フル [®] ヒ [®] ロ [®] ス・塩化ナトリウム・塩化カリウム・乾燥炭酸ナトリウム・リン酸水素ナトリウム水和物・ホ [®] 酸	○	○		
院外	スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	イ [®] ブ [®] ア [®] ロ [®] フェ [®] ニ [®] コ [®] ノール		○		
本採用	スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	イ [®] ブ [®] ア [®] ロ [®] フェ [®] ニ [®] コ [®] ノール	○	○		
本採用	ステリクロンRエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロ [®] ル [®] ハ [®] キシ [®] ジ [®] ン [®] グ [®] ル [®] コ [®] ン酸塩・イタノール	○	○		
院外	ステリクロンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/	クロ [®] ル [®] ハ [®] キシ [®] ジ [®] ン [®] グ [®] ル [®] コ [®] ン酸塩		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ステリクロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/	カラムキジニンゲルン酸塩	○	○		
院外	ステロネマ注腸3m g	3mg(リン酸エステルナトリウムとし て3.95mg) 100mL/個	ヘタメタリニリン酸エステルナトリウム		○		
本採用	スピオルトレスピマット60吸入	1噴霧中フルオロフルオム2.5μg 及び相対分子重2.5μg	フルオロフルオム臭化物水和物・相 対分子重2.5μg	○	○		
院外	スピール膏M	357g/m2 25cm2/枚	グリセリン		○		
院外・ 院内特購	スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロピルニソリン吉草酸エステル酢酸 エステル	(限定)	○	【般】	
本採用	スピリーバ2.5μ g レスピマット60吸入	2.5μg/噴霧	フルオロフルオム臭化物水和物	○	○		
院外・ 院内特購	スピリーバ吸入用カプセル18μ g	18μg/Cp 7Cp/シート	フルオロフルオム臭化物水和物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	フェニトリン	(限定)	○		
院外	ゼビアックスローション2%	10g/本	ゼビアキシン		○		
本採用	ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	リナファタート	○	○		
院外	ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	リナファタート		○		
本採用	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	250mg/250mL/B	セボフルラン	○	○		
院外	セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	フェルビタク		○	【般】	
院外	セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	フェルビタク		○	【般】	
院外	セレベント50ディスクス	50μg/17mmディスク 60mmディスク/個	サルメテロールキシナ林酸塩		○		
本採用	ソビラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	アシクロビル	○	○		
院外	ソビラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	アシクロビル		○		
本採用	ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	フラジールマイシン硫酸塩	○	○		
院外	ソマトロピンBS皮下注5m g「サンド」シユ アパル	5mg/筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○		○
院外	ソマトロピンBS皮下注10m g「サンド」シユ アパル	10mg/筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○		○
院外・ 院内特購	ソリクア配合注ソロスター	1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組 換え)・リキシセナチド配合剤 キット	(限定)	○		
本採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組 換え)・リラグルチド(遺伝子組 換え)配合剤キット	○	○		
本採用	ソルベース	500g/瓶	マクロゴール400 マクロゴール4000	○	○		
本採用	ダイアップ坐剤4	4mg	ジアセパム	○	○		
本採用	ダイアップ坐剤6	6mg	ジアセパム	○	○		
本採用	ダイアップ坐剤10	10mg	ジアセパム	○	○		
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリノゲン5.5mg・トロン ビーン画分2.0IU・ウマコラーゲン 2.1mg/1cm2 [4.8cm ×4.8cm/枚 (ハーフサイ ズ)] 1	生体組織接着剤	○			
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリノゲン5.5mg・トロン ビーン画分2.0IU・ウマコラーゲン 2.1mg/1cm2 [9.5cm ×4.8cm/枚 (レギュラーサ イズ)] 1	生体組織接着剤	○			
院外	タブコム配合点眼液	2.5mL/本	タフルプロスト・フルメドニドリン酸		○		
院外	タブロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	タフルプロスト		○		
院外	タブロスミニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	タフルプロスト		○		
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	タロキサシン	○	○		
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	タロキサシン	○	○		
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	タリムス水和物		○		
本採用	チモプトールX E点眼液0.5%	2.5mL/A	フルメドニドリン酸塩	○	○	【般】	
院外	ツムラ紫雲膏	500g×1瓶	紫雲膏		○		
本採用	ツロブテロールテープ0.5m g「久光」	0.5mg/枚	ツロブテロール	○		【般】	
本採用	ツロブテロールテープ1m g「久光」	1mg/枚	ツロブテロール	○		【般】	
本採用	ツロブテロールテープ2m g「久光」	2mg/枚	ツロブテロール	○		【般】	
院内	ディスオーバ消毒液0.55%	3.8L/本	フタール	○			
院外	ディビゲル1m g	1mg	エストラジオール		○		
院外・ 院内特購	ディフェリンゲル0.1%	15g/本	アタバレン	(限定)	○		
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	デキサメタゾン	○		【般】	
本採用	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μ g「フェリン	2.5μg/1回噴霧	デスモプレシン酢酸塩水和物	○	○		
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	プロパントール塩酸塩		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エピジヒドロコレスチリン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○		
院外	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物10mg・過酸化ベンゾイル 30mg/a 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○		
院外	デュオトラバ配合点眼液	トラホプロスト40μg・チロールマレイン酸塩5mg	トラホプロスト・チロールマレイン酸塩		○		
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg	2.1mg/枚	フェンタニル		○		
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg	4.2mg/枚	フェンタニル		○		
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg	8.4mg/枚	フェンタニル		○		
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg	16.8mg/枚	フェンタニル		○		
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg《慢性疼痛》	2.1mg/枚	フェンタニル		○		○
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg《慢性疼痛》	4.2mg/枚	フェンタニル		○		○
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg《慢性疼痛》	8.4mg/枚	フェンタニル		○		○
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg《慢性疼痛》	16.8mg/枚	フェンタニル		○		○
本採用	テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）	25g/本	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	○	○		
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリチルリチン酸		○		
本採用	デルモゾールgローション	10mL/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○		
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	クロヘタゾールプロピオン酸エステル		○	【般】	
院外・ 院内特購	デルモベートスカルプローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	クロヘタゾールプロピオン酸エステル	(限定)	○	【般】	
本採用	デルモベート軟膏0.05%	5g/本	クロヘタゾールプロピオン酸エステル	○	○	【般】	
本採用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○		
院外	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○		
本採用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○		
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○		
院外・ 院内特購	テレミンソフト坐薬2mg	2mg	ビサゾール	(限定)	○		
本採用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg	ビサゾール	○	○		
特購	トービー吸入液300mg	300mg/5mL/管	トブテマイシン	(限定)	(限定)		
院外	トブシムクリーム0.05%	10g/本	フルオシノニド		○	【般】	
本採用	トブシムローション0.05%	10g/本	フルオシノニド	○	○		
院外	トブシム軟膏0.05%	10g/本	フルオシノニド		○		
院外・ 院内特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブテマイシン	(限定)	○		
院外	ドボネックス軟膏50μg / g	10g/本	カルシボトリオール		○		
院外	ドボベットのゲル	15g/本	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○		
院外	ドボベットの軟膏	カルシボトリオール50.0μg・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル 0.643mg/a 15g/本	カルシボトリオール水和物・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル		○		
院外	ドボベットの軟膏	カルシボトリオール50.0μg・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル 0.643mg/a 30g/本	カルシボトリオール水和物・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル		○		
院外	ドボベットのフォーム	60g/本	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○		
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トラホプロスト		○		
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルソファミド 塩酸塩		○		
本採用	トリリシティ皮下注0.75mg q アテオス	0.75mg/0.5mL/キット	デュラゲルチド	○	○		
本採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位/筒	インスリン デグレルデク（遺伝子組換え）	○	○		
特購	トレシーバ注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デグレルデク（遺伝子組換え）	(限定)	(限定)		
本採用	トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	10000単位	トロンピン	○	○		
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	ドンパトリオン	○	○	【般】	
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	ドンパトリオン	○	○	【般】	
本採用	ナウゼリン坐剤60	60mg	ドンパトリオン	○	○		
院外	ナゾネックス点鼻液50μg q 112噴霧用	50μg/噴霧	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物		○		
本採用	ナノパスニードルⅡ	34G×4mm	-	○	○		
院外	ナパゲルンローション3%	50mL/本	フェルビタマク		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ナパゲルン軟膏3%	25g/本	フェルヒナク		○		
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2 /枚	ニコチン		○		
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /枚	ニコチン		○		
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /枚	ニコチン		○		
院外	ニゾールクリーム2%	10g/本	ケトコナゾール		○	【般】	
院外	ニゾールローション2%	10g/本	ケトコナゾール		○	【般】	
院外	ニトログリセリンテープ27mg「トローワ」	27mg/9.6cm2/枚	ニトログリセリン貼付剤		○		
本採用	ニトロダーム T T S 25m g	25mg/枚	ニトログリセリン	○	○		
院外	ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ニブラジロール		○		
院外	ニュープロパッチ2.25m g	2.25mg/枚	ロドコチン		○		
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ4.5m g	4.5mg/枚	ロドコチン	(限定)	○		
本採用	ニュープロパッチ9m g	9mg/枚	ロドコチン	○	○		
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ13.5m g	13.5mg/枚	ロドコチン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ18m g	18mg/枚	ロドコチン	(限定)	○		
院外	ネオキシテープ73.5m g	73.5mg/枚	オキシフェン塩酸塩		○		
本採用	ネオンネジニューワ5%点眼液	10mL/本	フェニレフリン塩酸塩	○	○		
本採用	ネオステリンググリーンうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○		
本採用	ネオメドロール E E 軟膏	3g/本	フラジマキシム硫酸塩・メチルプレドニゾン	○	○		
院内	ネキソブリッド外用ゲル5g	5g/瓶(混合用ゲル付)	ハイイッパル茎搾汁精製物	○			
本採用	ネグミンシュガー軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホピトニョート	○	○	【般】	
本採用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ネパフェナク	○	○		
院外・ 院内特購	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○		
院外	ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン		○		
院外	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト		○		
本採用	ノボラピッド注 フレックスタッチ	300単位/3mL	インスリン アスパルト	○	○		
院外・ 院内特購	ノボラピッド注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○		
本採用	ノボラピッド注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト	○	○		
院外・ 院内特購	ノボリン30 R 注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○		
本採用	ノボリン N 注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○		
院外・ 院内特購	ノボリン R 注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ノボリンR注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○		
院外	ノルスパンテープ5m g	5mg/枚	ブプロピレン		○		○
院外・ 院内特購	ノルスパンテープ10m g	10mg/枚	ブプロピレン	(限定)	○		○
院外	ノルスパンテープ20m g	20mg/枚	ブプロピレン		○		○
本採用	ハイジール消毒用液10%	10%/10mL	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	○	○		
院外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	ニブラジロール		○	【般】	
本採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	○	○		
院外	白色ワセリン	100g/本	白色ワセリン		○		
院外	バクスマー点鼻粉末剤3m g	3mg/瓶	グルコゴン		○		
本採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	メロキシカルシウム	○	○		
院外	パタノール点眼液0.1%	5mL/本	オキサジン塩酸塩		○		
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	アスレインリン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム		○		
院内	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/本	ハッカ油	○			
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	シクロホリン		○		
院外・ 院内特購	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	200μg/1回噴霧	ブデゾニド	(限定)	○		
本採用	パルミコート吸入液0.25m g	0.25mg/2mL/A	ブデゾニド	○	○		
院外・ 院内特購	パルミコート吸入液0.5m g	0.5mg/A	ブデゾニド	(限定)	○		
院外	ハルロピテープ8m g	8mg/枚	ロピニール塩酸塩		○		
院外	ハルロピテープ16m g	16mg/枚	ロピニール塩酸塩		○		
院外	ハルロピテープ24m g	24mg/枚	ロピニール塩酸塩		○		
院外	ハルロピテープ32m g	32mg/枚	ロピニール塩酸塩		○		
特購	バンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	バンコマイシン	(限定)	(限定)		
院外	バンデルクリーム0.1%	5g/本	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○		【般】	
院内	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」	0.6mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	○			
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		○	【般】	
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	【般】	
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○	【般】	
本採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○		
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液	20mL/B（希釈液付）	ポリシクロチオン	○	○		
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.6mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○			
院内	ピオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○			
院外・ 院内特購	ビクトーザ皮下注18mg g	18.0mg/筒	リカグルト [®]	(限定)	○		
本採用	ビソノテープ4mg g	4mg/枚	ビソップ [®] 00-ル	○	○		
院内	ヒビスクラブ消毒液4%	4% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	○			
本採用	5%ヒピテン液	500mL/本	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○		
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ピマリシン		○		
院外	ヒューマリン3／7注カート	300単位/3mL	インスリン		○		
院外	ヒューマリン3／7注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○		
本採用	ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○		
院外	ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	インスリン		○		
院外	ヒューマリンN注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○		
本採用	ヒューマリンR注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	○	○		
院外	ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	インスリン		○		
本採用	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○		
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/キット	インスリンリス [®] Ⅱ混合製剤-25		○		
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/キット	インスリンリス [®] Ⅱ混合製剤-50		○		
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	インスリンリス [®] Ⅱ(遺伝子組み換え)		○		
院外・ 院内特購	ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	インスリンリス [®] Ⅱ(遺伝子組み換え)	(限定)	○		
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/キット	インスリンリス [®] Ⅱ(遺伝子組み換え)		○		
院外	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ハパ [®] リン類似物質		○	【般】	
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ハパ [®] リン類似物質		○	【般】	
院外	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ハパ [®] リン類似物質		○	【般】	
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/キット	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤		○		
院外	5－F U軟膏5%協和	5g/本	フルオウラシル		○		
院外・ 院内特購	フィアスブ注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパ [®] ルト(遺伝子組み換え)	(限定)	○		
院外・ 院内特購	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位/キット	インスリン アスパ [®] ルト(遺伝子組み換え)	(限定)	○		
院外・ 院内特購	フィアスブ注 ペンフィル	300単位/本	インスリン アスパ [®] ルト(遺伝子組み換え)	(限定)	○		
本採用	フィブラストスプレー500	1個	トファエルミン(遺伝子組換え)	○	○		
院外	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	500g/瓶	フェノール 亜鉛華リニメント		○		
院外	フェルピナクパップ70mg g「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	フェルピ [®] ナク		○		
本採用	フェントステープ0.5mg g	0.5mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩	○	○		
本採用	フェントステープ1mg g	1mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩	○	○		
本採用	フェントステープ2mg g	2mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩	○	○		
本採用	フェントステープ4mg g	4mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩	○	○		
院外	フェントステープ6mg g	6mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩		○		
院外	フェントステープ8mg g	8mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩		○		
本採用	フェントステープ0.5mg g《慢性疼痛》	0.5mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩	○	○		○
本採用	フェントステープ1mg g《慢性疼痛》	1mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩	○	○		○
本採用	フェントステープ2mg g《慢性疼痛》	2mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩	○	○		○
本採用	フェントステープ4mg g《慢性疼痛》	4mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩	○	○		○
院外	フェントステープ6mg g《慢性疼痛》	6mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩		○		○
院外	フェントステープ8mg g《慢性疼痛》	8mg/枚	フェンタニル [®] イン酸塩		○		○
本採用	複方ヨード・グリセリン＊（小堺）	500mL/本	複方ヨード [®] ・グリセリン	○	○		
院外	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	15.75mg/10mL/瓶	ブセレリン酢酸塩			【般】	
本採用	フラジール錠250mg g	250mg	メロキシタ [®] ル	○	○		
本採用	プラスチバックU100	30G×1cc	-	○	○		
本採用	フランドルテープ40mg g	40mg	硝酸イソルビト [®]	○	○	【般】	
本採用	プリビーシー液0.02%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○		
本採用	プリビーシー液0.05%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○		
院外	プリピナ液0.05%	500mL/本	ナファゾリン硝酸塩		○		
院外	【般】フルオシノニド軟膏0.05%	10g/本	フルチゾン [®] プロピオン酸エステル			【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	フルチカゾン [®] 0.1% オキシ酸エステル		○		
院外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	フルチカゾン [®] 0.1% オキシ酸エステル		○		
本採用	フルタイド100ディスクス	100μg/1回噴霧	フルチカゾン [®] 0.1% オキシ酸エステル	○	○		
院外	フルタイド200ディスクス	200μg/1回噴霧	フルチカゾン [®] 0.1% オキシ酸エステル		○		
本採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○		【般】	
院外	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻 液50μg28噴霧用	50μg/1噴霧	フルチカゾン [®] 0.1% オキシ酸エステル			【般】	
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾン [®] 0.1% オ キシ酸エステル50μg・ホモテロールフ マル酸塩水和物5μg	フルチカゾン [®] 0.1% オキシ酸エステル・ホモ テロールフルマル酸塩水和物		○		
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾン [®] 0.1% オ キシ酸エステル125μg・ホモテロール フルマル酸塩水和物5μg	フルチカゾン [®] 0.1% オキシ酸エステル・ホモ テロールフルマル酸塩水和物		○		
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:フルチカゾン [®] 0.1% オ キシ酸エステル125μg・ホモテロール フルマル酸塩水和物5μg	フルチカゾン [®] 0.1% オキシ酸エステル・ホモ テロールフルマル酸塩水和物	○	○		
院外	フルメタクリーム	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】	
院外・ 院内特購	フルメタ軟膏	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル	(限定)	○	【般】	
本採用	フルメトロン点眼液0.02%	5mL/本	フルメトロン	○	○	【般】	
本採用	フルメトロン点眼液0.1%	5mL/本	フルメトロン	○	○	【般】	
院内	ブレグランディン腔坐剤1mg	1mg	ゲメグロスト	○			○
院外・ 院内特購	ブレドニン眼軟膏	5g/本	プロレドニゾロン酢酸エステル	(限定)	○		
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	-	フルオレインナトリウム	○	○		
本採用	プロクトセディル軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○		
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	カルプロニウム塩化物水和物		○		
本採用	プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	アルプロスタシル アルファデクス	○	○		
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タクロリムス水和物		○		
院外・ 院内特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タクロリムス水和物	(限定)	○	【般】	
本採用	プロナック点眼液0.1%	5mL/本	プロムフェナクトリウム水和物	○	○	【般】	
本採用	プロベト	100g/本	白色ワセリン	○	○		
本採用	プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ プロメライン軟膏5万単位／g＊（ジェイド ルフ）」	2mg/mL 45mL/本	プロムヘキシシン塩酸塩	○		【般】	
院外		20g/本	プロメライン		○		
院外・ 院内特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	モキシフロキサシン塩酸塩	(限定)	○		
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セフメゾキシム塩酸塩	○	○		
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セフメゾキシム塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	ミキトド	(限定)	○		
院外	【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5%	5mL/本	ベタキソロール塩酸塩			【般】	
本採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サルブタモール硫酸塩	○	○		
本採用	ベノキシール点眼液0.4%	5mL/本	オキシプロピリン塩酸塩	○	○		
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 「PP」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○		
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日 医工」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○		
本採用	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	25g/本	ヘパリン類似物質クリーム	○	○		
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニブ ロ」	25g/本	ヘパリン類似物質軟膏	○	○		
本採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」	25g/本	ヘパリン類似物質液	○	○		
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医	50g/本	ヘパリン類似物質液		○		
院外・ 院内特購	ベピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○		
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒトロリ ゾン	○		【般】	
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL/本	生体組織接着剤	○			
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL/本	生体組織接着剤	○			
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL/本	生体組織接着剤	○			
院外・ 院内特購	ペンタサ坐剤1g	1g/個	メサリジン	(限定)	○		
院外	ペンタサ注腸1g	1g/100mL/本	メサリジン		○		
本採用	ペンニードルプラス	32G×4mm	-	○	○		
本採用	ホーリンV腔用錠1mg	1mg	エストリオール	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ホクナリンテープ0.5m g	0.5mg/枚	ワロブテロール		○	【般】	
院外	ホクナリンテープ1m g	1mg/枚	ワロブテロール		○	【般】	
院外	ホクナリンテープ2m g	2mg/枚	ワロブテロール		○	【般】	
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	ヒドネフリン	○	○		
本採用	ボビドンヨードガーグル液7%「明治」	30mL/本	ポビドンヨード	○		【般】	
本採用	ボビドンヨードゲル10%「ケンエー」	4 g/本	ポビドンヨードゲル	○	○		
本採用	ボビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	50mL/本	ポビドンヨード	○	○		
本採用	ボビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250mL/本	ポビドンヨード	○	○		
本採用	ボビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	500mL/本	ポビドンヨード	○	○		
本採用	ボラザ g 坐剤	1個	トリハネジド リドカイン	○	○		
院外	ボルタレンサボ12.5m g	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルタレンサボ25m g	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルタレンサボ50m g	50mg	ジクロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルタレンテープ15m g	7枚/包	ジクロフェナクナトリウム		○		
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○		
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○		
院外	マイザークリーム0.05%	5g/本	ジフルプロレートナート		○		
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジフルプロレートナート		○		
院内	マクロゴール400	500mL/本	酸化エチレンと水との縮重合体	○			
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	マキザカルシール・ヘパタマリン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○		
院外	マンジャロ皮下注2.5m g アテオス	2.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○		
院外	マンジャロ皮下注5m g アテオス	5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○		
院外	マンジャロ皮下注7.5m g アテオス	7.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○		
院外	マンジャロ皮下注10m g アテオス	10mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○		○
院外	マンジャロ皮下注12.5m g アテオス	12.5mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○		○
院外	マンジャロ皮下注15m g アテオス	15mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○		○
本採用	ミオコールスプレー0.3m g	0.3mg/本1回噴霧	ニコチンリセリン	○	○		
本採用	ミケラン L A 点眼液2%	2.5mL/本	カルテオール塩酸塩	○	○	【般】	
院外	ミケルナ配合点眼液	2.5mL	カルテオール塩酸塩・タナノロスト		○		
本採用	ミドリン M 点眼液0.4%	5mL/本	トロピカミド	○	○		
院外	ミドリン P 点眼液	5mL/本	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩		○		
本採用	ミドレフリン P 点眼液	5mL/本	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	○	○		
院外	ミルタックスパップ30m g	7枚/包	ケトプロフェン		○		
院内	ミレーナ52m g	52mg/個	レボノルゲステル	○			
本採用	ムコスタ点眼液U D 2%	20mg/mL 0.35mL/本	レバニド	○	○		
本採用	ムコフィリン吸入液20%	2mL/包	アセチルステインナトリウム塩	○	○		
本採用	無水エタノール「マルイシ」	500mL/本	エタノール	○	○		
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	【般】	
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	【般】	
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○		
院外	メノエイドコンビパッチ	エストラジール0.62mg・酢酸ノルエチステロン2.70mq	エストラジール・酢酸ノルエチステロン		○		
本採用	メブチンエアー10μ g 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピフェロール塩酸塩水和物	○	○		
院外	メブチンキッドエアー5μ g 吸入100回	5μg/1回噴霧	プロピフェロール塩酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	メブチンスイングヘラー10μ g 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピフェロール塩酸塩水和物	(限定)	○		
本採用	メブチン吸入液ユニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	プロピフェロール塩酸塩水和物	○	○		
院外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	ジファミラスト軟膏		○		
院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ジファミラスト軟膏		○		
院外	モーラステープ20m g	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】	
院外	モーラステープ L 40m g	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】	
院外	モーラスパップ30m g	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】	
本採用	モーラスパップXR120m g	7枚/包	ケトプロフェン	○	○		
院外	モーラスパップXR240m g	7枚/包	ケトプロフェン		○		
本採用	ユーバスタ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ポビドンヨード	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ユベラ軟膏	56g/本	トコフェロール・ビタミンA油	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ライソデグ配合注 フレックスタッチ	インスリンデグレート210単位/3mL インスリンアスパルト90単位	インスリンデグレート インスリンアスパルト	(限定)	○		
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	タナノロスト	○		【般】	
特購	ラバリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シロリムスゲル	(限定)	(限定)		
院外	ラミシールクリーム1%	10g/本	テルビナフィン塩酸塩		○	【般】	
本採用	ランタスXR注ソロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリングルキニン	○	○		
院外	ランタス注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリングルキニン		○		
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トラコラスト		○	【般】	
院外	リズモン T g 点眼液0.5%	2.5mL/本	フェニルメレイン酸塩		○		
特購	リティンバ耳科用250μ g セット	250μg/セット	トコフェリン(遺伝子組換え)	(限定)			

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	リドカインテープ18m g「NP」	(18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○		
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	ﾌﾞﾚﾄﾞﾞﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾝｸﾞ草酸エステル		○		
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	ﾌﾞﾚﾄﾞﾞﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾝｸﾞ草酸エステル		○		
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	ﾌﾞﾚﾄﾞﾞﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾝｸﾞ草酸エステル		○	【般】	
院外・ 院内特購	リバスタッチパッチ4.5m g	4.5mg/枚	ﾘﾊﾞｽﾁｬﾐﾝ	(限定)	○		
院外	リバスタッチパッチ9m g	9mg/枚	ﾘﾊﾞｽﾁｬﾐﾝ		○		
院外	リバスタッチパッチ13.5m g	13.5mg/枚	ﾘﾊﾞｽﾁｬﾐﾝ		○		
院外	リバスタッチパッチ18m g	18mg/枚	ﾘﾊﾞｽﾁｬﾐﾝ		○		
本採用	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	ﾘﾎﾞｶﾞﾞｽﾁﾝ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	リボスチン点鼻液0.025m g 112噴霧用	0.025mg	ﾘﾎﾞｶﾞﾞｽﾁﾝ塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	ｱﾄﾋﾞﾝ硫酸塩水和物	(限定)	○		
院外	リレンザ	5mg/ﾌﾞﾘｽﾀｰ	ｻﾞﾅﾐﾋﾞﾙ水和物		○		
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ﾍﾞﾀﾒﾀﾞﾐﾝリン酸エステルナトリウム・ﾌﾗ ｼﾞｵﾐﾝ硫酸塩		○		
院外	リンデロンーD Pクリーム	5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀﾞﾐﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸エステル		○	【般】	
本採用	リンデロンーD P軟膏	5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀﾞﾐﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸エステル	○	○	【般】	
院外	リンデロンーVGローション	10mL/本	ﾍﾞﾀﾒﾀﾞﾐﾝ吉草酸エステル・ｹﾞﾝﾀﾏ ｲﾝ硫酸塩		○		
本採用	リンデロンーVG軟膏0.12%	5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀﾞﾐﾝ吉草酸エステル・ｹﾞﾝﾀﾏ ｲﾝ硫酸塩	○	○		
本採用	リンデロンーVクリーム0.12%	5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀﾞﾐﾝ吉草酸エステル	○	○	【般】	
本採用	リンデロンーV軟膏0.12%	5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀﾞﾐﾝ吉草酸エステル	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	リンデロン坐剤0.5m g	0.5mg/個		(限定)	○		
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ﾍﾞﾀﾒﾀﾞﾐﾝリン酸エステルナトリウム		○	【般】	
院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g 80g/本	ｲｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙｹﾞﾙ		○		
院外	ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ﾙｺﾅｯｸｰﾙ		○		
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ﾋﾞﾏﾄﾌﾟﾛｽﾄ		○		
院外	ルムジェブ注カート	300単位/本	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟｵ		○		○
本採用	ルムジェブ注ミリオペン	300単位/本	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟｵ	○	○		
院外・ 院内特購	ルムジェブ注100単位／mL	100単位/1mL 10mL/ 本	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟｵ	(限定)	○		
本採用	ルリコンクリーム1%	10mg/g 10g/本	ﾙﾘｺﾅｰﾙ	○	○		
院外	ルリコン液1%	10mg/mL 10mL/本	ﾙﾘｺﾅｰﾙ		○		
院外・ 院内特購	レクタブル2m g 注腸フォーム14回	48mg・30.8g/瓶	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ注腸剤	(限定)	○		
院外	レスキュア点眼液0.12%	5mL/本	ｲｯﾌﾟﾋﾟｵﾙﾌﾞﾌﾟﾛｽﾄﾝ		○	【般】	
本採用	レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ｼﾞﾌｧﾋﾞﾄﾞﾗﾐﾝ	○	○		
院外・ 院内特購	レバタン坐剤0.2m g	0.2mg	ﾌﾟﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ塩酸塩	(限定)	○		
本採用	レベミル注 フレックスペン	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞﾏﾐﾙ	○	○		
特購	レベミル注 ペンフィル	300単位/筒	ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞﾏﾐﾙ	(限定)	(限定)		
本採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15mg/mL 5mL/本	ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物	○	○		
本採用	レルベア100エリプタ14吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ﾋﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙ25 μg・ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾞﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸E ｽﾃﾙ100μg	ﾋﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙﾄﾘﾌｧﾈﾙ酢酸塩・ﾌﾙ ﾁｶﾞﾝﾌﾞﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸エステル	○	○		
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ﾋﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙ25 μg・ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾞﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸E ｽﾃﾙ100μg	ﾋﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙﾄﾘﾌｧﾈﾙ酢酸塩・ﾌﾙ ﾁｶﾞﾝﾌﾞﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸エステル		○		
本採用	レルベア200エリプタ14吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ﾋﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙ25 μg・ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾞﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸E ｽﾃﾙ200μg	ﾋﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙﾄﾘﾌｧﾈﾙ酢酸塩・ﾌﾙ ﾁｶﾞﾝﾌﾞﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸エステル	○	○		
院外	レルベア200エリプタ30吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ﾋﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙ25 μg・ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾞﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸E ｽﾃﾙ200μg	ﾋﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙﾄﾘﾌｧﾈﾙ酢酸塩・ﾌﾙ ﾁｶﾞﾝﾌﾞﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸エステル		○		
本採用	ロードーズU100	30G×1/2cc	-	○	○		
本採用	ロードーズU100	30G×3/10cc	-	○	○		
本採用	ロキシニンゲル1%	10mg/g	ｵｷｼﾌﾟｵﾌｧﾅﾄﾘｳﾐ水和物	○	○	【般】	
院外	ロキシニンテープ50m g	50mg/枚	ｵｷｼﾌﾟｵﾌｧﾅﾄﾘｳﾐ水和物		○		
院外	ロキシニンテープ100m g	100mg/枚	ｵｷｼﾌﾟｵﾌｧﾅﾄﾘｳﾐ水和物		○		
院外	ロキシニンパップ100m g	7枚/包	ｵｷｼﾌﾟｵﾌｧﾅﾄﾘｳﾐ水和物		○		
本採用	ロキソプロフェンNaテープ50m g「科研」	50mg/枚	ｵｷｼﾌﾟｵﾌｧﾅﾄﾘｳﾐ水和物	○	○		
院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100m g「タイホウ」	7枚/包	ｵｷｼﾌﾟｵﾌｧﾅﾄﾘｳﾐ水和物		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	7枚/包	ロキソ [®] プロフェンナトリウム水和物	○	○		
院外	ロコアテープ	40mg/枚	エスフルビ [®] プロフェン・ハッカ油		○		
本採用	ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ヒド [®] ロコルチゾン酪酸エステル	○	○		
本採用	ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ヒド [®] ロコルチゾン酪酸エステル	○	○		
特購	ロゼックスゲル0.75%	0.75%/g×50g	メトロニタ [®] ゾールゲル	(限定)	(限定)		
本採用	ロナセンテープ20mg	20mg/枚	ブ [®] ロナンセリン	○	○		
本採用	ワコピタル坐剤30	30mg	フェノバ [®] ルピタルナトリウム	○	○		