

八千代医療センター採用医薬品集（外用・自己注射）

2026年1月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの (限定)：処方可能な患者が限定されているもの

(限定)：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：252品目 院外採用：330品目 (特別購入薬：60品目)

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院内	アイオピジンUD点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	アプロカルニジン塩酸塩	○		
院内	アイノフロー吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ガス	○		
本採用	アイファガン点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ブリモニジン酒石酸塩	○	○	
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本	ブリモニジン・ブリンゾラミド		○	
院外・院内特購	アワイクリ注 フレックスタッフ 総量300単位	300単位/キット	インスリン イコデケ（遺伝子組換え）	(限定)	○	
本採用	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	50g/瓶	酸化亜鉛	○	○	
院外	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	500g/瓶	酸化亜鉛		○	○
院外	アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	ナジフロキサシン		○	【般】
本採用	アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	ナジフロキサシン	○	○	
本採用	アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ブクラテシナトリウム	○	○	
院外・院内特購	アジマイシン点眼液1%	1%1mL 2.5mL/本	アジスロマイシン水和物	(限定)	○	
院外	アストット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ラノコナゾール		○	
院外	アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○	
本採用	アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ジメチルイソロピルアズレン	○	○	
本採用	アスプール液(0.5%)	5mg/mL 50mL/本	dl-イソロピルアズレン塩酸塩	○	○	
院外	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸	200μg/吸入	モメタリソフランカルボン酸エステル		○	
院外	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○	
本採用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	100mg/個	アセトアミノフェン100mg坐剤	○		【般】
院内	アセサイド6%消毒液OEM-2	第一剤:750mL 第二剤:750mL	過酢酸	○		
院内	アセサイド6%消毒液OEM-3	第一剤:875mL 第二剤:875mL	過酢酸	○		
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	ブリンゾラミド・チモールマレイン酸塩		○	
院外	アテキュラ吸入用カプセル低用量	1カプセル中：インダカロール酢酸塩173μg（インダカロールとして150μg）・モメタリソフランカルボン酸エステルカプセル	インダカロール酢酸塩・モメタリソフランカルボン酸エステルカプセル		○	
院外	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル中：インダカロール酢酸塩173μg（インダカロールとして150μg）・モメタリソフランカルボン酸エステルカプセル	インダカロール酢酸塩・モメタリソフランカルボン酸エステルカプセル		○	
院外	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル中：インダカロール酢酸塩173μg（インダカロールとして150μg）・モメタリソフランカルボン酸エステルカプセル	インダカロール酢酸塩・モメタリソフランカルボン酸エステルカプセル		○	
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	1噴霧中:サルメテロールキナホ酸塩・フルカジンプロピオニ酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/50μg	サルメテロールキナホ酸塩・フルカジンプロピオニ酸エステル		○	
院外・院内特購	アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中:サルメテロールキナホ酸塩・フルカジンプロピオニ酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/125μg	サルメテロールキナホ酸塩・フルカジンプロピオニ酸エステル	(限定)	○	
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中:サルメテロールキナホ酸塩・フルカジンプロピオニ酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/250μg	サルメテロールキナホ酸塩・フルカジンプロピオニ酸エステル		○	
本採用	アドエア100ディスカス28吸入用	1アブリスター中:サルメテロールキナホ酸塩・フルカジンプロピオニ酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/100μg	サルメテロールキナホ酸塩・フルカジンプロピオニ酸エステル	○	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	アドエア100ディスカス60吸入用	1アリスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルカゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/100μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルカゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル		○	
本採用	アドエア250ディスカス28吸入用	1アリスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルカゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルカゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル	○	○	
院外	アドエア250ディスカス60吸入用	1アリスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルカゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルカゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル		○	
院外	アドエア500ディスカス28吸入用	1アリスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルカゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルカゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル		○	
院外	アドエア500ディスカス60吸入用	1アリスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルカゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルカゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル		○	
院外	アドフィードパップ40m g	40mg/枚 7枚/包	フルビ [®] ロフェン		○	
本採用	日点アトロピン点眼液1%	5mL/本	アトロピン硫酸塩水和物	○	○	
院外	アトロベントエロソル20μ g	20μg/1噴霧	イプロトロピウム臭化物水和物		○	
院外	アニュイティ100μ g エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エストラル吸入剤		○	
院外	アニュイティ200μ g エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エストラル吸入剤		○	
院外	アノーロエリプタ30吸入用	1アリスター中:ウメクリジニウム62.5μg・ビランテロール25μg	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
院外	アピドラ注100単位／mL	1000単位/10mL/V	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)		○	
院外・院内特購	アピドラ注カート	1000単位/10mL/V	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院外・院内特購	アピドラ注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院外	アフタッヂ口腔用貼付剤25μ g	0.025mg	トリアムシロニアセトド [®]		○	
本採用	アラセナ－A軟膏3%	30mg/g 5g/本	ビダラビン	○	○	【般】
院外	アラミスト点鼻液27.5μ g 56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】
院外	アラミスト点鼻液27.5μ g 120噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】
院外	アリケイス吸入液590m g	590mg/8.4mL/瓶	アミカシン硫酸塩		○	
院外	アリドネパッチ27.5m g	27.5mg/枚	ドネペジル		○	
院外	アリドネパッチ55m g	55mg/枚	ドネペジル		○	
本採用	アルメタ軟膏	1mg/g 5g/本	アルクロメタリゾン [®] ロピ [®] オン酸エステル	○	○	
院外	アレサガテーブ4m g	4mg/枚 (2.23cm×3.61cm)	エメダスチンフル酸塩貼付剤		○	
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	5mg/q	ヒナスチン塩酸塩クリーム		○	
院外	アレジオン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ヒナスチン塩酸塩		○	
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ヒナスチン塩酸塩		○	
院外	アレバール吸入用溶解液0.125%	100mL/本	チロキサポール(サペリノン)		○	
本採用	アンテベートクリーム0.05%	0.5mg/g 5g/本	ベタメタゾン酢酸エステル [®] ロピ [®] オン酸エステル	○	○	
院外	アンテベートローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	ベタメタゾン酢酸エステル [®] ロピ [®] オン酸エステル		○	
本採用	アンテベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ベタメタゾン酢酸エステル [®] ロピ [®] オン酸エステル	○	○	
院外	アンヒバ坐剤小児用50m g	50mg	アセトアミノフェン		○	【般】
院外	アンヒバ坐剤小児用100m g	100mg	アセトアミノフェン		○	【般】
院外	アンヒバ坐剤小児用200m g	200mg	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	アンペック坐剤10m g	10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
院外	アンペック坐剤20m g	20mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○	
院外	【般】イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg	300mg	イソコナゾール硝酸塩			【般】
本採用	イソジンシュガーパスタ軟膏	100g/本	精製白糖 ポビドンヨード [®]	○	○	【般】
本採用	イナビル吸入粉末剤20m g	20mg/キット(水和物として20.76mg)	ラニミビルオクタン酸エステル	○	○	
院外	イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	スマトリ [®] タン		○	
院外	インスリン アスパルトBS注100単位／mL NR「サノフィ」	100単位/1mL 10mL/V	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○	
院外	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	300単位/筒	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○	
院外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位/キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位/筒	インスリン グラルギン	(限定)	○	
本採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/キット	インスリン グラルギン	○	○	
院外	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	100単位/1mL、10mL/瓶	インスリン リスプロ		○	
本採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位/3mL/キット	インスリン リスプロ	○	○	
院外	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位/筒	インスリン リスプロ		○	
本採用	インターラー吸入液1%	20mg/2mL/A	クロモグリカ酸ナトリウム	○	○	
院外	インテバンクリーム1%	1%/1g	インドメタシン		○	
院外	インテバン坐剤25	25mg	インドメタシン		○	
院内	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	クロルヘキシジングルコン酸塩	○		
院内	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	○		
院外	ウゴービ皮下注0.25mg SD	0.25mg/0.5mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換)		○	○
院外	ウゴービ皮下注0.5mg SD	0.5mg/0.5mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換)		○	○
院外	ウゴービ皮下注1.0mg SD	1mg/0.5mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換)		○	○
院外	ウゴービ皮下注1.7mg SD	1.7mg/0.75mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換)		○	○
院外	ウルティブロ吸入用カプセル	1Cp中:グリコピロニウム50μg・イダカロール110μg	グリコピロニウム臭化物・イダカロールマレイン酸塩		○	
院外	ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○	
本採用	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3%	90g/3000mL/B	D-ツルヒートル	○	○	
本採用	エイズプロ懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ブリソラミド	○	○	
本採用	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○		【般】
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/	オミデネバグ イソプロピル液		○	
本採用	エキザルベ	混合死菌浮遊液 0.166mL(大腸菌死菌:約1.5億個・ブドウ球菌死菌:約1.5億個・レンサ球菌死菌:約0.15億個・緑膿菌死菌:約0.15億個を含有)・ヒドロキルエタノン	混合死菌浮遊液・ヒドロキルエタノン	○	○	
本採用	エクラーブラスター20μg/cm2	7.5cm×10cm	デプロドンプロピオ酸エスル	○	○	
院外	エクリラ400μg ジェヌエア60吸入用	400μg/回	アクリジニウム臭化物		○	
院外・院内特購	エコリシン眼軟膏	3.5g/本	エリスロマイシンラクトビオ酸塩・コリスチンメタスルホン酸ナトリウム軟膏	(限定)	○	
院外・院内特購	エスクレ坐剤「250」	250mg	抱水クロラール	(限定)	○	
院外	エスクレ坐剤「500」	500mg	抱水クロラール		○	
本採用	エスクレ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水クロラール	○	○	
院外	エストラーナテープ0.18mg	0.18mg/枚	エストラジオール		○	
院外	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚	エストラジオール		○	
院外	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジオール		○	
本採用	S Pトローチ0.25mg「明治」	0.25mg	デカリニウム塩化物	○	○	
本採用	エタノール	500mL(15℃で95.1~96.9vol%を含む)	エタノール	○	○	
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル中;イダカロールマレイン酸塩173μg(イダカロールとして150μg)・グリコピロニウム臭化物63μg(グリコピロニウムとして50μg)・メタリソフランカルボン酸エスル80	イダカロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物・メタリソフランカルボン酸エスル		○	
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル中;イダカロールマレイン酸塩173μg(イダカロールとして150μg)・グリコピロニウム臭化物63μg(グリコピロニウムとして50μg)・メタリソフランカルボン酸エスル	イダカロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物・メタリソフランカルボン酸エスル		○	
院外	エヌジェンラ皮下注24mg ベン	24mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン(遺伝子組換)		○	
院外	エヌジェンラ皮下注60mg ベン	60mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン(遺伝子組換)		○	
院外	エビデュオゲル	15g/本	アダパレン・過酸化ベンゾイルゲル		○	
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸バリウム	○	○	
本採用	M S温シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	○	○	
本採用	M S冷シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・l-メントール	○	○	
本採用	エムラクリーム	リドカイン25mg・プロピトカイン25mg/g 5g/本	リドカイン・プロピトカイン	○	○	
院外	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾンシハシル酸エスル		○	
院外	エンクラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	エンペシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール		○	【般】
院外	オイラックスHクリーム	クロタミン100mg・ヒドロコルチゾン2.5mg/g 5g/本	クロタミン・ヒドロコルチゾン		○	
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	クロタミン	○	○	
院外	オーキシス9μg タービュヘイラ-60吸入	9μg/吸入	ホルモテロールフル酸塩水和物		○	
院外	オキサロールローション25μg / g	25μg/g 10g/本	マキサカルシール		○	
院外	オキサロール軟膏25μg / g	25μg/g 10g/本	マキサカルシール		○	【般】
本採用	オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩腔錠	○	【般】	
院内	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○		
院外・院内特購	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	アバロパラチド酢酸塩注射液	(限定)	○	
本採用	オスバン消毒液10%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○	
本採用	オゼックス点眼液0.3%	0.3%/mL	トスフロキサシントシリ酸塩水和物点眼液	○	○	
本採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg/本	セマグリトド (遺伝子組み換え) キット	○	○	
院内	オベガードM A眼灌流液	ノドウ糖1.5mg・塩化ナトリウム6.6mg・塩化カリウム0.36mg・塩化カルシウム水和物0.18mg・硫酸マグネシウム水和物0.3mg・炭酸水素ナトリウム2.1mg/ml	ノドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マグネシウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○		
院内	オベガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
院内	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
院外	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	ドミフェン臭化物		○	
院内	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	オラネジングルコン酸	○		
院外	オラビ錠口腔用50mg	50mg/錠	ミコナゾール		○	
本採用	オリブ油「ヨシダ」	25mL/本〔滅菌済〕	オリブ油	○	○	
院外	オルセノン軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トレチノイドコフェリル		○	
本採用	オルベスコ200μg インヘラ-56吸入用	200μg/1噴霧	シクレニド	○	○	
院外	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg	イタドロールマレイン酸塩		○	
院外	ガチロ点眼液0.3%	5mL/本	ガチロヰシ水和物		○	○
本採用	カデックス軟膏分包45mg	45mg/5g/包	ヨウ素軟膏	○	○	
院外	カラミンローション * (丸石)	カラミン8g・酸化亜鉛8g/100mL 500mL/本	カラミン・酸化亜鉛		○	
本採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参	0.05mg/mL 5mL/本	ピレノキシン	○	○	
院外	キサラタン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	ラタノプロスト		○	【般】
本採用	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	リドカイン塩酸塩	○	○	
院外	キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	リドカイン塩酸塩		○	
本採用	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	リドカイン	○	○	
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	リドカイン塩酸塩	○	○	
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	リドカイン塩酸塩	○	○	
本採用	キュバール100エアゾール	100μg/1噴霧	ベタメタゾンプロピオ酸エチル	○	○	
院外	強力ポステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン		○	【般】
本採用	強力レスタンコーチゾンコーウ軟膏	10g/本	ヒドロコルチゾン酢酸エチル・フランオマシン硫酸塩・ジフェニヒドラン塩	○	○	【般】
院外	グラアルファ配合点眼液	5mL/本	リバシジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩		○	
院外・院内特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リバシジル塩酸塩水和物	(限定)	○	
院外	クラビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	レボフロヰシ水和物		○	
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 30mL/個	グリセリン	○	○	
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 60mL/個	グリセリン	○		【般】
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 120mL/個	グリセリン	○	○	
本採用	グリセリン「ケンエー」	25mL/本(84.0~87.0%を含む) (滅菌済)	グリセリン	○	○	
本採用	グリセリンB C液「ヨシダ」	250mL/瓶(84.0~87.0%を含む)	0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン	○	○	
院外	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル		○	【般】
院外・院内特購	クレナфин爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	エフィコナゾール	(限定)	○	
院外	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール		○	【般】
院外	【般】クロトリマゾール腔錠100mg	100mg	クロトリマゾール			【般】
本採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	【般】
院外・院内特購	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	(限定)	○	【般】
本採用	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	0.05%1g10g	クロベタゾン酪酸エステル	○	○	【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	クロマイ- P 軟膏	クロラムフェニコール20mg・フランジオマイシン硫酸塩5mg・プロドニゾロン3mg/a 25g/本	クロラムフェニコール・フランジオマイシン硫酸塩・プロドニゾロン	○	【般】	
院外	クロマイ腔錠100mg	100mg	クロラムフェニコール	○		
本採用	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	100mg/錠	クロラムフェニコール	○	○	
本採用	ゲーベンクリーム 1 %	10mg/g	スルファジアジン銀	○	○	
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール	○		【般】
本採用	ケトチフェン点眼液0.05%「SW」	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェンマル酸塩	○		【般】
本採用	ケトプロフェンテーブ20mg「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	○		【般】
院外	ケラチナミンコーウクリーム20%	200mg/g 25g/本	尿素			【般】
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○		
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○		【般】
院外・院内特購	コソプト配合点眼液	トルソラミド 10mg・チモール 5mg/mL 5mL/本	トルソラミド 塩酸塩・チモールマレイン酸塩	(限定)	○	
院外	コソプトミニ配合点眼液	トルソラミド 10mg・チモール 5mg/mL 0.4mL/本	トルソラミド 塩酸塩・チモールマレイン酸塩		○	
本採用	コレクチム軟膏0.25%	2.5mg/g 5g/本	デルゴチニブ	○	○	
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	デルゴチニブ		○	
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ビタミンA油		○	
本採用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V	肺サーファクタント製剤	○	○	
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロポントラート塩酸塩	○	○	
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェンマル酸塩		○	【般】
本採用	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	ケトチフェンマル酸塩	○	○	【般】
院内	サニサーラW	250mL/本	イタノール	○		
院内	サニサーラW	60mL/本	イタノール	○		
院外	サラゾピリン坐剤500mg	500mg/個	サラゾスルファピリジン		○	
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセリン 900mg/q	サリチル酸ワセリン		○	
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤		○	
院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg/カプセル	ベクロメタリソプロピオノ酸エチル		○	
本採用	サルタノールインヘラ-100μg	100μg/1回噴霧	サルタノール硫酸塩	○	○	
院外	サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノコバラミン		○	【般】
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ビロカルビン塩酸塩		○	
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ビロカルビン塩酸塩	○	○	
本採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ベタメタゾンリン酸エチルナトリウム	○	○	【般】
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ホビドンゾード	○	○	
本採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバラミン液	○	○	
院外	シーブリ吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリコリコニウム臭化物		○	
本採用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エチルナトリウム液	○	○	
院外	ジケアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジケアホリナトリウム		○	
院外	ジケアスLX点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジケアホリナトリウム		○	
本採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナケナトリウム	○	○	
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジクロフェナケナトリウム		○	
本採用	ジクロフェナケナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	12.5mg	ジクロフェナケナトリウム	○	○	
本採用	ジクロフェナケナトリウム坐剤25mg「日医	25mg	ジクロフェナケナトリウム	○	○	
本採用	ジクロフェナケナトリウム坐剤50mg「日医	50mg	ジクロフェナケナトリウム	○	○	
特購	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶	ジメチルスルホキド液	(限定)	(限定)	
本採用	シムビコートタービュヘイラ-60吸入	ブデソド160μg・ホルモローフマル酸塩水和物4.5μg/	ブデソド・ホルモローフマル酸塩水和物	○	○	
本採用	消毒用エタノール「ケンエー」	500mL/本	イタノール	○	○	
院外	小児用レルベア50エリプタ30吸入用	17リスター-中:ビランテロール25μg・フルチカゾンフランカルボン酸Iステル50μg	ビランテロールトリエニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エチル吸入剤		○	
院外	ジルダザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ベンダザック		○	
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ酸・無機塩類配合剤液		○	
本採用	ジンジカイングル20%	30g/本	アミノ安息香酸エチル液	○	○	
院外	親水クリーム「ホエイ」	-	親水クリーム		○	
本採用	シンボニー皮下注50mg オートインジェク	50mg/0.5mL/キット	コリムマブ(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	○	○	
本採用	スープレン吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	デスフルラン	○	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	スコピゾル眼科用液	ヒドロキシエチルセルロース15mg・塩化ナトリウム5.5mg・塩化カリウム1.6mg・乾燥炭酸ナトリウム0.6mg・リン酸水素ナトリウム水和物1.8mg・杓酸12mg 15mL/本	ヒドロキシエチルセルロース・塩化ナトリウム・塩化カリウム・乾燥炭酸ナトリウム・リン酸水素ナトリウム水和物・杓酸	○	○	
院外	スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	イソプロフェンヒドロキノール		○	
本採用	スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	イソプロフェンヒドロキノール	○	○	
本採用	ステリクロンRエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール	○	○	
院外	ステリクロンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩		○	
本採用	ステリクロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	
院外・院内特購	ステロネマ注腸3mg	3mg(リン酸エステルナトリウムとして3.95mg) 100mL/個	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		○	
本採用	スピオルトレスピマット60吸入	1噴霧中チオトロピウム2.5μg 及び和ガテロール2.5μg	チオトロピウム臭化物水和物・和ガテロール塩酸塩	○	○	
院外	スピール膏M	357g/m2 25cm2/枚	サリチル酸		○	
院外・院内特購	スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	(限定)	○	【般】
本採用	スピリーバ2.5μg レスピマット60吸入	2.5μg/噴霧	チオトロピウム臭化物水和物	○	○	
院外・院内特購	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/Cp 7Cp/シート	チオトロピウム臭化物水和物	(限定)	○	
院外・院内特購	スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	フェノトリン	(限定)	○	
院外	ゼビアックスローション2%	10g/本	オゼノキサシン		○	
院外	ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	リナフタート		○	
院外	ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	リナフタート		○	
本採用	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	250mg/250mL/B	セボフルラン	○	○	
院外	セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	フェルビナク		○	【般】
院外	セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	フェルビナク		○	【般】
院外	セレベント50ディスカス	50μg/1アリストー60アリストー/個	サルメロールキナホ酸塩		○	
本採用	ゾビラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	アシクロビル	○	○	
院外	ゾビラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	アシクロビル		○	
本採用	ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	フルジオマイシン硫酸塩	○	○	
院外	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	5mg/筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	○
院外	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	10mg/筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	○
院外・院内特購	ソリクア配合注ソロスター	1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤キット	(限定)	○	
本採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッフ	1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット	○	○	
本採用	ソルベース	500g/瓶	マクロゴール400 マクロゴール4000	○	○	
本採用	ダイアップ坐剤4	4mg	ジアセパム	○	○	
本採用	ダイアップ坐剤6	6mg	ジアセパム	○	○	
本採用	ダイアップ坐剤10	10mg	ジアセパム	○	○	
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリケン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン2.1mg/1cm2 [4.8cm×4.8cm/枚 (ハーフサイズ) 1	生体組織接着剤	○		
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリケン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン2.1mg/1cm2 [9.5cm×4.8cm/枚 (レギュラーサイズ) 1	生体組織接着剤	○		
院外	タブコム配合点眼液	2.5mL/本	タフルプロスト・チモールマレイン酸		○	
院外	タプロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	タフルプロスト		○	
院外	タプロスミニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	タフルプロスト		○	
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	オロキサシン	○	○	
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	オロキサシン	○	○	
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	タクリムス水和物		○	
本採用	チモブトールX E点眼液0.5%	2.5mL/A	チモールマレイン酸塩	○	○	【般】
院外	ツムラ紫雲膏	500g×1瓶	紫雲膏		○	
本採用	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	0.5mg/枚	ツロブテロール	○		【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ツロブテロールテープ1m g「久光」	1mg/枚	ツロブテロール	○		【般】
本採用	ツロブテロールテープ2m g「久光」	2mg/枚	ツロブテロール	○		【般】
院内	ディスオーパ消毒液0.55%	3.8L/本	フタラル	○		
院外	ディビゲル1m g	1mg	エストラジオール		○	
院外・院内特購	ディフェリングル0.1%	15g/本	アダパレン	(限定)	○	
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	デキサメタゾン	○		【般】
本採用	デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリン	2.5μg/1回噴霧	デスマブレシン酢酸塩水和物	○	○	
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ブナリシン塩酸塩		○	
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エビジビドロコレステリン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○	
院外	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリ酸エヌル水和物10mg・過酸化ベンゾイル30mg/g 10g/本	クリンダマイシンリ酸エヌル水和物・過酸化ベンゾイル		○	
院外	デュオトラバ配合点眼液	トロボプロスト40μg・チモールマレイン酸塩5mg	トロボプロスト・チモールマレイン酸塩		○	
院外	デュロテップM Tパッチ2.1m g	2.1mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ4.2m g	4.2mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ8.4m g	8.4mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ16.8m g	16.8mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ2.1m g《慢性疼	2.1mg/枚	フェンタニル		○	○
院外	デュロテップM Tパッチ4.2m g《慢性疼	4.2mg/枚	フェンタニル		○	○
院外	デュロテップM Tパッチ8.4m g《慢性疼	8.4mg/枚	フェンタニル		○	○
院外	デュロテップM Tパッチ16.8m g《慢性疼	16.8mg/枚	フェンタニル		○	○
本採用	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	25g/本	オキシトライクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	○	○	
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリチルチン酸		○	
本採用	デルモゾールgローション	10mL/本	ベタメタゾン吉草酸エヌル・ケンタマイシン硫酸塩	○	○	
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	クロベタリーアルブロビン酸エヌル		○	【般】
本採用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エヌル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
院外	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エヌル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
本採用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エヌル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エヌル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
院外・院内特購	テレミンソフト坐薬2m g	2mg	ビサコジル	(限定)	○	
本採用	テレミンソフト坐薬10m g	10mg	ビサコジル	○	○	
院外・院内特購	トービイ吸入液300m g	300mg/5mL/管	トブライマイシン	(限定)	○	
院外	トブシムクリーム0.05%	10g/本	フルオシノド		○	【般】
本採用	トブシムローション0.05%	10g/本	フルオシノド	○	○	
院外	トブシム軟膏0.05%	10g/本	フルオシノド		○	
院外・院内特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブライマイシン	(限定)	○	
院外	ドボネックス軟膏50μg/g	10g/本	カルシボトリオール		○	
院外	ドボベットゲル	15g/本	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジブロピオノ酸エヌル		○	
院外	ドボベット軟膏	カルシボトリオール50.0μg・ベタメタゾンジブロビン酸エヌル 0.643mg/g 15g/本	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジブロビン酸エヌル		○	
院外	ドボベット軟膏	カルシボトリオール50.0μg・ベタメタゾンジブロビン酸エヌル 0.643mg/g 30g/本	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジブロビン酸エヌル		○	
院外	ドボベットフォーム	60g/本	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジブロピオノ酸エヌル		○	
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トロボプロスト		○	
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルソルミド塩酸塩		○	
本採用	トルリシティ皮下注0.75m g アテオス	0.75mg/0.5mL/キット	デュラグリチド	○	○	
本採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位/筒	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	○	○	
院外・院内特購	トレシーバ注 ベンフィル	300単位/筒	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	(限定)	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万	10000単位	トロンビン	○	○	
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	ドンペリドン	○	○	【般】
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	ドンペリドン	○	○	【般】
院外	ナウゼリン坐剤60	60mg	ドンペリドン		○	
院外	ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用	50μg/噴霧	メタリソフランカルボン酸エチル水和		○	
本採用	ナノパスニードルⅡ	34G×4mm	-	○	○	
院外	ナパグルンローション3%	50mL/本	フェリビナク		○	
院外	ナパグルン軟膏3%	25g/本	フェリビナク		○	
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2 /枚	ニコチン		○	
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /枚	ニコチン		○	
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /枚	ニコチン		○	
院外	ニゾラールクリーム2%	10g/本	ケトコナゾール		○	【般】
院外	ニゾラールローション2%	10g/本	ケトコナゾール		○	【般】
院外	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」	27mg/9.6cm2/枚	ニトログリセリン貼付剤		○	
本採用	ニトロダームT T S 25mg	25mg/枚	ニトログリセリン	○	○	
院外	ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ニプラジロール		○	
院外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg/枚	ロコチジン		○	
院外・院内特購	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚	ロコチジン	(限定)	○	
本採用	ニュープロパッチ9mg	9mg/枚	ロコチジン	○	○	
院外・院内特購	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg/枚	ロコチジン	(限定)	○	
院外・院内特購	ニュープロパッチ18mg	18mg/枚	ロコチジン	(限定)	○	
院外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚	オキシブチニン塩酸塩		○	
本採用	ネオシネジンコーウ5%点眼液	10mL/本	フェニレフリン塩酸塩	○	○	
本採用	ネオステリングリーンうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○	
本採用	ネオメドロールE E軟膏	3g/本	フライオマシン硫酸塩・メルアロレドニゾロン	○	○	
院内	ネキソブリッド外用ゲル5g	5g/瓶(混合用ゲル付)	パノキシップル茎搾汁精製物	○		
院外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ネバフェナク		○	
院外・院内特購	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○	
院外	ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン		○	
院外	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト		○	
本採用	ノボラピッド注 フレックスタッチ	300単位/3mL	インスリン アスパルト	○	○	
院外・院内特購	ノボラピッド注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○	
院外・院内特購	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○	
本採用	ノボラピッド注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト	○	○	
院外・院内特購	ノボリン30R注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○	
本採用	ノボリンN注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○	
院外・院内特購	ノボリンR注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○	
院外・院内特購	ノボリンR注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○	
院外	ノルスパンテープ5mg	5mg/枚	ブプロレルфин		○	○
院外・院内特購	ノルスパンテープ10mg	10mg/枚	ブプロレルфин	(限定)	○	○
院外	ノルスパンテープ20mg	20mg/枚	ブプロレルфин		○	○
本採用	ハイジール消毒用液10%	10%/10mL	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	○	○	
院外	ハイパジールコーウ点眼液0.25%	5mL/本	ニプロラジロール		○	【般】
本採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	○	○	
院外	白色ワセリン	100g/本	白色ワセリン		○	
院外	バクスミー点鼻粉末剤3mg	3mg/瓶	グルココン		○	
院外・院内特購	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	ビンカシルカシウム	(限定)	○	
本採用	バスタロンローション10%	10%1g	尿素	○	○	
院外	パタノール点眼液0.1%	5mL/本	オバパタジン塩酸塩		○	
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム		○	
院内	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/本	ハッカ油	○		
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	シクロスピリン		○	
院外・院内特購	バルミコート200μgタービュハイラー112吸引	200μg/1回噴霧	ブテソニド	(限定)	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	パルミコート吸入液0.25m g	0.25mg/2mL/A	ブデソニド	○	○	
院外・院内特購	パルミコート吸入液0.5m g	0.5mg/A	ブデソニド	(限定)	○	
院外	ハリロピーブ8m g	8mg/枚	ロピニロール塩酸塩		○	
院外	ハリロピーブ16m g	16mg/枚	ロピニロール塩酸塩		○	
院外	ハリロピーブ24m g	24mg/枚	ロピニロール塩酸塩		○	
院外	ハリロピーブ32m g	32mg/枚	ロピニロール塩酸塩		○	
特購	パンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	パンコマイシン	(限定)	(限定)	
院外	パンデルクリーム0.1%	5g/本	酪酸プロピオ酸ヒドロコルチゾン		○	
本採用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○		【般】
院内	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」	0.6mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	○		
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		○	【般】
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	【般】
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○	【般】
本採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○	
本採用	ビースエスプラス500眼灌流液	20mL/B (希釈液付)	オキシガルタチオン	○	○	
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.6mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○		
院内	ビオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○		
院外・院内特購	ビクトーザ皮下注18m g	18.0mg/筒	リラグルチド	(限定)	○	
本採用	ビソリテープ4m g	4mg/枚	ビソリプロール	○	○	
院内	ビビスクラブ消毒液4%	4% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	○		
本採用	5%ヒビテン液	500mL/本	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ヒマリシン		○	
院外	ヒューマリン3/7注カート	300単位/3mL	インスリン		○	
院外	ヒューマリン3/7注ミリオベン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○	
本採用	ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○	
院外	ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	インスリン		○	
院外	ヒューマリンN注ミリオベン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○	
本採用	ヒューマリンR注ミリオベン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	○	○	
院外	ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	インスリン		○	
本採用	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○	
院外	ヒューマログミックス25注ミリオベン	300単位/キット	インスリンリスプロ混合製剤-25		○	
院外	ヒューマログミックス50注ミリオベン	300単位/キット	インスリンリスプロ混合製剤-50		○	
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	インスリンリスプロ(遺伝子組み換)		○	
院外・院内特購	ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○	
院外・院内特購	ヒューマログ注ミリオベン	300単位/3mL	インスリンリスプロ(遺伝子組み換)	(限定)	○	
院外	ヒューマログ注ミリオベンHD	300単位/キット	インスリンリスプロ(遺伝子組み換)		○	
院外	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ペペリン類似物質		○	【般】
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ペペリン類似物質		○	【般】
院外	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ペペリン類似物質		○	【般】
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/キット	ブデソニド・グリコビロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物吸入剤		○	
院外	5-FU軟膏5%協和	5g/本	フルオウラル		○	
院外・院内特購	ファイスプ注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリンアスパルト(遺伝子組み換)	(限定)	○	
院外・院内特購	ファイスプ注 フレックスタッチ	300単位/キット	インスリンアスパルト(遺伝子組み換)	(限定)	○	
院外・院内特購	ファイスプ注 ペンフィル	300単位/本	インスリンアスパルト(遺伝子組み換)	(限定)	○	
本採用	フィプラストスプレー500	1個	トラフェミン(遺伝子組換え)	○	○	
院外	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	500g/瓶	フェノール亜鉛華リメント		○	
院外	フェルビナクバップ70m g「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	フェルビナク		○	
本採用	フェントステープ0.5m g	0.5mg/枚	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
本採用	フェントステープ1m g	1mg/枚	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
本採用	フェントステープ2m g	2mg/枚	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
本採用	フェントステープ4m g	4mg/枚	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
院外	フェントステープ6m g	6mg/枚	フェンタニルクエン酸塩		○	
院外	フェントステープ8m g	8mg/枚	フェンタニルクエン酸塩		○	
本採用	フェントステープ0.5m g《慢性疼痛》	0.5mg/枚	フェンタニルクエン酸塩	○	○	○
本採用	フェントステープ1m g《慢性疼痛》	1mg/枚	フェンタニルクエン酸塩	○	○	○
本採用	フェントステープ2m g《慢性疼痛》	2mg/枚	フェンタニルクエン酸塩	○	○	○
本採用	フェントステープ4m g《慢性疼痛》	4mg/枚	フェンタニルクエン酸塩	○	○	○
院外	フェントステープ6m g《慢性疼痛》	6mg/枚	フェンタニルクエン酸塩		○	○
院外	フェントステープ8m g《慢性疼痛》	8mg/枚	フェンタニルクエン酸塩		○	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	複方ヨード・グリセリン* (小塙)	500mL/本	複方ヨード・グリセリン	○	○	
院外	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	15.75mg/10mL/瓶	ブセレリン酢酸塩			【般】
本採用	フラジール腔錠250mg	250mg	メトロニダゾール	○	○	
本採用	プラスチックU 100	30G×1cc	-	○	○	
本採用	フランドルテープ40mg	40mg	硝酸イソリビット	○	○	【般】
本採用	プリビーシー液0.02%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○	
本採用	プリビーシー液0.05%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○	
院外	プリビナ液0.05%	500mL/本	ナフアリリン硝酸塩		○	
院外	【般】フルオシノニド軟膏0.05%	10g/本	フルチカゾンプロピオ酸エステル			【般】
院外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	フルチカゾンプロピオ酸エステル		○	
院外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	フルチカゾンプロピオ酸エステル		○	
本採用	フルタイド100ディスカス	100μg/1回噴霧	フルチカゾンプロピオ酸エステル	○	○	
院外	フルタイド200ディスカス	200μg/1回噴霧	フルチカゾンプロピオ酸エステル		○	
本採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○		【般】
院外	【般】フルチカゾンプロピオ酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	50μg/1噴霧	フルチカゾンプロピオ酸エステル			【般】
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾンプロピオ酸エステル50μg・ホルモテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾンプロピオ酸エステル・ホルモテロールフル酸塩水和物		○	
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾンプロピオ酸エステル125μg・ホルモテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾンプロピオ酸エステル・ホルモテロールフル酸塩水和物		○	
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:フルチカゾンプロピオ酸エステル125μg・ホルモテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾンプロピオ酸エステル・ホルモテロールフル酸塩水和物	○	○	
院外	フルメタクリーム	5g/本	モメタリゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】
院外・院内特購	フルメタ軟膏	5g/本	モメタリゾンフランカルボン酸エステル	(限定)	○	
本採用	フルメトロン点眼液0.02%	5mL/本	フルオメトロン	○	○	【般】
本採用	フルメトロン点眼液0.1%	5mL/本	フルオメトロン	○	○	【般】
院内	プレグランデイン腔坐剤1mg	1mg	ゲメプロスト	○		○
院外・院内特購	プレドニン眼軟膏	5g/本	プロレドニゾン酢酸エステル	(限定)	○	
本採用	プロウペス腔用剤	10mg/個	ジノプロストン腔用剤	○	○	○
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	-	フルオレセインナトリウム	○	○	
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	カルプロニウム塩化物水和物		○	
本採用	プロスタンデイン軟膏0.003%	10g/本	アルプロスタジルアルファデクス	○	○	
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タクロリムス水和物		○	
院外・院内特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タクロリムス水和物	(限定)	○	【般】
院外	プロナック点眼液0.1%	5mL/本	プロムフェナケタリウム水和物		○	【般】
本採用	プロペト	100g/本	白色ワセリン	○	○	
本採用	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ	2mg/mL 45mL/本	プロムヘキシン塩酸塩	○		【般】
院内	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	5mL/本	プロムフェナケタリウム水和物	○		
院外	プロメライン軟膏5万単位/g* (ジェイドルフ)	20g/本	プロメライ		○	
院外・院内特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	モキシプロキサン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	ヘキザック水溶液1%消毒布20×30	20×30/枚	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セフメキシム塩酸塩	○	○	
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セフメキシム塩酸塩	○	○	
院外・院内特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	ベキモド	(限定)	○	
院外	【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5%	5mL/本	ベタキソロール塩酸塩			【般】
本採用	ベントリノ吸入液0.5%	5mg/mL	サルブタモール硫酸塩	○	○	
本採用	ベノキシール点眼液0.4%	5mL/本	オキシプロカイン塩酸塩	○	○	
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○	
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○	
本採用	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	25g/本	ヘパリン類似物質クリーム	○	○	
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	25g/本	ヘパリン類似物質軟膏	○	○	
本採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」	25g/本	ヘパリン類似物質液	○	○	
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医」	50g/本	ヘパリン類似物質液		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	ペピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○	
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン	○		【般】
本採用	ヘモレックス軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○	
院内	ペリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL/本	生体組織接着剤	○		
院内	ペリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL/本	生体組織接着剤	○		
院内	ペリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL/本	生体組織接着剤	○		
院外・院内特購	ペンタサ坐剤1g	1g/個	メラジン	(限定)	○	
院外	ペンタサ注腸1g	1g/100mL/本	メラジン		○	
本採用	ペニードルプラス	32G×4mm	-	○	○	
本採用	ホーリンV腔用錠1mg	1mg	エストリオール	○	○	
院外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚	ツロフテロール		○	【般】
院外	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚	ツロフテロール		○	【般】
院外	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚	ツロフテロール		○	【般】
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	エピネフリン	○	○	
院外	ポビドンヨードガーゲル液7%	30mL/本	ポビドンヨード		○	【般】
本採用	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	4g/本	ポビドンヨードゲル	○	○	
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	50mL/本	ポビドンヨード	○	○	
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250mL/本	ポビドンヨード	○	○	
本採用	ポビドンヨードスクラップ液7.5%「明治」	500mL/本	ポビドンヨード	○	○	
院外	ボラザg坐剤	1個	トリハノンドリドカイン		○	
院外	ボルタレンサポ12.5mg	12.5mg	ジクロフェナケナトリウム		○	
院外	ボルタレンサポ25mg	25mg	ジクロフェナケナトリウム		○	
院外	ボルタレンサポ50mg	50mg	ジクロフェナケナトリウム		○	
院外	ボルタレンテープ1.5mg	7枚/包	ジクロフェナケナトリウム		○	
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○	
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○	
本採用	マイクロファインプロ	32G×4mm	-	○	○	
院外	マイザークリーム0.05%	5g/本	ジフルプロレドナート		○	
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジフルプロレドナート		○	
院内	マクロゴール400	500mL/本	酸化エチレンと水との縮重合体	○		
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	マキサカルシートル・バタメタリジン酔酸エス		○	
			テルプロピオノン酸エス			
院外	マンジャロ皮下注2.5mg アテオス	2.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注5mg アテオス	5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注7.5mg アテオス	7.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注10mg アテオス	10mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注12.5mg アテオス	12.5mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注15mg アテオス	15mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○	
本採用	ミオコールスプレー0.3mg	0.3mg/本1回噴霧	ニトログリセリン	○	○	
本採用	ミケランL A点眼液2%	2.5mL/本	カルテオール塩酸塩	○	○	【般】
院外	ミケルナ配合点眼液	2.5mL	カルテオール塩酸塩・ラノプロロト		○	
本採用	ミドリンM点眼液0.4%	5mL/本	トロピカミド	○	○	
院外	ミドリンP点眼液	5mL/本	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩		○	
本採用	ミドレフリンP点眼液	5mL/本	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	○	○	
院外	ミルタックスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	
院内	ミレーナ52mg	52mg/個	レボノルケンストレル	○		
本採用	ムコスタ点眼液UD2%	20mg/mL 0.35mL/本	レバミド	○	○	
本採用	ムコフィン吸入液20%	2mL/包	アセチルシスティンナトリウム塩	○	○	
本採用	無水エタノール「マルイシ」	500mL/本	エタノール	○	○	
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	デキサメタジンプロピオノン酸エス		○	【般】
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	デキサメタジンプロピオノン酸エス		○	【般】
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○	
院外・院内特購	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	0.75%1g	メトロニダゾールゲル	(限定)	○	
院外	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール0.62mg・酢酸リルエチステロン2.70mg	エストラジオール・酢酸リルエチステロン		○	
本採用	メブチンエアー10μg 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○	
院外	メブチンキッドエアー5μg 吸入100回	5μg/1回噴霧	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
院外・院内特購	メブチングレーハー10μg 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロカテロール塩酸塩水和物	(限定)	○	
本採用	メブチン吸入液エニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○	
院外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	ジファミラスト軟膏		○	
院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ジファミラスト軟膏		○	
院外	モーラステープ20mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】
院外	モーラステープL 40mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】
院外	モーラスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】
本採用	モーラスパップXR120mg	7枚/包	ケトプロフェン	○	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	モーラスパップXR240mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	
本採用	ユーパスタ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ポビドンヨード	○	○	【般】
院外・院内特購	ユベラ軟膏	56g/本	トコフェロール・ビタミンA油	(限定)	○	
院外・院内特購	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリンデガルデカ210単位 /3mL インスリナスパルト90単位	インスリンデガルデカ インスリナスパルト	(限定)	○	
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	ラタノプロスト	○		【般】
院外・院内特購	ラパリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シロリムスゲル	(限定)	○	
院外	ラミシールクリーム1%	10g/本	テルビナフィン塩酸塩		○	【般】
本採用	ランタスXR注ソロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリングラルギン	○	○	
院外	ランタス注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリングラルギン		○	
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トランニスト		○	【般】
院外	リズモンT g 点眼液0.5%	2.5mL/本	チモールマレイン酸塩		○	
特購	リテインパ耳科用250μg セット	250μg/セット	トラフェルミン(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	リドカインテープ18mg「NP」	(18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○	
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	プロドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○	
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	プロドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○	
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○	【般】
院外・院内特購	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚	リバスチグミン	(限定)	○	
院外	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚	リバスチグミン		○	
院外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚	リバスチグミン		○	
院外	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚	リバスチグミン		○	
院外	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	レボカバスチン塩酸塩	○	○	【般】
院外	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	0.025mg	レボカバスチン塩酸塩		○	
院外・院内特購	リュウアット1%眼軟膏	3.5g/本	アトピック硫酸塩水和物	(限定)	○	
院外	リレンザ	5mg/アリスター	ザナミビル水和物		○	
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フランジオマイシン硫酸塩		○	
院外	リンデロン－D Pクリーム	5g/本	ベタメタゾンジプロピオノ酸エステル		○	【般】
本採用	リンデロン－D P軟膏	5g/本	ベタメタゾンジプロピオノ酸エステル	○	○	【般】
院外	リンデロン－VGローション	10mL/本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ケンタマイン硫酸塩		○	
本採用	リンデロン－VG軟膏0.12%	5g/本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ケンタマイン硫酸塩	○	○	
本採用	リンデロン－Vクリーム0.12%	5g/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	○	○	【般】
本採用	リンデロン－V軟膏0.12%	5g/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	○	○	【般】
院外・院内特購	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg/個		(限定)	○	
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		○	【般】
院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g 80g/本	エストラジオールゲル		○	
院外	ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ルリコナゾール		○	
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ビマトプロスト		○	
院外	ルムジェブ注カート	300単位/本	インスリンリスプロ		○	
院内特購	ルムジェブ注ミリオペン	300単位/本	インスリンリスプロ	(限定)	○	
院外・院内特購	ルムジェブ注100単位/mL	100単位/1mL 10mL/本	インスリンリスプロ	(限定)	○	
院内	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	ルリコナゾール	○		
院外	ルリコンクリーム1%	10mg/g 10g/本	ルリコナゾール		○	
院外	ルリコン液1%	10mg/mL 10mL/本	ルリコナゾール		○	
院外・院内特購	レクタブル2mg 注腸フォーム14回	48mg・30.8g/瓶	ブデソニド注腸剤	(限定)	○	
院外	レスキュラ点眼液0.12%	5mL/本	イソプロピルウノプロストン		○	【般】
本採用	レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ジフェンヒドラミン	○	○	
院外・院内特購	レペタン坐剤0.2mg	0.2mg	プロレナルフィン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	レベミル注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリンデミル	○	○	
院外・院内特購	レベミル注 ペンフィル	300単位/筒	インスリンデミル	(限定)	○	
本採用	レボカバスチン点眼液0.025%「ニットー」	5mL/本	レボカバスチン塩酸塩	○		【般】
本採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物	○	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	レルベア100エリプタ14吸入用	1アリスター中:ビランテロール25 µg・フルカゾンフランカルボン酸Iステル100µg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	1アリスター中:ビランテロール25 µg・フルカゾンフランカルボン酸Iステル100µg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルカゾンフランカルボン酸エステル		○	
本採用	レルベア200エリプタ14吸入用	1アリスター中:ビランテロール25 µg・フルカゾンフランカルボン酸Iステル200µg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
院外	レルベア200エリプタ30吸入用	1アリスター中:ビランテロール25 µg・フルカゾンフランカルボン酸Iステル200µg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルカゾンフランカルボン酸エステル		○	
本採用	ロードーズU 100	30G×1/2cc	-	○	○	
本採用	ロードーズU 100	30G×3/10cc	-	○	○	
本採用	ロキソニングル1%	10mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	【般】
院外	ロキソニンテープ50m g	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
院外	ロキソニンテープ100m g	100mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
院外	ロキソニンパップ100m g	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
本採用	ロキソプロフェンNaテープ50m g「科研」	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	
本採用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100m g「ケミファ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	
院外	ロコアテープ	40mg/枚	エヌフルビプロフェン・ハッカ油		○	
本採用	ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	○	○	
本採用	ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	○	○	
院外	ロゼックスゲル0.75%	0.75%/g×50g	メトロニダゾールゲル		○	
本採用	ロナセンテープ20mg	20mg/枚	プロナセン	○	○	
本採用	ワコビタール坐剤30	30mg	フェノバルビタールナトリウム	○	○	