

# 八千代医療センター採用医薬品集（外用・自己注射）

2026年6月～

## ※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要のため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

## ※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

## ※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：252品目 院外採用：330品目（特別購入薬：60品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院内	アイソピジンU D点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	ア <sup>o</sup> ラロニジン塩酸塩	○		
院内	アイノフロ吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ガス	○		
本採用	アイファガン点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	アリネジ <sup>o</sup> ン酒石酸塩	○	○	【般】
院外	アイベータ配合点眼液	5mL/本	フェ <sup>o</sup> ルマ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> ン酸塩 プ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ニ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> ン酒石酸塩		○	
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本	プ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ニ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> ン・プ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ミド		○	
院外・院内特購	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	300単位/キット	イン <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ン イ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ク（遺伝子組換え）	（限定）	○	
本採用	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	50g/瓶	酸化亜鉛	○	○	
院外	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	500g/瓶	酸化亜鉛		○	○
院外	アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	チ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> サ <sup>o</sup> ン		○	【般】
本採用	アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	チ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> サ <sup>o</sup> ン	○	○	
本採用	アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ブ <sup>o</sup> ク <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> トリ <sup>o</sup> ウム	○	○	
院外・院内特購	アジマイシン点眼液1%	1%1mL 2.5mL/本	アジ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> マイ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ン水和物	（限定）	○	
院外	アスタット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ラ <sup>o</sup> コ <sup>o</sup> サ <sup>o</sup> ール		○	
院外	アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	アズ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> ン酸ナトリウム水和物		○	
本採用	アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ジ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> アズ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> ン	○	○	
本採用	アズプール液(0.5%)	5mg/mL 50mL/本	dl-イ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ン塩酸塩	○	○	
院外	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸	200μg/吸入	モ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ラン <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ン酸エステル		○	
院外	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	アズ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> ン酸ナトリウム水和物		○	
院内	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	100mg/個	アセ <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> ア <sup>o</sup> ミ <sup>o</sup> ノ <sup>o</sup> フェ <sup>o</sup> ン100mg坐剤	○		【般】
院内	アセサイド6%消毒液OEM-2	第一剤:750mL 第二剤:750mL	過酢酸	○		
院内	アセサイド6%消毒液OEM-3	第一剤:875mL 第二剤:875mL	過酢酸	○		
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	プ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ミド <sup>o</sup> ・フェ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> マ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> ン酸塩		○	
院外	アテキユラ吸入用カプセル低用量	1カプセル中：イン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル酢酸塩173μg（イン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ルとして150μg）・モ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ラン <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ン酸エステルカ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> セル	イン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル酢酸塩・モ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ラン <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ン酸エステルカ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> セル		○	
院外	アテキユラ吸入用カプセル中用量	1カプセル中：イン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル酢酸塩173μg（イン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ルとして150μg）・モ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ラン <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ン酸エステルカ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> セル	イン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル酢酸塩・モ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ラン <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ン酸エステルカ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> セル		○	
院外	アテキユラ吸入用カプセル高用量	1カプセル中：イン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル酢酸塩173μg（イン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ルとして150μg）・モ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ラン <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ン酸エステルカ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> セル	イン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル酢酸塩・モ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ラン <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ン酸エステルカ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> セル		○	
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	1噴霧中：サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ガ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> オ <sup>o</sup> ン酸エステル36.3μg（サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ルとして25μg）/50μg	サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ガ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> オ <sup>o</sup> ン酸エステル		○	
院外・院内特購	アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中：サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ガ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> オ <sup>o</sup> ン酸エステル36.3μg（サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ルとして25μg）/125μg	サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ガ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> オ <sup>o</sup> ン酸エステル	（限定）	○	
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中：サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ガ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> オ <sup>o</sup> ン酸エステル36.3μg（サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ルとして25μg）/250μg	サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ガ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> オ <sup>o</sup> ン酸エステル		○	
本採用	アドエア100ディスクス28吸入用	1ディスク中：サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ガ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> オ <sup>o</sup> ン酸エステル72.5μg（サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ルとして50μg）/100μg	サル <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ガ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> オ <sup>o</sup> ン酸エステル		○	



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位/筒	インスリン グラルギン	(限定)	○	
本採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/キット	インスリン グラルギン	○	○	
院外	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	100単位/1mL、10mL/ 瓶	インスリン リスプロ		○	
本採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノ フィ」	300単位/3mL/キット	インスリン リスプロ	○	○	
院外	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位/筒	インスリン リスプロ		○	
本採用	インター吸入液1%	20mg/2mL/A	加メグリク酸ナトリウム	○	○	
院外	インテバンクリーム1%	1%/1g	イントメタジン		○	【般】
院外	インテバン坐剤25	25mg	イントメタジン		○	
院内	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	加ルキジメチルグルコン酸塩	○		
院内	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジメチルグルコン酸塩	○		
院外	ウゴービ皮下注0.25mg MD	1mg/1.5mL/キット	セマグルチド (遺伝子組換		○	○
院外	ウゴービ皮下注0.5mg MD	2mg/1.5mL/キット	セマグルチド (遺伝子組換		○	○
院外	ウゴービ皮下注1.0mg MD	4mg/3mL/キット	セマグルチド (遺伝子組換		○	○
院外	ウゴービ皮下注1.7mg MD	6.8mg/3mL/キット	セマグルチド (遺伝子組換		○	○
院外	ウルティプロ吸入用カプセル	1Cp中:グリコピロニウム50μ g・インダカテロール110μg	グリコピロニウム臭化物・インダ カテロール		○	
院外	ウレパルクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○	【般】
本採用	ウロマックS 泌尿器科用灌流液3%	90g/3000mL/B	D-ソリビトール	○	○	
本採用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	グリソリンアミド	○	○	【般】
本採用	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・ 炭酸水素ナトリウム	○		【般】
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/ 混合死菌浮遊液	オミデナバグ イソプロピル液		○	
本採用	エキザルバ	0.166mL(大腸菌死菌: 約1.5億個・ブドウ球菌死 菌:約1.5億個・レンサ球菌 死菌:約0.15億個・緑膿 菌死菌:約0.15億個を含 有)・ヒトコルチゾン	混合死菌浮遊液・ヒトコルチゾ ン	○	○	
本採用	エクラープaster-20μg/cm2	7.5cm×10cm	デプロメトロンピロニウム酸エステル	○	○	
院外	エクリラ400μg ジェニア60吸入用	400μg/回	アリジニウム臭化物		○	
院外・ 院内特購	エコリシン眼軟膏	3.5g/本	エリスロマイシンラクチドピロニウム酸塩・クリス チンメチルスルホン酸ナトリウム軟膏	(限定)	○	
院外・ 院内特購	エスケレ坐剤「250」	250mg	抱水カテロール	(限定)	○	
院外	エスケレ坐剤「500」	500mg	抱水カテロール		○	
本採用	エスケレ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水カテロール	○	○	
院外	エストラーナテープ0.18mg	0.18mg/枚	エストラジオール		○	
院外	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚	エストラジオール		○	
院外	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジオール		○	
本採用	S P トローチ0.25mg「明治」	0.25mg	デカリニウム塩化物	○	○	
本採用	エタノール	500mL(15℃で 95.1~96.9vol%を含む)	エタノール	○	○	
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル中; インダカテロール レイン酸塩173μg (インダカテ ロールとして150μg)・グリコ ピロニウム臭化物63μg (グ リコピロニウムとして50μg)・モ メタジニウムフランカルボニ ン酸エステル	インダカテロールレイン酸塩・グリコピ ロニウム臭化物・モメタジニウムフランカルボ ン酸エステル		○	
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル中; インダカテロール レイン酸塩173μg (インダカテ ロールとして150μg)・グリコ ピロニウム臭化物63μg (グ リコピロニウムとして50μg)・モ メタジニウムフランカルボニ ン酸エステル	インダカテロールレイン酸塩・グリコピ ロニウム臭化物・モメタジニウムフランカルボ ン酸エステル		○	
院外	エヌジェンラ皮下注24mg ベン	24mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン (遺伝子組換		○	
院外	エヌジェンラ皮下注60mg ベン	60mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン (遺伝子組換		○	
院外	エビデュオゲル	15g/本	アタパリン・過酸化ベンゾイルゲル		○	
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸バリウム	○	○	
本採用	M S温シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウカ ラジ	○	○	
本採用	M S冷シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・l-メントール	○	○	
本採用	エムラクリーム	リトカイン25mg・70ピロ 25mg/g 5g/本	リトカイン・70ピロ	○	○	
院外	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾンシロ酸エステル		○	
院外	エングラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	エンペシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	カトリマゾール		○	【般】
院外	オイラックスHクリーム	カトミト100mg・ヒドコロチリン2.5mg/g 5g/本	カトミト・ヒドコロチリン		○	
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	カトミト	○	○	
院外	オーキシス9μg タービュヘイラー60吸入	9μg/吸入	ルメテロール硫酸塩水和物		○	
院外	オキサロールローション25μg/g	25μg/g 10g/本	マキカシトール		○	
院外	オキサロール軟膏25μg/g	25μg/g 10g/本	マキカシトール		○	【般】
本採用	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩錠	○		【般】
院内	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○		
院外・院内特購	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	アバロパラチド酢酸塩注射液	(限定)	○	
本採用	オスバン消毒液10%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○	
本採用	オゼックス点眼液0.3%	0.3%/mL	トスフロキサシントシル酸塩水和物点眼液	○	○	
本採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg/本	セマグルチド(遺伝子組み換え)キット	○	○	
院内	オベガードMA眼灌流液	ブドウ糖1.5mg・塩化ナトリウム6.6mg・塩化カリウム0.36mg・塩化カルシウム水和物0.18mg・硫酸マグネシウム水和物0.3mg・炭酸水素ナトリウム2.1mg/mL	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マグネシウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○		
院内	オベガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
院内	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
院外	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	トミン臭化物		○	
院内	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	オラネジンクエン酸	○		
院外	オトビ錠口腔用50mg	50mg/錠	ミコナゾール		○	
本採用	オリブ油「ヨシダ」	25mL/本(滅菌済)	オリブ油	○	○	
院外	オルセノン軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トリチノトコフェール		○	
本採用	オルベスコ200μg インヘラー56吸入用	200μg/1噴霧	シクレニド	○	○	
院外	オンブレス吸入用カプセル150μg	150μg	インダカテロールマレイン酸塩		○	
院外	ガチフロ点眼液0.3%	5mL/本	ガチフロキサシ水和物		○	○
院外・院内特購	カデックス軟膏分包45mg	45mg/5g/包	ヨウ素軟膏	(限定)	○	
院外	カラムンローション*(丸石)	カラムン8g・酸化亜鉛8g/100mL 500mL/本	カラムン・酸化亜鉛		○	
本採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参」	0.05mg/mL 5mL/本	ピレノキシン	○	○	
院外	キサラン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	タラノロスト		○	【般】
本採用	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	リドカイン塩酸塩	○	○	
院外	キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	リドカイン塩酸塩		○	
本採用	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	リドカイン	○	○	
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	リドカイン塩酸塩	○	○	
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	リドカイン塩酸塩	○	○	
本採用	キューバル100エアゾール	100μg/1噴霧	ヘクサメチレントリアミン酸エステル	○	○	
院外	強力ポステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒドコロチリン		○	【般】
本採用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ヒドコロチリン酢酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩・ジフェニトドラミン塩	○	○	
院外	グラアルファ配合点眼液	5mL/本	リパスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩		○	
院外・院内特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リパシジル塩酸塩水和物	(限定)	○	
院外	クラビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシ水和物		○	
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 30mL/個	グリセリン	○	○	
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 60mL/個	グリセリン	○		【般】
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 120mL/個	グリセリン	○	○	
本採用	グリセリン「ケンエー」	25mL/本(84.0~87.0%を含む)(滅菌済)	グリセリン	○	○	
本採用	グリセリンBC液「ヨシダ」	250mL/瓶(84.0~87.0%を含む)	0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン	○	○	
院外	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル		○	【般】
院外・院内特購	クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	エフィナゾール	(限定)	○	
院外	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	カトリマゾール		○	【般】
院外	【般】クロトリマゾール錠100mg	100mg	カトリマゾール			【般】
本採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	【般】
院外・院内特購	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	(限定)	○	【般】
本採用	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	0.05%1g10g	クロベタゾン酪酸エステル	○	○	【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	クロマイー P 軟膏	クロラムフェニコール20mg・フラジマイン硫酸塩5mg・プレトニゾロン3mg/g 25g/本	クロラムフェニコール・フラジマイン硫酸塩・プレトニゾロン		○	
院外	クロマイ錠錠100mg	100mg	クロラムフェニコール		○	
本採用	クロラムフェニコール錠錠100mg g「F」	100mg/錠	クロラムフェニコール	○	○	
本採用	ゲーベンクリーム1%	10mg/g	スルファジミン銀	○	○	
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール	○		【般】
本採用	ケトプロフェンテープ20mg g「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	○		【般】
院外	ケラチナミンコーワクリーム20%	200mg/g 25g/本	尿素			【般】
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩		○	
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○		【般】
院外・院内特購	コソプト配合点眼液	トルブテミド 10mg・フェニロリン酸塩5mg/mL 5mL/本	トルブテミド 塩酸塩・フェニロリン酸塩	(限定)	○	【般】
院外	コソプトミニ配合点眼液	トルブテミド 10mg・フェニロリン酸塩5mg/mL 0.4mL/本	トルブテミド 塩酸塩・フェニロリン酸塩		○	
本採用	コレクチム軟膏0.25%	2.5mg/g 5g/本	テルゴシチン	○	○	
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	テルゴシチン		○	
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ビタミンA油		○	
本採用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V	肺サーファクタント製剤	○	○	
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロピリトール塩酸塩	○	○	
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェニル硫酸塩		○	【般】
院外	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	ケトチフェニル硫酸塩		○	【般】
院内	サニサーウ	250mL/本	エタノール	○		
院内	サニサーウ	60mL/本	エタノール	○		
院外	サラソピリン坐剤500mg	500mg/個	サラソピリン		○	
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセリン900mg/g	サリチル酸ワセリン		○	
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤		○	
院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg/カプセル	ヘキサメチレンピロリドン		○	
本採用	サルタノールインヘラー100μg	100μg/1回噴霧	サルタノール硫酸塩	○	○	
院外	サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノコバミン		○	【般】
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩		○	
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩	○	○	
本採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ヘキサメチレンピロリドン	○	○	【般】
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ポビドンヨード	○	○	
本採用	シアノコバミン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバミン液	○	○	
院外	シーブリー吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリコピロリドン臭化物		○	
本採用	シエルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム液	○	○	
院外	ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルトリウム		○	
院外	ジクアスLX点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルトリウム		○	
本採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム	(限定)	○	○
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジクロフェナクナトリウム		○	【般】
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg g「日医工」	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg g「日医工」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg g「日医工」	50mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
院外	ジフルプレドナートクリーム0.05%	-	ジフルプレドナート		○	
特購	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶	ジメチルメチルシロリン酸液	(限定)	(限定)	
本採用	シムビコートタービューヘイラー60吸入	ブテジニド 160μg・ホルメチロリン酸塩水和物4.5μg/本	ブテジニド・ホルメチロリン酸塩水和物	○	○	【般】
院内	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg	硝酸イソソルビド	○		
本採用	消毒用エタノール「ケンエー」	500mL/本	エタノール	○	○	
院外	小児用レルベア50エリプタ30吸入用	17βリステル中:ヒランテロール25μg・フルチカゾンフランカルボニル酸エステル50μg	ヒランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボニル酸エステル吸入剤		○	
院外	ジルダザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ベンダザック		○	
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ酸・無機塩類配合剤液		○	
本採用	ジンジカインゲル20%	30g/本	アミノ安息香酸エチル液	○	○	
院外	親水クリーム「ホエイ」	-	親水クリーム		○	
本採用	シンボニー皮下注50mg g オートインジェク	50mg/0.5mL/キット	ゴリムマブ (遺伝子組換え)	○	○	
本採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	○	○	
本採用	スープレックス吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	デスフルラン	○	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	スコピゾル眼科用液	ヒドロキシルセルロース15mg・塩化ナトリウム5.5mg・塩化カリウム1.6mg・乾燥炭酸ナトリウム0.6mg・リン酸水素ナトリウム水和物1.8mg・杓酸12mg 15mL/本	ヒドロキシルセルロース・塩化ナトリウム・塩化カリウム・乾燥炭酸ナトリウム・リン酸水素ナトリウム水和物・杓酸	○	○	
院外	スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェンコノール		○	
院外	スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェンコノール		○	
本採用	ステリクロンRエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロルキシジングルコン酸塩・エタノール	○	○	
院外	ステリクロンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/	クロルキシジングルコン酸塩		○	
本採用	ステリクロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロルキシジングルコン酸塩	○	○	
院外・院内特購	ステロネマ注腸3mg	3mg(リン酸エステルナトリウムとして3.95mg) 100mL/個	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム	(限定)	○	
本採用	スピオルトレスピマット60吸入	1噴霧中フクロニド2.5μg及び相タテロール2.5μg	フクロニド臭化物水和物・相タテロール塩酸塩	○	○	
本採用	スピジア点鼻液5mg	5mg/0.1mg/瓶	ジアゼパム噴霧剤	○	○	
本採用	スピジア点鼻液7.5mg	7.5mg/0.1mg/瓶	ジアゼパム噴霧剤	○	○	
本採用	スピジア点鼻液10mg	10mg/0.1mg/瓶	ジアゼパム噴霧剤	○	○	
院外	スピール膏M	357g/m <sup>2</sup> 25cm <sup>2</sup> /枚	サリチル酸		○	
院外・院内特購	スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	(限定)	○	【般】
本採用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg/噴霧	フクロニド臭化物水和物	○	○	
院外・院内特購	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/Cp 7Cp/シート	フクロニド臭化物水和物	(限定)	○	
院外・院内特購	スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	フェトリン	(限定)	○	
院外	セタネオ点眼液0.002%	0.002% 2.5mL/本	セベタプロスト		○	
院外	ゼビアクスローション2%	10g/本	ゼメチジン		○	
院外	ゼップバウンド皮下注2.5mg アテオス	2.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	○
院外	ゼップバウンド皮下注5mg アテオス	5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	○
院外	ゼップバウンド皮下注7.5mg アテオス	7.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	○
院外	ゼップバウンド皮下注10mg アテオス	10mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○	○
院外	ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	リナファター		○	
院外	ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	リナファター		○	
本採用	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	250mg/250mL/B	セボフルラン	○	○	
院外	セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	フェルビナク		○	
院外	セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	フェルビナク		○	【般】
院外	セレベント50ディスクス	50μg/17°リスター-60°リスター/個	サルメテロールシナニド酸塩		○	
本採用	ゾピラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	アシクロビル	○	○	
院外	ゾピラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	アシクロビル		○	【般】
本採用	ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	フラジマイン硫酸塩	○	○	
院外	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シユアパル	5mg/筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	○
院外	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル	10mg/筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	○
院外・院内特購	ソリクア配合注ソロスター	1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤	(限定)	○	
本採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット	○	○	
本採用	ソルベース	500g/瓶	マクロゴール400 マクロゴール4000	○	○	
本採用	ダイアップ坐剤4	4mg	ジブプロフェン	○	○	
本採用	ダイアップ坐剤6	6mg	ジブプロフェン	○	○	
本採用	ダイアップ坐剤10	10mg	ジブプロフェン	○	○	
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリノゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマラゲン2.1mg/1cm <sup>2</sup> [4.8cm×4.8cm/枚 (ハーフサイズ) 1]	生体組織接着剤	○		
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリノゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマラゲン2.1mg/1cm <sup>2</sup> [9.5cm×4.8cm/枚 (レギュラーサイズ) 1]	生体組織接着剤	○		
院外	タブコム配合点眼液	2.5mL/本	タフルプロスト・フェニルメチルイソプロterenol		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	タブロス点眼液0.0015%	15µg/mL 2.5mL/本	タブル <sup>®</sup> ロスト		○	
院外	タブロスニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	タブル <sup>®</sup> ロスト		○	
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	タリビッド	○	○	
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	タリビッド	○	○	
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	タリムス水和物		○	
本採用	チモプトール X E点眼液0.5%	2.5mL/A	チモプトール	○	○	【般】
院外	ツムラ紫雲膏	500g×1瓶	紫雲膏		○	
本採用	ツロブテロールテープ0.5mg g「久光」	0.5mg/枚	ツロブテロール	○		【般】
本採用	ツロブテロールテープ1mg g「久光」	1mg/枚	ツロブテロール	○		【般】
本採用	ツロブテロールテープ2mg g「久光」	2mg/枚	ツロブテロール	○		【般】
院内	ディスオーパ消毒液0.55%	3.8L/本	フタール	○		
院外	デビゲル1mg g	1mg	イストラゾール		○	
院外・院内特購	ディフェリンゲル0.1%	15g/本	アダバレン	(限定)	○	【般】
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	デキサメタゾン	○		【般】
本採用	デスマプレシン点鼻スプレー2.5µg g「フェリン	2.5µg/1回噴霧	デスマプレシン酢酸塩水和物	○	○	
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ブナジニル塩酸塩		○	
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エピジヒドロコレスチリン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○	
院外	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物10mg・過酸化ベンゾイル30mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○	
院外	デュオトラバ配合点眼液	トラホ <sup>®</sup> ロスト40µg・チモプトール5mg	トラホ <sup>®</sup> ロスト・チモプトール		○	
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg g	2.1mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg g	4.2mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg g	8.4mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg g	16.8mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg g《慢性疼	2.1mg/枚	フェンタニル		○	○
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg g《慢性疼	4.2mg/枚	フェンタニル		○	○
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg g《慢性疼	8.4mg/枚	フェンタニル		○	○
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg g《慢性疼	16.8mg/枚	フェンタニル		○	○
本採用	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	25g/本	ネジシテラマイシン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	○	○	
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリチルリチン酸		○	
本採用	デルモゾールgローション	10mL/本	ヘタメタリン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	クロハ <sup>®</sup> トリオール <sup>®</sup> 0.05%水和物		○	【般】
本採用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
院外	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
本採用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
院外・院内特購	テレミンソフト坐薬2mg g	2mg	ビサゾール	(限定)	○	
院外・院内特購	テレミンソフト坐薬10mg g	10mg	ビサゾール	(限定)	○	
院外・院内特購	トービー吸入液300mg g	300mg/5mL/管	トブラマイシン	(限定)	○	
院外	トブシムクリーム0.05%	10g/本	フルオシノニド		○	【般】
本採用	トブシムローション0.05%	10g/本	フルオシノニド	○	○	
院外	トブシム軟膏0.05%	10g/本	フルオシノニド		○	
院外・院内特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブラマイシン	(限定)	○	
院外	ドボネックス軟膏50µg g / g	10g/本	カルシポトリオール		○	
院外	ドボベツゲル	15g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
院外	ドボベツ軟膏	カルシポトリオール50.0µg・ヘタメタリンジプロピオン酸エステル0.643mg/g 15g/本	カルシポトリオール水和物・ヘタメタリンジプロピオン酸エステル		○	
院外	ドボベツ軟膏	カルシポトリオール50.0µg・ヘタメタリンジプロピオン酸エステル0.643mg/g 30g/本	カルシポトリオール水和物・ヘタメタリンジプロピオン酸エステル		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	ドボベツフォーム	60g/本	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トラホ®ロスト		○	【般】
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルソ®ラミド 塩酸塩		○	
本採用	トルリシティ皮下注0.75mg アテオス	0.75mg/0.5mL/キット	テュカ®ルフト®	○	○	
本採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位/筒	インスリン デケルデク (遺伝子組換え)	○	○	
院外・院内特購	トレシーバ注 ベンフィル	300単位/筒	インスリン デケルデク (遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	10000単位	トロンピン	○	○	
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	トンプ®リドン	○	○	【般】
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	トンプ®リドン	○	○	【般】
院外	ナウゼリン坐剤60	60mg	トンプ®リドン		○	
院外	ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用	50μg/噴霧	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和		○	
本採用	ナノパスニードルⅡ	34G×4mm	-	○	○	
院外	ナパゲルンローション3%	50mL/本	フェルビ®カ		○	【般】
院外	ナパゲルン軟膏3%	25g/本	フェルビ®カ		○	
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2 /枚	ニコチン		○	
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /枚	ニコチン		○	
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /枚	ニコチン		○	
院外	ニゾラールクリーム2%	10g/本	ケトコナゾール		○	【般】
院外	ニゾラールローション2%	10g/本	ケトコナゾール		○	【般】
院外	ニトログリセリンテープ27mg「トローワ」	27mg/9.6cm2/枚	ニトログリセリン貼付剤		○	
本採用	ニトロダームT T S 25mg q	25mg/枚	ニトログリセリン	○	○	
院外	ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ニブラジロール		○	
院外	ニュープロパッチ2.25mg q	2.25mg/枚	ニチドチン		○	
院外・院内特購	ニュープロパッチ4.5mg q	4.5mg/枚	ニチドチン	(限定)	○	
本採用	ニュープロパッチ9mg q	9mg/枚	ニチドチン	○	○	
院外・院内特購	ニュープロパッチ13.5mg q	13.5mg/枚	ニチドチン	(限定)	○	
院外・院内特購	ニュープロパッチ18mg q	18mg/枚	ニチドチン	(限定)	○	
院外	ネフィー点鼻液1mg	1mg/本	アドレナリン噴霧剤	(限定)	○	
院外	ネフィー点鼻液2mg	2mg/本	アドレナリン噴霧剤	(限定)	○	
院外	ネオキシテープ73.5mg q	73.5mg/枚	オキシドチン塩酸塩		○	
本採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	フェニロリン塩酸塩	○	○	
本採用	ネオステリングリーンうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○	
本採用	ネオメドロールE E軟膏	3g/本	フラジ®ロイム硫酸塩・メチルパ®ロト®ニゾロン	○	○	
院内	ネキソブリッド外用ゲル5g	5g/瓶(混合用ゲル付)	ハイアップ®ル茎搾汁精製物	○		
院外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ネバ®フェカ		○	
院外・院内特購	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○	
院外	ノボラピッド30ミックス注 ベンフィル	300単位/3mL	インスリン		○	
院外	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト		○	
院外	ノボラピッド注 フレックスタッチ	300単位/3mL	インスリン アスパルト	○	○	
院外・院内特購	ノボラピッド注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○	
院外・院内特購	ノボラピッド注 ベンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○	
本採用	ノボラピッド注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト	○	○	
院外・院内特購	ノボリン30R注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○	
本採用	ノボリンN注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○	
院外・院内特購	ノボリンR注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○	
院外・院内特購	ノボリンR注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○	
院外	ノルspanテープ5mg q	5mg/枚	ブプロピオン		○	○
院外・院内特購	ノルspanテープ10mg q	10mg/枚	ブプロピオン	(限定)	○	○
院外	ノルspanテープ20mg q	20mg/枚	ブプロピオン		○	○
本採用	ハイジール消毒用液10%	10%/10mL	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	○	○	
院外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	ニブラジロール		○	【般】
本採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	チオ硫酸トリウム・エタノール	○	○	
院外	白色ワセリン	100g/本	白色ワセリン		○	
院外	バクスマー点鼻粉末剤3mg q	3mg/瓶	ケルゴコン		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	Δ <sup>+</sup> ロシカルシウム	(限定)	○	
本採用	バスタロンローション10%	10%1g	尿素	○	○	
院外	バタノール点眼液0.1%	5mL/本	和ハ <sup>+</sup> タジ <sup>+</sup> ン塩酸塩		○	
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	アス <sup>+</sup> レ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> トリ <sup>+</sup> ウム <sup>+</sup> 水和物・ 炭酸水素ナトリウム		○	
院内	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/本	ハッカ油	○		
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	シコロス <sup>+</sup> リン		○	
院外・ 院内特購	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸 入	200μg/1回噴霧	ブ <sup>+</sup> テ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ト <sup>+</sup>	(限定)	○	
本採用	パルミコート吸入液0.25m g	0.25mg/2mL/A	ブ <sup>+</sup> テ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ト <sup>+</sup>	○	○	
院外・ 院内特購	パルミコート吸入液0.5m g	0.5mg/A	ブ <sup>+</sup> テ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ト <sup>+</sup>	(限定)	○	
院外	ハルロピテブ8m g	8mg/枚	ロ <sup>+</sup> ビ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ール <sup>+</sup> 塩酸塩		○	
院外	ハルロピテブ16m g	16mg/枚	ロ <sup>+</sup> ビ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ール <sup>+</sup> 塩酸塩		○	
院外	ハルロピテブ24m g	24mg/枚	ロ <sup>+</sup> ビ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ール <sup>+</sup> 塩酸塩		○	
院外	ハルロピテブ32m g	32mg/枚	ロ <sup>+</sup> ビ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ール <sup>+</sup> 塩酸塩		○	
特購	バンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	バ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> コ <sup>+</sup> マイ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ン	(限定)	(限定)	
院外	パンデルクリーム0.1%	5g/本	酪 <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> ヒ <sup>+</sup> ト <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> フ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン		○	
本採用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日 点」	5mL/本	ヒアル <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> トリ <sup>+</sup> ウム	○		【般】
院内	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコ ン」	0.6mL/筒	精製ヒアル <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> トリ <sup>+</sup> ウム <sup>+</sup> 液	○		
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアル <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> トリ <sup>+</sup> ウム		○	【般】
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアル <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> トリ <sup>+</sup> ウム		○	【般】
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアル <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> トリ <sup>+</sup> ウム	○	○	【般】
本採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○	
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液	20mL/B (希釈液付)	オキシ <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> チ <sup>+</sup> オン	○	○	
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.6mL/本	ヒアル <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> トリ <sup>+</sup> ウム	○		
院内	ピオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベン <sup>+</sup> ザ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> コ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ウム <sup>+</sup> 塩化物	○		
本採用	ピソノテブ4m g	4mg/枚	ヒ <sup>+</sup> ソ <sup>+</sup> ノ <sup>+</sup> テ <sup>+</sup> ブ <sup>+</sup> ール	○	○	
院内	ピスクラブ消毒液4%	4% 500mL	ク <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ジ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> グ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> コ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> 塩	○		
本採用	5%ピピテン液	500mL/本	ク <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ジ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> グ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> コ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> 塩	○	○	
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ピ <sup>+</sup> マ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ン		○	
院外	ヒューマリン3/7注カート	300単位/3mL	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン		○	
院外	ヒューマリン3/7注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトイン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン(遺伝子組換え)		○	
本採用	ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン	○	○	
院外	ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン		○	
院外	ヒューマリンN注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトイン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン(遺伝子組換え)		○	
本採用	ヒューマリンR注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトイン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン(遺伝子組換え)	○	○	
院外	ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン		○	
本採用	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン	○	○	
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/キット	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> パ <sup>+</sup> ルト <sup>+</sup> 混合製剤-25		○	
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/キット	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> パ <sup>+</sup> ルト <sup>+</sup> 混合製剤-50		○	
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> パ <sup>+</sup> ルト <sup>+</sup> (遺伝子組み換		○	
院外・ 院内特購	ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> パ <sup>+</sup> ルト <sup>+</sup> (遺伝子組み換 え)	(限定)	○	
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/キット	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> パ <sup>+</sup> ルト <sup>+</sup> (遺伝子組み換		○	
院外	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ハ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ノ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ノ <sup>+</sup> 類似物質		○	【般】
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ハ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ノ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ノ <sup>+</sup> 類似物質		○	【般】
院外	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ハ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ノ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ノ <sup>+</sup> 類似物質		○	【般】
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/キット	ブ <sup>+</sup> デ <sup>+</sup> ソ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ド <sup>+</sup> ・グ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> コ <sup>+</sup> ピ <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ウム <sup>+</sup> 臭化 物・ホルモテロール <sup>+</sup> フ <sup>+</sup> マル <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> 塩 <sup>+</sup> 水 和物吸入剤		○	
院外	5-FU軟膏5%協和	5g/本	フル <sup>+</sup> ウ <sup>+</sup> ラ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ル		○	
院外・ 院内特購	フィアスブ注 100単位/mL	1000単位/10mL	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> パ <sup>+</sup> ルト <sup>+</sup> (遺伝子組み換 え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位/キット	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> パ <sup>+</sup> ルト <sup>+</sup> (遺伝子組み換 え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	フィアスブ注 ベンフィル	300単位/本	イン <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> パ <sup>+</sup> ルト <sup>+</sup> (遺伝子組み換 え)	(限定)	○	
本採用	フィブラストスプレー500	1個	トラ <sup>+</sup> フェ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> ミン(遺伝子組換え)	○	○	
院外	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	500g/瓶	フェ <sup>+</sup> ノ <sup>+</sup> ール <sup>+</sup> 亜 <sup>+</sup> 鉛 <sup>+</sup> 華 <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> メント		○	
院外	フェルピナクパップ70mg「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	フェ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> ピ <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> ク		○	
本採用	フェントステーブ0.5m g	0.5mg/枚	フェ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> 塩	○	○	【般】
本採用	フェントステーブ1m g	1mg/枚	フェ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> ニ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> 酸 <sup>+</sup> 塩	○	○	【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	フェントステップ2mg	2mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○	【般】
本採用	フェントステップ4mg	4mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○	【般】
院外	フェントステップ6mg	6mg/枚	フェンタニル塩酸塩		○	【般】
院外	フェントステップ8mg	8mg/枚	フェンタニル塩酸塩		○	【般】
本採用	フェントステップ0.5mg《慢性疼痛》	0.5mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○	○
本採用	フェントステップ1mg《慢性疼痛》	1mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○	○
本採用	フェントステップ2mg《慢性疼痛》	2mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○	○
本採用	フェントステップ4mg《慢性疼痛》	4mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○	○
院外	フェントステップ6mg《慢性疼痛》	6mg/枚	フェンタニル塩酸塩		○	○
院外	フェントステップ8mg《慢性疼痛》	8mg/枚	フェンタニル塩酸塩		○	○
本採用	複方ヨード・グリセリン* (小堺)	500mL/本	複方ヨード・グリセリン	○	○	
院外	【般】ブセリン酢酸塩点鼻液0.15%	15.75mg/10mL/瓶	ブセリン酢酸塩			【般】
本採用	フラジール錠250mg	250mg	メロキサロム	○	○	
本採用	プラスチックU100	30G×1cc	-	○	○	
院外	フランドルテープ40mg	40mg	硝酸イソリビト		○	【般】
本採用	プリビシー液0.02%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○	
本採用	プリビシー液0.05%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○	
院外	プリピナ液0.05%	500mL/本	ナファゾリン硝酸塩		○	
院外	【般】フルオシノニド軟膏0.05%	10g/本	フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル			【般】
院外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル		○	
院外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル		○	
本採用	フルタイド100ディスカス	100μg/1回噴霧	フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル	○	○	
院外	フルタイド200ディスカス	200μg/1回噴霧	フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル		○	
本採用	フルチゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチゾンフランカルボン酸エステル	○		【般】
院外	【般】フルチゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	50μg/1噴霧	フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル			【般】
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル50μg・ホルメテロール <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ル酸塩水和物5μg	フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル・ホルメテロール <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ル酸塩水和物		○	
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル125μg・ホルメテロール <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ル酸塩水和物5μg	フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル・ホルメテロール <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ル酸塩水和物		○	
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル125μg・ホルメテロール <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ル酸塩水和物5μg	フルチゾン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル・ホルメテロール <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ル酸塩水和物	○	○	
院外	フルメタクリーム	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】
院外・院内特購	フルメタ軟膏	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル	(限定)	○	【般】
本採用	フルメロン点眼液0.02%	5mL/本	フルメロン	○	○	【般】
本採用	フルメロン点眼液0.1%	5mL/本	フルメロン	○	○	【般】
院内	ブレグランディン腔坐剤1mg	1mg	ゲマ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> スト	○		○
院外・院内特購	ブレドニン眼軟膏	5g/本	ブレドニ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> ン酢酸エステル	(限定)	○	
本採用	ブロウベス腔用剤	10mg/個	ジノプロストン腔用剤	○	○	○
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	-	フルオレセインナトリウム	○	○	
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	カル <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ニウム塩化物水和物		○	
本採用	プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	アル <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> スタ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ル アル <sup>®</sup> ファ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> クス	○	○	
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> 水和物		○	
院外・院内特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> 水和物	(限定)	○	【般】
院外	プロナック点眼液0.1%	5mL/本	プロ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> フェ <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> トリ <sup>®</sup> ウム <sup>®</sup> 水和物		○	【般】
本採用	プロベト	100g/本	白色ワ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン	○	○	
本採用	プロムヘキシ <sup>®</sup> ン塩酸塩吸入液0.2%「タイ	2mg/mL 45mL/本	プロ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> ヘ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 塩酸塩	○		【般】
院内	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッー」	5mL/本	プロ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> フェ <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> トリ <sup>®</sup> ウム <sup>®</sup> 水和物	○		
院外	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドル)	20g/本	プロ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> ライ <sup>®</sup> ン		○	
院外・院内特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	ベ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ール <sup>®</sup> 塩酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	ヘキサ <sup>®</sup> ック <sup>®</sup> 水溶液1%消毒布20×30	20×30/枚	クロ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ヘ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> コ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 酸塩	○	○	
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> 塩酸塩	○	○	
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> 塩酸塩	○	○	
院外・院内特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	ベ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup>	(限定)	○	
院外	【般】ベタキソ <sup>®</sup> ール <sup>®</sup> 塩酸塩点眼液0.5%	5mL/本	ベ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> ール <sup>®</sup> 塩酸塩			【般】
本採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サル <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> モ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 硫酸塩	○	○	
本採用	ベノキシル点眼液0.4%	5mL/本	ベ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 塩酸塩	○	○	
院外	ヘパ <sup>®</sup> リン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	100g/本	ヘ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> リン類似物質噴霧剤		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○	
本採用	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	25g/本	ヘパリン類似物質クリーム	○	○	
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	25g/本	ヘパリン類似物質軟膏	○	○	
本採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」	25g/本	ヘパリン類似物質液	○	○	
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医」	50g/本	ヘパリン類似物質液		○	
院外・院内特購	ベピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○	
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒトロコリリン	○		【般】
本採用	ヘモレックス軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○	
院内	ペリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL/本	生体組織接着剤	○		
院内	ペリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL/本	生体組織接着剤	○		
院内	ペリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL/本	生体組織接着剤	○		
院外・院内特購	ペンタサ坐剤1g	1g/個	メサジン	(限定)	○	
院外	ペンタサ注腸1g	1g/100mL/本	メサジン		○	
本採用	ペンニードルプラス	32G×4mm	-	○	○	
本採用	ホーリンV腔用錠1mg	1mg	エトリオール	○	○	
院外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚	ツロプテロール		○	【般】
院外	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚	ツロプテロール		○	【般】
院外	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚	ツロプテロール		○	【般】
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	ヒトネリソリン	○	○	
本採用	ポビシユガーパスタ軟膏	100g/本	精製白糖 ポビトニョード	○	○	【般】
院外	ポビドンヨードガーグル液7%	30mL/本	ポビトニョード		○	【般】
本採用	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	4g/本	ポビトニョードゲル	○	○	
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	50mL/本	ポビトニョード	○	○	
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250mL/本	ポビトニョード	○	○	
本採用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	500mL/本	ポビトニョード	○	○	
院外	ボラザq坐剤	1個	トリハノジド リトカイン		○	
院外	ポルトレンサポ12.5mg	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ポルトレンサポ25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ポルトレンサポ50mg	50mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ポルトレンサポ15mg	7枚/包	ジクロフェナクナトリウム		○	
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○	
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○	
本採用	マイクロファインプロ	32G×4mm	-	○	○	
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジフルプレトナート		○	
院内	マクロゴール400	500mL/本	酸化エチレンと水との縮重合体	○		
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	マキカルシトール・ハタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○	
院外	マンジャロ皮下注2.5mg アテオス	2.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注5mg アテオス	5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注7.5mg アテオス	7.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注10mg アテオス	10mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○	○
院外	マンジャロ皮下注12.5mg アテオス	12.5mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○	○
院外	マンジャロ皮下注15mg アテオス	15mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○	○
本採用	ミオコールスプレー0.3mg	0.3mg/本1回噴霧	ニトログリセリン	○	○	
本採用	ミケランL A点眼液2%	2.5mL/本	カルテロール塩酸塩	○	○	【般】
院外	ミケルナ配合点眼液	2.5mL	カルテロール塩酸塩・ラタノプロスタ		○	
本採用	ミドリンM点眼液0.4%	5mL/本	トピカミド	○	○	
院外	ミドリンP点眼液	5mL/本	トピカミド・フェニレフリン塩酸塩		○	
本採用	ミドレフリンP点眼液	5mL/本	トピカミド・フェニレフリン塩酸塩	○	○	
院外	ミルタックスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	
院内	ミレーナ52mg	52mg/個	レボノルゲストレル	○		
本採用	ムコスタ点眼液UD2%	20mg/mL 0.35mL/本	レバミピト	○	○	
本採用	ムコフィリン吸入液20%	2mL/包	アセチルステイナトリウム塩	○	○	
本採用	無水エタノール「マルイシ」	500mL/本	エタノール	○	○	
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	【般】
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	【般】
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○	
本採用	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	0.75%1g	メトロニダゾールゲル	○	○	
院外	メノエイドコンビパッチ	1ストラジール0.62mg・酢酸 ルイジステロ2.70mg	1ストラジール・酢酸ルイジステロ		○	
本採用	メプチンエア-10μg吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピフェノール塩酸塩水和物	○	○	
院外	メプチンキッドエア-5μg吸入100回	5μg/1回噴霧	プロピフェノール塩酸塩水和物		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	メブチンスイングヘラー10μg 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロパノロール塩酸塩水和物	(限定)	○	
本採用	メブチン吸入液ユニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	プロパノロール塩酸塩水和物	○	○	
院外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	ジフアマリスト軟膏		○	
院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ジフアマリスト軟膏		○	
院外	モーラステープ20mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】
院外	モーラステープL 40mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】
院外	モーラスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	
院外	モーラスパップXR120mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】
院外	モーラスパップXR240mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	
本採用	ユーバスタ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホピトントンोट	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ユベラ軟膏	56g/本	トコフェロール・ビタミンA油	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ライソデグ配合注 フレックスタッチ	インスリンデグアルテク210単位 /3mL インスリンアスパルト90単位	インスリンデグアルテク インスリンアスパルト	(限定)	○	
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	ラタノプロスト	○		【般】
院外・ 院内特購	ラパリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シロリムスゲル	(限定)	○	
院外	ラミシールクリーム1%	10g/本	テルビナフィン塩酸塩		○	【般】
本採用	ランタスXR注シロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリングルキニン	○	○	
院外	ランタス注シロスター	300単位/3mL/キット	インスリングルキニン		○	
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トコニラスト		○	【般】
院外	リズモンT q 点眼液0.5%	2.5mL/本	チロニルメレイン酸塩		○	
特購	リテンバ耳科用250μg セット	250μg/セット	トコフェリン(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	リドカインテープ18mg「NP」	(18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○	
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	プロピドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○	
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	プロピドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○	
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロピドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○	
院外・ 院内特購	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚	リバスタッチパッチ	(限定)	○	【般】
院外	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚	リバスタッチパッチ		○	【般】
院外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚	リバスタッチパッチ		○	【般】
院外	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚	リバスタッチパッチ		○	【般】
院外	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	レボカルバシチン塩酸塩	○	○	【般】
院外	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	0.025mg	レボカルバシチン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	アトロピウム硫酸塩水和物	(限定)	○	
院外	リレンザ	5mg/ブリストア	ザナミビル水和物		○	
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ヘタメタリンリン酸エステルナトリウム・フ ジオキシム硫酸塩		○	
院外	リンデロン-D Pクリーム	5g/本	ヘタメタリンリン酸エステルナトリウム		○	【般】
本採用	リンデロン-D P軟膏	5g/本	ヘタメタリンリン酸エステルナトリウム	○	○	【般】
院外	リンデロン-VGローション	10mL/本	ヘタメタリン吉草酸エステル・ゲンタ ミン硫酸塩		○	
本採用	リンデロン-VG軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタリン吉草酸エステル・ゲンタ ミン硫酸塩	○	○	
本採用	リンデロン-Vクリーム0.12%	5g/本	ヘタメタリン吉草酸エステル	○	○	【般】
本採用	リンデロン-V軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタリン吉草酸エステル	○	○	【般】
院外・ 院内特購	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg/個		(限定)	○	
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ヘタメタリンリン酸エステルナトリウム		○	【般】
院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g 80g/本	エストラジオールゲル		○	
院外	ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ルコナザール		○	
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ヒマトプロスト		○	【般】
院外	ルムジエブ注カート	300単位/本	インスリン リスプロ		○	○
院外・ 院内特購	ルムジエブ注ミリオベン	300単位/本	インスリン リスプロ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ルムジエブ注100単位/mL	100単位/1mL 10mL/ 本	インスリン リスプロ	(限定)	○	
院内	ルリコナザールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	ルリコナザール	○		
院外	ルリコナザールクリーム1%	10mg/g 10g/本	ルリコナザール		○	
院外	ルリコナザール液1%	10mg/mL 10mL/本	ルリコナザール		○	
院外・ 院内特購	レクタブル2mg 注腸フォーム14回	48mg・30.8g/瓶	ブデソニド注腸剤	(限定)	○	
院外	レスキュラ点眼液0.12%	5mL/本	イソプロピルメチルプロピル		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ジフェニヒトラミン	○	○	
院外・ 院内特購	レベタン坐剤0.2mg	0.2mg	ブプロピルフィン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	レベミル注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン デメミル	○	○	
院外・ 院内特購	レベミル注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デメミル	(限定)	○	
本採用	レボカバスタチン点眼液0.025%「ニットー」	5mL/本	レボカバスタチン塩酸塩	○		【般】
本採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物	○	○	
本採用	レルベア100エリプタ14吸入用	17リスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル100μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	17リスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル100μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル		○	
本採用	レルベア200エリプタ14吸入用	17リスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル200μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
院外	レルベア200エリプタ30吸入用	17リスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル200μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル		○	
本採用	ロドーズU100	30G×1/2cc	-	○	○	
本採用	ロドーズU100	30G×3/10cc	-	○	○	
本採用	ロキソニンゲル1%	10mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	【般】
院外	ロキソニンテープ50mg	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
院外	ロキソニンテープ100mg	100mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
院外	ロキソニンパップ100mg	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
本採用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	
本採用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケ ミファ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	
院外	ロコアテープ	40mg/枚	エスフルビドプロフェン・ハッカ油		○	
本採用	ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○	
本採用	ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○	
院外	メトセックスゲル0.75%	0.75%/g×50g	メトセタゾールゲル		○	
本採用	ロナセンテープ20mg	20mg/枚	ブロナンセリン	○	○	
本採用	ワコビタール坐剤30	30mg	フェニバルビタールナトリウム	○	○	