

八千代医療センター採用医薬品集（外用・自己注射）

2026年7月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要のため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：252品目 院外採用：330品目（特別購入薬：60品目）

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院内	アイオピジンU D点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	ア ^o ラ ^o ニ ^o ジ ^o ン塩酸塩	○			
院内	アイノフロ ^o 吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ガス	○			
本採用	アイファガン点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ブ ^o リ ^o モ ^o ニ ^o ジ ^o ン酒石酸塩	○	○	【般】	
院外	アイベータ配合点眼液	5mL/本	ト ^o ロ ^o ル ^o メ ^o レ ^o イン酸塩 ブ ^o リ ^o モ ^o ニ ^o ジ ^o ン酒石酸塩		○		
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本	ブ ^o リ ^o モ ^o ニ ^o ジ ^o ン・ブ ^o リ ^o ンゾ ^o ラミド		○		
院外・ 院内特購	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	300単位/キット	インスリ ^o イ ^o デ ^o ク（遺伝子組換え）	（限定）	○		
本採用	亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」	50g/瓶	酸化亜鉛	○	○		
院外	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	500g/瓶	酸化亜鉛		○		○
院外	アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	ナジ ^o フ ^o ロ ^o キ ^o シン		○	【般】	
本採用	アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	ナジ ^o フ ^o ロ ^o キ ^o シン	○	○		
本採用	アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ブ ^o ク ^o ラ ^o デ ^o シ ^o ナトリウム	○	○		
院外・ 院内特購	アジマイシン点眼液1%	1%1mL 2.5mL/本	アジ ^o ス ^o ロ ^o マイ ^o シ ^o ン水和物	（限定）	○		
院外	アスタット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ラ ^o コ ^o ナジ ^o ール		○		
院外	アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	アズ ^o レ ^o ニ ^o ス ^o ル ^o ホ ^o ン酸ナトリウム水和物		○		
本採用	アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ジ ^o メ ^o チ ^o ル ^o イソ ^o プロ ^o ピ ^o ルアズ ^o レ ^o ン	○	○		
本採用	アスプール液（0.5%）	5mg/mL 50mL/本	dl-イソ ^o プロ ^o レ ^o リ ^o ン塩酸塩	○	○		
院外	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸	200μg/吸入	モ ^o メ ^o タ ^o ジ ^o ソ ^o フ ^o ラ ^o ンカルホ ^o ン酸エステル		○		
院外	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	アズ ^o レ ^o ニ ^o ス ^o ル ^o ホ ^o ン酸ナトリウム水和物		○		
院内	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	100mg/個	アセトアミノフェン100mg坐剤	○		【般】	
院内	アセサイド6%消毒液OEM-2	第一剤:750mL 第二剤:750mL	過酢酸	○			
院内	アセサイド6%消毒液OEM-3	第一剤:875mL 第二剤:875mL	過酢酸	○			
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	ブ ^o リ ^o ンゾ ^o ラミド ^o ・ト ^o ロ ^o ル ^o メ ^o レ ^o イン酸塩		○		
院外	アテキユラ吸入用カプセル低用量	1カプセル中：イン ^o ダ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩173μg（イン ^o ダ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ルとして150μg）・モ ^o メ ^o タ ^o ジ ^o ソ ^o フ ^o ラ ^o ンカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プセル	イン ^o ダ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩・モ ^o メ ^o タ ^o ジ ^o ソ ^o フ ^o ラ ^o ンカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プセル		○		
院外	アテキユラ吸入用カプセル中用量	1カプセル中：イン ^o ダ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩173μg（イン ^o ダ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ルとして150μg）・モ ^o メ ^o タ ^o ジ ^o ソ ^o フ ^o ラ ^o ンカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プセル	イン ^o ダ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩・モ ^o メ ^o タ ^o ジ ^o ソ ^o フ ^o ラ ^o ンカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プセル		○		
院外	アテキユラ吸入用カプセル高用量	1カプセル中：イン ^o ダ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩173μg（イン ^o ダ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ルとして150μg）・モ ^o メ ^o タ ^o ジ ^o ソ ^o フ ^o ラ ^o ンカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プセル	イン ^o ダ ^o カ ^o テ ^o ロ ^o ル酢酸塩・モ ^o メ ^o タ ^o ジ ^o ソ ^o フ ^o ラ ^o ンカルホ ^o ン酸エステルカ ^o プセル		○		
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	1噴霧中：サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルキシ ^o ナホ ^o 酸塩・フル ^o チ ^o ガ ^o ジ ^o ン ^o プロ ^o ピ ^o ル ^o ホ ^o ン酸エステル36.3μg（サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルとして25μg）/50μg	サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルキシ ^o ナホ ^o 酸塩・フル ^o チ ^o ガ ^o ジ ^o ン ^o プロ ^o ピ ^o ル ^o ホ ^o ン酸エステル		○		
院外・ 院内特購	アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中：サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルキシ ^o ナホ ^o 酸塩・フル ^o チ ^o ガ ^o ジ ^o ン ^o プロ ^o ピ ^o ル ^o ホ ^o ン酸エステル36.3μg（サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルとして25μg）/125μg	サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルキシ ^o ナホ ^o 酸塩・フル ^o チ ^o ガ ^o ジ ^o ン ^o プロ ^o ピ ^o ル ^o ホ ^o ン酸エステル	（限定）	○		
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中：サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルキシ ^o ナホ ^o 酸塩・フル ^o チ ^o ガ ^o ジ ^o ン ^o プロ ^o ピ ^o ル ^o ホ ^o ン酸エステル36.3μg（サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルとして25μg）/250μg	サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルキシ ^o ナホ ^o 酸塩・フル ^o チ ^o ガ ^o ジ ^o ン ^o プロ ^o ピ ^o ル ^o ホ ^o ン酸エステル		○		
本採用	アドエア100デイスカス28吸入用	1ブ ^o リス ^o ター中：サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルキシ ^o ナホ ^o 酸塩・フル ^o チ ^o ガ ^o ジ ^o ン ^o プロ ^o ピ ^o ル ^o ホ ^o ン酸エステル72.5μg（サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルとして50μg）/100μg	サル ^o メ ^o テ ^o ロ ^o ルキシ ^o ナホ ^o 酸塩・フル ^o チ ^o ガ ^o ジ ^o ン ^o プロ ^o ピ ^o ル ^o ホ ^o ン酸エステル	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	アドエア100ディスクス60吸入用	17「リスター」中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン ^{プロピオン酸エステル} :72.5μg(サルメテロールとして50μg)/100μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン ^{プロピオン酸エステル}		○		
本採用	アドエア250ディスクス28吸入用	17「リスター」中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン ^{プロピオン酸エステル} :72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン ^{プロピオン酸エステル}	○	○		
院外	アドエア250ディスクス60吸入用	17「リスター」中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン ^{プロピオン酸エステル} :72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン ^{プロピオン酸エステル}		○		
院外	アドエア500ディスクス28吸入用	17「リスター」中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン ^{プロピオン酸エステル} :72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン ^{プロピオン酸エステル}		○		
院外	アドエア500ディスクス60吸入用	17「リスター」中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン ^{プロピオン酸エステル} :72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン ^{プロピオン酸エステル}		○		
院外	アドフィードパップ40mg	40mg/枚 7枚/包	フルビプロフェン		○		
本採用	日点アトロピン点眼液1%	5mL/本	アトロピン硫酸塩水和物	○	○		
院外	アトロベントエロゾル20μg	20μg/1噴霧	イプロパトロウム臭化物水和物		○		
院外	アニュイティ100μg エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○		
院外	アニュイティ200μg エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○		
院外	アノーロエリプタ30吸入用	17「リスター」中:ウメクリジニウム62.5μg・ヒスランテロール25μg	ウメクリジニウム臭化物・ヒスランテロールトリフェニル酢酸塩		○		
院外	アピドラ注100単位/mL	1000単位/10mL/V	インスリン グルジソン(遺伝子組換え)		○		
院外・ 院内特購	アピドラ注カート	1000単位/10mL/V	インスリン グルジソン(遺伝子組換え)	(限定)	○		
院外・ 院内特購	アピドラ注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリン グルジソン(遺伝子組換え)	(限定)	○		
院外	アバレプト懸濁性点眼液0.3%	0.3%/5mL/瓶	モツギバトレブ液		○		
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	0.025mg	トリラムシノロンアセトド		○		
本採用	アラセナー A軟膏3%	30mg/g 5g/本	ヒダラヒン	○	○	【般】	
院外	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】	
院外	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】	
院外	アリケイス吸入液590mg	590mg/8.4mL/瓶	アミカシン硫酸塩		○		○
院外	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg/枚	トネパギル		○		
院外	アリドネパッチ55mg	55mg/枚	トネパギル		○		
本採用	アルメタ軟膏	1mg/g 5g/本	アルクロメタゾン ^{プロピオン酸エステル}	○	○		
院外	アレサガテープ4mg	4mg/枚 (2.23cm×3.61cm)	エメダスチンフマル酸塩貼付剤		○		
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	5mg/g	エトナフィン塩酸塩クリーム		○		
院外	アレジオン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	エトナフィン塩酸塩		○	【般】	
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	エトナフィン塩酸塩		○		
院外	アレバール吸入用溶解液0.125%	100mL/本	アリキサール(サベリノ)		○		
本採用	アンテバートクリーム0.05%	0.5mg/g 5g/本	ヘタメタゾン酪酸エステル ^{プロピオン酸エステル}	○	○		
院外	アンテバートローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	ヘタメタゾン酪酸エステル ^{プロピオン酸エステル}		○		
本採用	アンテバート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ヘタメタゾン酪酸エステル ^{プロピオン酸エステル}	○	○		
院外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg	アセトアミノフェン		○	【般】	
院外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg	アセトアミノフェン		○	【般】	
院外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg	アセトアミノフェン		○	【般】	
本採用	アンベック坐剤10mg	10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○		
院外	アンベック坐剤20mg	20mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○		
院外	【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	300mg	イソコナゾール硝酸塩			【般】	
本採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット(水和物として20.76mg)	ラニナビルオクタン酸エステル	○	○		
院外	イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	スマトリプタ		○		
院外	インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」	100単位/1mL 10mL/V	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○		
院外	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	300単位/筒	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○		
本採用	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位/キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位/筒	インスリン グラルギン	(限定)	○		
本採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/キット	インスリン グラルギン	○	○		
院外	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	100単位/1mL、10mL/ 瓶	インスリン リスプロ		○		
本採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノ フィ」	300単位/3mL/キット	インスリン リスプロ	○	○		
院外	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位/筒	インスリン リスプロ		○		
本採用	インタール吸入液1%	20mg/2mL/A	α-メチルグリコ酸ナトリウム	○	○		
院外	インテバングリーム1%	1%/1g	インドメタシン		○	【般】	
院外	インテバン坐剤25	25mg	インドメタシン		○		
院内	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	α-ヘキシルベンジルグルコン酸塩	○			
院内	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	○			
院外	ウゴービ皮下注0.25mg MD	1mg/1.5mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウゴービ皮下注0.5mg MD	2mg/1.5mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウゴービ皮下注1.0mg MD	4mg/3mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウゴービ皮下注1.7mg MD	6.8mg/3mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウルティプロ吸入用カプセル	1Cp中:グリコピロニウム50μ g・インダカテロール110μg	グリコピロニウム臭化物・インダカ テロールマレイン酸塩		○		
院外	ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○	【般】	
本採用	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3%	90g/3000mL/B	D-ソリビトール	○	○		
本採用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ブリンゾラミド	○	○	【般】	
本採用	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・ 炭酸水素ナトリウム	○		【般】	
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/ 混合死菌浮遊液	オミデナバグ イソプロピル液		○		
本採用	エキザルベ	0.166mL(大腸菌死菌: 約1.5億個・ブドウ球菌死 菌:約1.5億個・レンサ球菌 死菌:約0.15億個・緑膿 菌死菌:約0.15億個を含 有)・ヒドロコルチゾン	混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾ ン	○	○		
本採用	エクラープラスター20μg/cm2	7.5cm×10cm	デンプロトニウムヒドロキシステ レート	○	○		
院外	エクリラ400μg ジェノエア60吸入用	400μg/回	アリジニウム臭化物		○		
院外・ 院内特購	エコリシン眼軟膏	3.5g/本	エリスロマイシンラクチドヒドロキシ ステレート・ポリメチルシロキサン酸 ナトリウム軟膏	(限定)	○		
院外・ 院内特購	エスケレ坐剤「250」	250mg	抱水クロール	(限定)	○		
院外	エスケレ坐剤「500」	500mg	抱水クロール		○		
本採用	エスケレ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水クロール	○	○		
院外	エストラーナテープ0.18mg	0.18mg/枚	エストラジオール		○		
院外	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚	エストラジオール		○		
院外	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジオール		○		
本採用	S P トローチ0.25mg「明治」	0.25mg	デカリニウム塩化物	○	○		
本採用	エタノール	500mL(15℃で 95.1～96.9vol%を含む)	エタノール	○	○		
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル中;インダカテロール マレイン酸塩173μg(インダカテ ロールとして150μg)・グリコ ピロニウム臭化物63μg(グリ コピロニウムとして50μg)・モ メタゾンフランカルボン酸エステル80	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピ ロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボ ン酸エステル		○		
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル中;インダカテロール マレイン酸塩173μg(インダカテ ロールとして150μg)・グリコ ピロニウム臭化物63μg(グリ コピロニウムとして50μg)・モ メタゾンフランカルボン酸エステル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピ ロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボ ン酸エステル		○		
院外	エヌジェンラ皮下注24mg ベン	24mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン（遺伝子組換		○		
院外	エヌジェンラ皮下注60mg ベン	60mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン（遺伝子組換		○		
院外	エビデュオゲル	15g/本	アダパレン・過酸化ベンゾイルゲル		○		
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸バリウム	○	○		
本採用	M S 温シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシ エキス	○	○		
本採用	M S 冷シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・メントール	○	○		
本採用	エムラクリーム	リトガイン25mg・700μg 25mg/g 5g/本	リトガイン・700μg リトガイン	○	○		
院外	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾンヒドロキシステ レート		○		
院外	エングラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	エンペシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	カトリマゾール		○	【般】	
院外	オイラックスHクリーム	カタミト100mg・ヒドコロチ ゾン2.5mg/g 5g/本	カタミト・ヒドコロチゾン		○		
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	カタミト	○	○		
院外	オーキ西斯9μg タービュヘイラー60吸入	9μg/吸入	ホルモロルマル酸塩水和物		○		
院外	オキサロールローション25μg / g	25μg/g 10g/本	マサカルシール		○		
院外	オキサロール軟膏25μg / g	25μg/g 10g/本	マサカルシール		○	【般】	
本採用	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg g「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩錠	○		【般】	
院内	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○			
院外・ 院内特購	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	アバロパラチド酢酸塩注射液	(限定)	○		
本採用	オスバン消毒液10%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○		
本採用	オゼックス点眼液0.3%	0.3%/mL	トスフロキサシントシル酸塩水 和物点眼液	○	○		
本採用	オゼンピック皮下注2mg g	2mg/本	セマグルチン（遺伝子組み換 え）キット	○	○		
院内	オベガードMA眼灌流液	ブドウ糖1.5mg・塩化ナトリ ウム6.6mg・塩化カリウム 0.36mg・塩化カルシウム水和 物0.18mg・硫酸マグネシウム 水和物0.3mg・炭酸水素ナトリ ウム2.1mg/mL	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリ ウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マ グネシウム水和物・炭酸水素ナトリ ウム	○			
院内	オベガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○			
院内	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○			
院外	オラドールトローチ0.5mg g	0.5mg	トミフェン臭化物		○		
院内	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	オラネジンナトリウム	○			
院外	オラビ錠口腔用50mg g	50mg/錠	ミコナゾール		○		
本採用	オリブ油「ヨシダ」	25mL/本(滅菌済)	オリブ油	○	○		
院外	オルセノン軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トリチノイトコフェール		○		
本採用	オルベスコ200μg インヘラー56吸入用	200μg/1噴霧	シクレリド	○	○		
院外	オンブレス吸入用カプセル150μg	150μg	インダカテロールマレイン酸塩		○		
院外	ガチフロ点眼液0.3%	5mL/本	ガチフロキサシン水和物		○		○
院外・ 院内特購	カデックス軟膏分包45mg g	45mg/5g/包	ヨリ素軟膏	(限定)	○		
院外	カラムンローション＊（丸石）	カラムン8g・酸化亜鉛 8g/100mL 500mL/本	カラムン・酸化亜鉛		○		
本採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参	0.05mg/mL 5mL/本	ピレノキシン	○	○		
院外	キシラタン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	ラナゾール		○	【般】	
本採用	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	リトカイン塩酸塩	○	○		
院外	キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	リトカイン塩酸塩		○		
本採用	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	リトカイン	○	○		
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	リトカイン塩酸塩	○	○		
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	リトカイン塩酸塩	○	○		
本採用	キューパール100エアゾール	100μg/1噴霧	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	○	○		
院外	強力ボステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒドコロチ ゾン		○	【般】	
本採用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ヒドコロチゾン酢酸エステル・フラジオ マイシン硫酸塩・ジフェニトランミン塩	○	○		
院外	グラアルファ配合点眼液	5mL/本	リバスジル塩酸塩水和物・プリ モニジン酒石酸塩		○		
院外・ 院内特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リパシジル塩酸塩水和物	(限定)	○		
院外	クラビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物		○		
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 30mL/個	グリセリン	○	○		
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 60mL/個	グリセリン	○		【般】	
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 120mL/個	グリセリン	○	○		
本採用	グリセリン「ケンエー」	25mL/本(84.0～87.0% を含む) (滅菌済)	グリセリン	○	○		
本採用	グリセリンBC液「ヨシダ」	250mL/瓶 (84.0～87.0%を含む)	0.025%ベンザルコニウム塩化物 添加グリセリン	○	○		
院外	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル		○	【般】	
院外・ 院内特購	クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	エフィナゾール	(限定)	○		
院外	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール		○	【般】	
院外	【般】クロトリマゾール錠100mg	100mg	クロトリマゾール			【般】	
本採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「イワキ」	0.05%1g5g	クロベタゾールプロピオン酸エス テル	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05%「MYK」	0.05%1g5g	クロベタゾールプロピオン酸エス テル	(限定)	○	【般】	
本採用	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	0.05%1g10g	クロベタゾン酪酸エステル	○	○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	クロマイー P 軟膏	クロラムフェニコール20mg・フラジ マイシン硫酸塩5mg・プレトニ ゾロン3mg/q 25g/本	クロラムフェニコール・フラジ マイシン硫酸塩・プレトニ ゾロン		○		
院外	クロマイ錠錠100mg	100mg	クロラムフェニコール		○		
本採用	クロラムフェニコール錠錠100mg「F」	100mg/錠	クロラムフェニコール	○	○		
本採用	ゲーベンクリーム1%	10mg/g	スルファジアシン銀	○	○		
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール	○		【般】	
本採用	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	○		【般】	
院外	ケラチナミンコーワクリーム20%	200mg/g 25g/本	尿素			【般】	
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩		○		
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○		【般】	
院外・ 院内特購	コソプト配合点眼液	トルゾラミド 10mg・フェ 5mg/mL 5mL/本	トルゾラミド 塩酸塩・フェ ン酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	コソプトミニ配合点眼液	トルゾラミド 10mg・フェ 5mg/mL 0.4mL/本	トルゾラミド 塩酸塩・フェ ン酸塩		○		
本採用	コレクチム軟膏0.25%	2.5mg/q 5g/本	デルゴチコブ	○	○		
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	デルゴチコブ		○		
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ビタミンA油		○		
本採用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V	肺サーファクタント製剤	○	○		
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロプロパントラート塩酸塩	○	○		
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェナル酸塩		○	【般】	
院外	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	ケトチフェナル酸塩		○	【般】	
院内	サニサーウW	250mL/本	エタノール	○			
院内	サニサーウW	60mL/本	エタノール	○			
院外	サラソピリン坐剤500mg	500mg/個	サラソスルファピリジン		○		
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセ 900mg/q	サリチル酸ワセリン		○		
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配 合剤噴霧剤		○		
院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg/カプセル	ヘキサメタリンポンピ ン酸エステル		○		
本採用	サルタノールインヘラー100μg	100μg/1回噴霧	サルタメール硫酸塩	○	○		
院外	サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノコバラミン		○	【般】	
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ピロカルピン塩酸塩		○		
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ピロカルピン塩酸塩	○	○		
本採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ヘキサメタリンリン酸エステルナトリウム	○	○	【般】	
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ポビドンヨード	○	○		
本採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバラミン液	○	○		
院外	シーブリ吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリヒドニウム臭化物		○		
本採用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ヒアルロン酸ナトリウム・ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム液	○	○		
院外	ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルナトリウム		○		
院外	ジクアスLX点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルナトリウム		○		
本採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム	(限定)	○		○
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジクロフェナクナトリウム		○	【般】	
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日 医工」	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○		
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○		
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医	50mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○		
院外	ジフルプレドナートクリーム0.05%	-	ジフルプレドナート		○		
特購	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶	ジメチルスルホキシド液	(限定)	(限定)		
本採用	シムピコートタービューヘイラー60吸入	ブデソニド 160μg・ホ ルマル酸塩水和物4.5μg/	ブデソニド・ホ ルマル酸塩水和物	○	○	【般】	
院内	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg	硝酸イソソルビド	○			
本採用	消毒用エタノール「ケンエー」	500mL/本	エタノール	○	○		
院外	小児用レルベア50エリプタ30吸入用	17リスター中:ビ ランテール25 μg・フルチカ ソフランカルボ ン酸エステル50μg	ビランテールトリフェニル酢酸塩・フル チカソフランカルボ ン酸エステル吸入剤		○		
院外	ジルダザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ベンダザック		○		
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ酸・無機塩類配合剤液		○		
本採用	ジンジカインゲル20%	30g/本	アミノ安息香酸エチル液	○	○		
院外	親水クリーム「ホエイ」	-	親水クリーム		○		
本採用	シンボニー皮下注50mg q オートインジェク	50mg/0.5mL/キット	ゴリムマブ (遺伝子組換え)	○	○		
本採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二 水素ナトリウム	○	○		
本採用	スープレン吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	デスフルラン	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	スコピゾル眼科用液	ヒドロキシルセルロース15mg・塩化ナトリウム5.5mg・塩化カリウム1.6mg・乾燥炭酸ナトリウム0.6mg・リン酸水素ナトリウム水和物1.8mg・杓酸12mg 15mL/本	ヒドロキシルセルロース・塩化ナトリウム・塩化カリウム・乾燥炭酸ナトリウム・リン酸水素ナトリウム水和物・杓酸	○	○		
院外	スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェンピコノール		○		
院外	スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェンピコノール		○		
本採用	ステリクロンRエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール	○	○		
院外	ステリクロンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩		○		
本採用	ステリクロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ステロネマ注腸3mg	3mg(リン酸エステルナトリウムとして3.95mg) 100mL/個	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム	(限定)	○		
本採用	スピオルトレスピマット60吸入	1噴霧中フルチカゾン2.5μg及び相添剤2.5μg	フルチカゾン臭化物水和物・相添剤塩酸塩	○	○		
本採用	スピジア点鼻液5mg	5mg/0.1mg/瓶	ジアゼパム噴霧剤	○	○		
本採用	スピジア点鼻液7.5mg	7.5mg/0.1mg/瓶	ジアゼパム噴霧剤	○	○		
本採用	スピジア点鼻液10mg	10mg/0.1mg/瓶	ジアゼパム噴霧剤	○	○		
院外	スピール膏M	357g/m2 25cm2/枚	サリシル酸		○		
院外・ 院内特購	スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	(限定)	○	【般】	
本採用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg/噴霧	フルチカゾン臭化物水和物	○	○		
院外・ 院内特購	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/Cp 7Cp/シート	フルチカゾン臭化物水和物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	フェナトリン	(限定)	○		
院外	セタネオ点眼液0.002%	0.002%2.5mL/本	セベタプロスト		○		
院外	ゼビアックスローション2%	10g/本	セメチキサジン		○		
院外	ゼップバウンド皮下注2.5mg アテオス	2.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○		○
院外	ゼップバウンド皮下注5mg アテオス	5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○		○
院外	ゼップバウンド皮下注7.5mg アテオス	7.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○		○
院外	ゼップバウンド皮下注10mg アテオス	10mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○		○
院外	ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	リナファート		○		
院外	ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	リナファート		○		
本採用	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	250mg/250mL/B	セボフルラン	○	○		
院外	セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	フェルビタカ		○		
院外	セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	フェルビタカ		○	【般】	
院外	セレベント50ディスクス	50μg/17°リスター 60°リスター/個	サルメテロールキシナ酸塩		○		
本採用	ゾピラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	アシクロビル	○	○		
院外	ゾピラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	アシクロビル		○	【般】	
本採用	ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	フラジールマイシン硫酸塩	○	○		
院外	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	5mg/筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○		○
院外	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	10mg/筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○		○
院外・ 院内特購	ソリクア配合注ソロスター	1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤キット	(限定)	○		
本採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット	○	○		
本採用	ソルベース	500g/瓶	マクロゴール400 マクロゴール4000	○	○		
本採用	ダイアブ坐剤4	4mg	ジアセパム	○	○		
本採用	ダイアブ坐剤6	6mg	ジアセパム	○	○		
本採用	ダイアブ坐剤10	10mg	ジアセパム	○	○		
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン2.1mg/1cm2 [4.8cm×4.8cm/枚 (ハーフサイズ)] 1	生体組織接着剤	○			
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン2.1mg/1cm2 [9.5cm×4.8cm/枚 (レギュラーサイズ)] 1	生体組織接着剤	○			
院外	タブコム配合点眼液	2.5mL/本	タクロプロスタ・フェニルアラニン酸		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	タブロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	タフル®ロスト		○		
院外	タブロスニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	タフル®ロスト		○		
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	タロビザン	○	○		
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	タロビザン	○	○		
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	タロリムス水和物		○		
本採用	チモプトールX E点眼液0.5%	2.5mL/A	チモールマリン酸塩	○	○	【般】	
院外	ツムラ紫雲膏	500g×1瓶	紫雲膏		○		
本採用	ツロブテロールテープ0.5mg g「久光」	0.5mg/枚	ツロブテロール	○		【般】	
本採用	ツロブテロールテープ1mg g「久光」	1mg/枚	ツロブテロール	○		【般】	
本採用	ツロブテロールテープ2mg g「久光」	2mg/枚	ツロブテロール	○		【般】	
院内	デイスオーパ消毒液0.55%	3.8L/本	フタール	○			
院外	デビゲル1mg g	1mg	エストラジオール		○		
院外・ 院内特購	ディフェリンゲル0.1%	15g/本	アダパレン	(限定)	○	【般】	
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	デキサメタゾン	○		【般】	
本採用	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg g「フェリン	2.5μg/1回噴霧	デスモプレシン酢酸塩水和物	○	○		
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ブナザン塩酸塩		○		
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エピジヒドロコレスチリン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○		
院外	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物10mg・過酸化ベンゾイル30mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○		
院外	デュオトラバ配合点眼液	トラホプロロスト40μg・チモールマリン酸塩5mg	トラホプロロスト・チモールマリン酸塩		○		
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg g	2.1mg/枚	フェンタニル		○		
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg g	4.2mg/枚	フェンタニル		○		
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg g	8.4mg/枚	フェンタニル		○		
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg g	16.8mg/枚	フェンタニル		○		
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg g《慢性疼	2.1mg/枚	フェンタニル		○		○
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg g《慢性疼	4.2mg/枚	フェンタニル		○		○
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg g《慢性疼	8.4mg/枚	フェンタニル		○		○
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg g《慢性疼	16.8mg/枚	フェンタニル		○		○
本採用	テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）	25g/本	ポリミキシンB硫酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	○	○		
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリチルリチン酸		○		
本採用	デルモゾールgローション	10mL/本	ベータメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○		
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	クロバタリールプロピオン酸エステル		○	【般】	
本採用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○		
院外	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○		
本採用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○		
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○		
院外・ 院内特購	テレミンソフト坐薬2mg g	2mg	ビサゾール	(限定)	○		
院外・ 院内特購	テレミンソフト坐薬10mg g	10mg	ビサゾール	(限定)	○		
院外・ 院内特購	トービー吸入液300mg g	300mg/5mL/管	トブラマイシン	(限定)	○		
院外	トブシムクリーム0.05%	10g/本	フルオシノニド		○	【般】	
本採用	トブシムローション0.05%	10g/本	フルオシノニド	○	○		
院外	トブシム軟膏0.05%	10g/本	フルオシノニド		○		
院外・ 院内特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブラマイシン	(限定)	○		
院外	ドボネックス軟膏50μg g	10g/本	カルシポトリオール		○		
院外	ドボベツゲル	15g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○		
院外	ドボベツ軟膏	カルシポトリオール50.0μg・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0.643mg/g 15g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○		
院外	ドボベツ軟膏	カルシポトリオール50.0μg・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0.643mg/g 30g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ドボベツフォーム	60g/本	カルシボトリオール水和物・ベタ メタゾンジプロピオン酸エステル		○		
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トラホﾞﾟロスト		○	【般】	
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルソﾞラミトゝ塩酸塩		○		
本採用	トルリシティ皮下注0.75m g アテオス	0.75mg/0.5mL/ｷｯﾄ	テュラカﾞルホトゝ	○	○		
本採用	トレーバ注 フレックスタッチ	300単位/筒	インスリン デグデルテク (遺伝子組 換え)	○	○		
院外・ 院内特購	トレーバ注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デグデルテク (遺伝子組 換え)	(限定)	○		
本採用	トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	10000単位	トロンピン	○	○		
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	トンプゝリトピン	○	○	【般】	
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	トンプゝリトピン	○	○	【般】	
院外	ナウゼリン坐剤60	60mg	トンプゝリトピン		○		
院外	ナゾネックス点鼻液50μ g 112噴霧用	50μg/噴霧	モメタゾノフランカルボキシ酸エステル水和		○		
本採用	ナノパスニードルⅡ	34G×4mm	-	○	○		
院外	ナパゲルンローション3%	50mL/本	フェルビタク		○	【般】	
院外	ナパゲルン軟膏3%	25g/本	フェルビタク		○		
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2 /枚	ニコチン		○		
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /枚	ニコチン		○		
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /枚	ニコチン		○		
院外	ニゾラールクリーム2%	10g/本	ケトコナゾール		○	【般】	
院外	ニゾラールローション2%	10g/本	ケトコナゾール		○	【般】	
院外	ニトログリセリンテープ27mg「トーフ」	27mg/9.6cm2/枚	ニトログリセリン貼付剤		○		
本採用	ニトロダーム T T S 25m g	25mg/枚	ニトログリセリン	○	○		
院外	ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ニブラジロール		○		
院外	ニュープロパッチ2.25m g	2.25mg/枚	ロフドチン		○		
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ4.5m g	4.5mg/枚	ロフドチン	(限定)	○		
本採用	ニュープロパッチ9m g	9mg/枚	ロフドチン	○	○		
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ13.5m g	13.5mg/枚	ロフドチン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ18m g	18mg/枚	ロフドチン	(限定)	○		
院外	ネフィー点鼻液1mg	1mg/本	アドレナリン噴霧剤	(限定)	○		
院外	ネフィー点鼻液2mg	2mg/本	アドレナリン噴霧剤	(限定)	○		
院外	ネオキシテープ73.5m g	73.5mg/枚	オキシメチン塩酸塩		○		
本採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	フェニレリン塩酸塩	○	○		
本採用	ネオステリングリーンうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○		
本採用	ネオメドロール E E 軟膏	3g/本	フラジドマイシン硫酸塩・メチルパロト ニゾロン	○	○		
院内	ネキソブリッド外用ゲル5g	5g/瓶(混合用ゲル付)	ハイナップル茎搾汁精製物	○			
院外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ネバフェタク		○		
院外・ 院内特購	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○		
院外	ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン		○		
院外	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト		○		
院外	ノボラピッド注 フレックスタッチ	300単位/3mL	インスリン アスパルト	○	○		
院外・ 院内特購	ノボラピッド注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○		
本採用	ノボラピッド注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト	○	○		
院外・ 院内特購	ノボリン30 R 注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○		
本採用	ノボリンN注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○		
院外・ 院内特購	ノボリンR 注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ノボリンR注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○		
院外	ノルスパンテープ5m g	5mg/枚	ブプロピレン		○		○
院外・ 院内特購	ノルスパンテープ10m g	10mg/枚	ブプロピレン	(限定)	○		○
院外	ノルスパンテープ20m g	20mg/枚	ブプロピレン		○		○
本採用	ハイジール消毒用液10%	10%/10mL	アルキルジアミノエチルグリシン塩 酸塩	○	○		
院外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	ニブラジロール		○	【般】	
本採用	ハイボエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	○	○		
院外	白色ワセリン	100g/本	白色ワセリン		○		
院外	バクスメー点鼻粉末剤3m g	3mg/瓶	カルボゴン		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	Δ ⁺ ロシカルシウム	(限定)	○		
本採用	バスタロンローション10%	10%1g	尿素	○	○		
院外	バタノール点眼液0.1%	5mL/本	和ハ ⁺ タジ ⁺ ン塩酸塩		○		
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	アス ⁺ レ ⁺ ス ⁺ ル ⁺ ン酸ナトリウム水和物・ 炭酸水素ナトリウム		○		
院内	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/本	ハッカ油	○			
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	シクロス ⁺ リン		○		
院外・ 院内特購	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸 入	200μg/1回噴霧	ブ ⁺ デ ⁺ リ ⁺ ニ ⁺ ト ⁺	(限定)	○		
本採用	パルミコート吸入液0.25m g	0.25mg/2mL/A	ブ ⁺ デ ⁺ リ ⁺ ニ ⁺ ト ⁺	○	○		
院外・ 院内特購	パルミコート吸入液0.5m g	0.5mg/A	ブ ⁺ デ ⁺ リ ⁺ ニ ⁺ ト ⁺	(限定)	○		
院外	ハルロピテブ8m g	8mg/枚	0 ⁺ レ ⁺ ニ ⁺ ール塩酸塩		○		
院外	ハルロピテブ16m g	16mg/枚	0 ⁺ レ ⁺ ニ ⁺ ール塩酸塩		○		
院外	ハルロピテブ24m g	24mg/枚	0 ⁺ レ ⁺ ニ ⁺ ール塩酸塩		○		
院外	ハルロピテブ32m g	32mg/枚	0 ⁺ レ ⁺ ニ ⁺ ール塩酸塩		○		
特購	バンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	バ ⁺ ン ⁺ コ ⁺ マイ ⁺ シ ⁺ ン	(限定)	(限定)		
院外	パンデルクリーム0.1%	5g/本	酪酸 ⁺ γ ⁺ 0 ⁺ レ ⁺ ン酸ヒド ⁺ ロ ⁺ ルチ ⁺ ザ ⁺ ン		○		
本採用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日 点」	5mL/本	ヒアル ⁺ ン酸ナトリウム	○		【般】	
院内	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコ ン」	0.6mL/筒	精製ヒアル ⁺ ン酸ナトリウム液	○			
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアル ⁺ ン酸ナトリウム		○	【般】	
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアル ⁺ ン酸ナトリウム		○	【般】	
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアル ⁺ ン酸ナトリウム	○	○	【般】	
本採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○		
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液	20mL/B（希釈液付）	オキシゲ ⁺ ルチ ⁺ オン	○	○		
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.6mL/本	ヒアル ⁺ ン酸ナトリウム	○			
院内	ピオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベン ⁺ ザ ⁺ ル ⁺ コ ⁺ ニ ⁺ ウム塩化物	○			
本採用	ピソノテブ4m g	4mg/枚	ヒ ⁺ ソ ⁺ ノ ⁺ テ ⁺ ブ ⁺ ール	○	○		
院内	ヒビスクラブ消毒液4%	4% 500mL	クロ ⁺ ル ⁺ キ ⁺ ジ ⁺ ン ⁺ グ ⁺ ル ⁺ コ ⁺ ン酸塩	○			
本採用	5%ヒピテン液	500mL/本	クロ ⁺ ル ⁺ キ ⁺ ジ ⁺ ン ⁺ グ ⁺ ル ⁺ コ ⁺ ン酸塩	○	○		
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ピ ⁺ マ ⁺ リ ⁺ シ ⁺ ン		○		
院外	ヒューマリン3／7注カート	300単位/3mL	インスリン		○		
院外	ヒューマリン3／7注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○		
本採用	ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○		
院外	ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	インスリン		○		
院外	ヒューマリンN注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○		
本採用	ヒューマリンR注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	○	○		
院外	ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	インスリン		○		
本採用	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○		
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/キット	インスリン ⁺ アス ⁺ パ ⁺ ルト混合製剤-25		○		
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/キット	インスリン ⁺ アス ⁺ パ ⁺ ルト混合製剤-50		○		
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	インスリン ⁺ アス ⁺ パ ⁺ ルト(遺伝子組み換		○		
院外・ 院内特購	ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	インスリン ⁺ アス ⁺ パ ⁺ ルト(遺伝子組み換 え)	(限定)	○		
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/キット	インスリン ⁺ アス ⁺ パ ⁺ ルト(遺伝子組み換		○		
院外	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ハ ⁺ レ ⁺ リ ⁺ 類似物質		○	【般】	
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ハ ⁺ レ ⁺ リ ⁺ 類似物質		○	【般】	
院外	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ハ ⁺ レ ⁺ リ ⁺ 類似物質		○	【般】	
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/キット	ブ ⁺ デ ⁺ ソ ⁺ ニ ⁺ ド・グリ ⁺ コ ⁺ ピ ⁺ ロ ⁺ ニ ⁺ ウム臭化 物・ホルモテロールフマル酸塩水 和物吸入剤		○		
院外	5－F U軟膏5%協和	5g/本	フル ⁺ 和 ⁺ ラ ⁺ ラ ⁺ シル		○		
院外・ 院内特購	フィアスブ注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アス ⁺ パ ⁺ ルト(遺伝子組み換 え)	(限定)	○		
院外・ 院内特購	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位/キット	インスリン アス ⁺ パ ⁺ ルト(遺伝子組み換 え)	(限定)	○		
院外・ 院内特購	フィアスブ注 ベンフィル	300単位/本	インスリン アス ⁺ パ ⁺ ルト(遺伝子組み換 え)	(限定)	○		
本採用	フィブラストスプレー500	1個	トラ ⁺ フェ ⁺ ル ⁺ ミン(遺伝子組換え)	○	○		
院外	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	500g/瓶	フェ ⁺ ノ ⁺ ール 亜鉛華リニメント		○		
院外	フェルピナクパップ70m g「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	フェ ⁺ ル ⁺ ピ ⁺ ナ ⁺ ク		○		
本採用	フェントステーブ0.5m g	0.5mg/枚	フェ ⁺ ン ⁺ タ ⁺ ニ ⁺ ル ⁺ キ ⁺ ン酸塩	○	○	【般】	
本採用	フェントステーブ1m g	1mg/枚	フェ ⁺ ン ⁺ タ ⁺ ニ ⁺ ル ⁺ キ ⁺ ン酸塩	○	○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	フェントステップ2mg	2mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○	【般】	
本採用	フェントステップ4mg	4mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○	【般】	
院外	フェントステップ6mg	6mg/枚	フェンタニル塩酸塩		○	【般】	
院外	フェントステップ8mg	8mg/枚	フェンタニル塩酸塩		○	【般】	
本採用	フェントステップ0.5mg《慢性疼痛》	0.5mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○		○
本採用	フェントステップ1mg《慢性疼痛》	1mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○		○
本採用	フェントステップ2mg《慢性疼痛》	2mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○		○
本採用	フェントステップ4mg《慢性疼痛》	4mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○		○
院外	フェントステップ6mg《慢性疼痛》	6mg/枚	フェンタニル塩酸塩		○		○
院外	フェントステップ8mg《慢性疼痛》	8mg/枚	フェンタニル塩酸塩		○		○
本採用	複方ヨード・グリセリン＊（小堺）	500mL/本	複方ヨード・グリセリン	○	○		
院外	【般】ブセリン酢酸塩点鼻液0.15%	15.75mg/10mL/瓶	ブセリン酢酸塩			【般】	
本採用	フラジール錠250mg	250mg	メロキサラン	○	○		
本採用	プラスチバックU100	30G×1cc	-	○	○		
院外	フランドルテープ40mg	40mg	硝酸イソルビド		○	【般】	
本採用	プリビーシー液0.02%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○		
本採用	プリビーシー液0.05%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○		
院外	プリピナ液0.05%	500mL/本	ナファゾリン硝酸塩		○		
院外	【般】フルオシノニド軟膏0.05%	10g/本	フルチゾン酢酸エステル			【般】	
院外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	フルチゾン酢酸エステル		○		
院外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	フルチゾン酢酸エステル		○		
本採用	フルタイド100ディスクス	100μg/1回噴霧	フルチゾン酢酸エステル	○	○		
院外	フルタイド200ディスクス	200μg/1回噴霧	フルチゾン酢酸エステル		○		
本採用	フルチゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチゾンフランカルボン酸エステル	○		【般】	
院外	【般】フルチゾンプロピオン酸エステル点鼻 液50μg28噴霧用	50μg/1噴霧	フルチゾン酢酸エステル			【般】	
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中：フルチゾン酢酸エステル50μg・メチロ ルマ酸塩水和物5μg	フルチゾン酢酸エステル・メ チロルマ酸塩水和物		○		
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中：フルチゾン酢酸エステル125μg・メチロ ルマ酸塩水和物5μg	フルチゾン酢酸エステル・メ チロルマ酸塩水和物		○		
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中：フルチゾン酢酸エステル125μg・メチロ ルマ酸塩水和物5μg	フルチゾン酢酸エステル・メ チロルマ酸塩水和物	○	○		
院外	フルメタクリーム	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】	
院外・ 院内特購	フルメタ軟膏	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル	(限定)	○	【般】	
本採用	フルメロン点眼液0.02%	5mL/本	フルメロン	○	○	【般】	
本採用	フルメロン点眼液0.1%	5mL/本	フルメロン	○	○	【般】	
院内	ブレグランディン腔坐剤1mg	1mg	ゲマフロスト	○			○
院外・ 院内特購	ブレドニン眼軟膏	5g/本	プロピドン酢酸エステル	(限定)	○		
本採用	ブロウベス腔用剤	10mg/個	ジノプロストン腔用剤	○	○		○
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	-	フルオレインナトリウム	○	○		
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	カルプロニウム塩化物水和物		○		
本採用	ブロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	アルプロスタシル アルファテックス	○	○		
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タクロリムス水和物		○		
院外・ 院内特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タクロリムス水和物	(限定)	○	【般】	
院外	プロナック点眼液0.1%	5mL/本	プロムフェナクトリウム水和物		○	【般】	
本採用	プロベト	100g/本	白色ワセリン	○	○		
本採用	プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイ	2mg/mL 45mL/本	プロムヘキシシ塩酸塩	○		【般】	
院内	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	5mL/本	プロムフェナクトリウム水和物	○			
院外	プロメライン軟膏5万単位／g＊（ジェイド ルフ）	20g/本	プロメライン		○		
院外・ 院内特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	メチゾロキサシ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ヘキサザク水溶液1%消毒布20×30	20×30/枚	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○		
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セフェメキシム塩酸塩	○	○		
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セフェメキシム塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	イミモド	(限定)	○		
院外	【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5%	5mL/本	ベタキソロール塩酸塩			【般】	
本採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サルブタモール硫酸塩	○	○		
本採用	ベノキシール点眼液0.4%	5mL/本	オキシプロピリン塩酸塩	○	○		
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 「PP」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○		
本採用	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	25g/本	ヘパリン類似物質クリーム	○	○		
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	25g/本	ヘパリン類似物質軟膏	○	○		
本採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」	25g/本	ヘパリン類似物質液	○	○		
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医」	50g/本	ヘパリン類似物質液		○		
院外・ 院内特購	ベピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○		
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒトロコリリン	○		【般】	
本採用	ヘモレックス軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○		
院内	ペリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL/本	生体組織接着剤	○			
院内	ペリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL/本	生体組織接着剤	○			
院内	ペリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL/本	生体組織接着剤	○			
院外・ 院内特購	ペンタサ坐剤1 g	1g/個	メサジン	(限定)	○		
院外	ペンタサ注腸1 g	1g/100mL/本	メサジン		○		
本採用	ペンニードルプラス	32G×4mm	-	○	○		
本採用	ホーリンV腔用錠1m g	1mg	エトリオール	○	○		
院外	ホクナリンテープ0.5m g	0.5mg/枚	ワコブテロール		○	【般】	
院外	ホクナリンテープ1m g	1mg/枚	ワコブテロール		○	【般】	
院外	ホクナリンテープ2m g	2mg/枚	ワコブテロール		○	【般】	
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	エトネリチン	○	○		
本採用	ボビシュガーパスタ軟膏	100g/本	精製白糖 ポロビドンヨード	○	○	【般】	
院外	ボビドンヨードガーグル液7%	30mL/本	ポロビドンヨード		○	【般】	
本採用	ボビドンヨードゲル10%「ケンエー」	4 g/本	ポロビドンヨードゲル	○	○		
本採用	ボビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	50mL/本	ポロビドンヨード	○	○		
本採用	ボビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250mL/本	ポロビドンヨード	○	○		
本採用	ボビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	500mL/本	ポロビドンヨード	○	○		
院外	ボラザq 坐剤	1個	トリヘノジド リトカイン		○		
院外	ボルタレンサボ12.5m g	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルタレンサボ25m g	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルタレンサボ50m g	50mg	ジクロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルタレンテープ15m g	7枚/包	ジクロフェナクナトリウム		○		
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○		
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○		
本採用	マイクロファインプロ	32G×4mm	-	○	○		
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジフルフロレトナート		○		
院内	マクロゴール400	500mL/本	酸化エチレンと水との縮重合体	○			
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	マキサカルニール・ヘパタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○		
院外	マンジャロ皮下注2.5m g アテオス	2.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○		
院外	マンジャロ皮下注5m g アテオス	5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○		
院外	マンジャロ皮下注7.5m g アテオス	7.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○		
院外	マンジャロ皮下注10m g アテオス	10mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○		○
院外	マンジャロ皮下注12.5m g アテオス	12.5mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○		○
院外	マンジャロ皮下注15m g アテオス	15mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○		○
本採用	ミオコールスプレー0.3m g	0.3mg/本1回噴霧	ニトログリセリン	○	○		
本採用	ミケランL A点眼液2%	2.5mL/本	カルテロール塩酸塩	○	○	【般】	
院外	ミケルナ配合点眼液	2.5mL	カルテロール塩酸塩・タナノロスト		○		
本採用	ミドリンM点眼液0.4%	5mL/本	トロピカミド	○	○		
院外	ミドリンP点眼液	5mL/本	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩		○		
本採用	ミドレフリンP点眼液	5mL/本	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	○	○		
院外	ミルタックスパップ30m g	7枚/包	ケトプロフェン		○		
院内	ミレーナ52m g	52mg/個	レボノルゲストレル	○			
本採用	ムコスタ点眼液U D 2%	20mg/mL 0.35mL/本	レバミピト	○	○		
本採用	ムコフィリン吸入液20%	2mL/包	アセチルステイナトリウム塩	○	○		
本採用	無水エタノール「マルイシ」	500mL/本	エタノール	○	○		
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	【般】	
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	【般】	
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○		
本採用	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	0.75%1g	メトロニダゾールゲル	○	○		
院外	メノエイドコンビパッチ	1ストライプオール0.62mg・酢酸 ノルエチステロン2.70mq	1ストライプオール・酢酸ノルエチステロン		○		
本採用	メプチンエア-10μ g 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピテロール塩酸塩水和物	○	○		
院外	メプチンキッドエア-5μ g 吸入100回	5μg/1回噴霧	プロピテロール塩酸塩水和物		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	メブチンスイングヘラー10μg 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロパフェロール塩酸塩水和物	(限定)	○		
本採用	メブチン吸入液ユニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	プロパフェロール塩酸塩水和物	○	○		
院外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	ジフアマリスト軟膏		○		
院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ジフアマリスト軟膏		○		
院外	モーラステープ20m g	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】	
院外	モーラステープL 40m g	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】	
院外	モーラスパップ30m g	7枚/包	ケトプロフェン		○		
院外	モーラスパップXR120m g	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】	
院外	モーラスパップXR240m g	7枚/包	ケトプロフェン		○		
本採用	ユーバスタ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホピトドンオート	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ユベラ軟膏	56g/本	トコフェロール・ビタミンA油	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ライソデグ配合注 フレックスタッチ	インスリンデグアルテク210単位 /3mL インスリンアスパルト90単位	インスリンデグアルテク インスリンアスパルト	(限定)	○		
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	ラタノプロスト	○		【般】	
院外・ 院内特購	ラパリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シロリムスゲル	(限定)	○		
院外	ラミシールクリーム1%	10g/本	テルビナフィン塩酸塩		○	【般】	
本採用	ランタスXR注ソロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリングルキニン	○	○		
院外	ランタス注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリングルキニン		○		
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トコニラスト		○	【般】	
院外	リズモン T g 点眼液0.5%	2.5mL/本	フェニルメレイン酸塩		○		
特購	リティンバ耳科用250μg セット	250μg/セット	トコフェリン(遺伝子組換え)	(限定)			
本採用	リドカインテープ18m g「NP」	(18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○		
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	プロピドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○		
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	プロピドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○		
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロピドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル		○		
院外・ 院内特購	リバスタッチパッチ4.5m g	4.5mg/枚	リバステグミン	(限定)	○	【般】	
院外	リバスタッチパッチ9m g	9mg/枚	リバステグミン		○	【般】	
院外	リバスタッチパッチ13.5m g	13.5mg/枚	リバステグミン		○	【般】	
院外	リバスタッチパッチ18m g	18mg/枚	リバステグミン		○	【般】	
院外	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	レボカルバステイン塩酸塩	○	○	【般】	
院外	リボスチン点鼻液0.025m g 112噴霧用	0.025mg	レボカルバステイン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	アトロピン硫酸塩水和物	(限定)	○		
院外	リレンザ	5mg/ブリストア	ザナミビル水和物		○		
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラ ジオキサイン硫酸塩		○		
院外	リンデロンーD Pクリーム	5g/本	ヘタメタゾンプロピドニゾン酸エステル		○	【般】	
本採用	リンデロンーD P軟膏	5g/本	ヘタメタゾンプロピドニゾン酸エステル	○	○	【般】	
院外	リンデロンーVGローション	10mL/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマ イン硫酸塩		○		
本採用	リンデロンーVG軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマ イン硫酸塩	○	○		
本採用	リンデロンーVクリーム0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル	○	○	【般】	
本採用	リンデロンーV軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	リンデロン坐剤0.5m g	0.5mg/個		(限定)	○		
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム		○	【般】	
院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g 80g/本	エストラジオールゲル		○		
院外	ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ルコナゾール		○		
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ビマトプロスト		○	【般】	
院外	ルムジェブ注カート	300単位/本	インスリン リスプロ		○		○
院外・ 院内特購	ルムジェブ注ミリオベン	300単位/本	インスリン リスプロ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ルムジェブ注100単位／mL	100単位/1mL 10mL/ 本	インスリン リスプロ	(限定)	○		
院内	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	ルリコナゾール	○			
院外	ルリコンクリーム1%	10mg/g 10g/本	ルリコナゾール		○		
院外	ルリコン液1%	10mg/mL 10mL/本	ルリコナゾール		○		
院外・ 院内特購	レクタブル2m g 注腸フォーム14回	48mg・30.8g/瓶	ブデソニド注腸剤	(限定)	○		
院外	レスキュア点眼液0.12%	5mL/本	イソプロピルメチルソートン		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ジフェンヒドรามミン	○	○		
院外・ 院内特購	レバタン坐剤0.2m g	0.2mg	ブブレンルフィン塩酸塩	(限定)	○		
本採用	レベミル注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン デメミル	○	○		
院外・ 院内特購	レベミル注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デメミル	(限定)	○		
本採用	レボカバステチン点眼液0.025%「ニットー」	5mL/本	レボカバステチン塩酸塩	○		【般】	
本採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物	○	○		
本採用	レルベア100エリプタ14吸入用	17ブリスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル100μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル	○	○		
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	17ブリスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル100μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル		○		
本採用	レルベア200エリプタ14吸入用	17ブリスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル200μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル	○	○		
院外	レルベア200エリプタ30吸入用	17ブリスター中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル200μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル		○		
本採用	ロードーズU 100	30G×1/2cc	-	○	○		
本採用	ロードーズU 100	30G×3/10cc	-	○	○		
本採用	ロキシニンゲル1%	10mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	【般】	
院外	ロキシニンテープ50m g	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○		
院外	ロキシニンテープ100m g	100mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○		
院外	ロキシニンパップ100m g	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○		
本採用	ロキソプロフェンNaテープ50m g「科研」	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○		
本採用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100m g「ケ ミファ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○		
院外	ロコアテープ	40mg/枚	エスフルビルプロフェン・ハッカ油		○		
本採用	ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○		
本採用	ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○		
院外	ロゼックスゲル0.75%	0.75%/g×50g	メトロニダゾールゲル		○		
本採用	ロナセンテープ20mg	20mg/枚	プロピナセリン	○	○		
本採用	ワコピタル坐剤30	30mg	フェノバルビタールナトリウム	○	○		